



Кожные и венерические болезни рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Дерматовенерологии и фтизиатрии**

Учебный план о310835_17_12ИБ.plx
Специальность 31.08.35 Инфекционные болезни

Квалификация **врач-инфекционист**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**



Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 48
самостоятельная работа 24

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	Неделя 22			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	8	8	8	8
Практически	40	40	40	40
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная	48	48	48	48
Сам. работа	24	24	24	24
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой, профессор, Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич; кандидат медицинских наук, доцент, Садыкова Дано Авахановна  

Рецензент(ы):

доктор медицинских наук, Заведующая кафедрой дерматовенерологии КГМА, профессор, Койбагарова Асель Алмазбековна; доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии КГМА, Усубалиев Мейкин Бейшембаевич 


Рабочая программа дисциплины

Кожные и венерические болезни

разработана в соответствии с ФГОС 3+:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 25.08.2014г. №1077)

составлена на основании учебного плана:

Специальность 31.08.35 Инфекционные болезни


утвержденного учёным советом вуза от 29.09.2015 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Дерматовенерологии и фтизиатрии


Протокол от 11.09. 2015 г. № 2

Срок действия программы: уч.г.


Зав. кафедрой доктор медицинских наук, профессор Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

23 сентября 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
Исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Дерматовенерологии и фтизиатрии

Протокол от 4 сентября 2020 г. № 1
Зав. кафедрой д.м.н., профессор Балтабаев М.К. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2021 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
Исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Дерматовенерологии и фтизиатрии

Протокол от _____ 2021 г. № _____
Зав. кафедрой д.м.н., профессор Балтабаев М.К.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
Исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Дерматовенерологии и фтизиатрии

Протокол от _____ 2022 г. № _____
Зав. кафедрой д.м.н., профессор Балтабаев М.К.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
Исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Дерматовенерологии и фтизиатрии

Протокол от _____ 2023 г. № _____
Зав. кафедрой д.м.н., профессор Балтабаев М.К.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Подготовка врача, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение и повышение уровня теоретических знаний, овладение и совершенствование практических навыков, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача-инфекциониста при выполнении возложенных на него обязанностей для обеспечения современного уровня оказания медицинской помощи.
-----	--

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТР КТ РЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
	Т
2.1.1	Патология 1
2.1.2	Патология 2
2.1.3	Микробиология и иммунология
2.1.4	Медицина чрезвычайных ситуаций
2.1.5	Педагогика
2.1.6	Общественное здоровье и здравоохранение
2.1.7	Медицина чрезвычайных ситуаций
2.1.8	Педагогика
2.1.9	Основы менеджмента в здравоохранении
	Д
2.2.1	Гинекология
2.2.2	Урология
2.2.3	Клиническая фармакология
2.2.4	Фтизиатрия
2.2.5	Кожные и венерические болезни
2.2.6	Производственная (клиническая) практика: Стационарная
2.2.7	Вакцинопрофилактика
2.2.8	Производственная (клиническая) практика: Выездная (поликлиника) 1
2.2.9	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10	Реанимация
2.2.11	Производственная (клиническая) практика: Выездная (поликлиника) 2

**КОМПЕТЕНЦИИ ОБ ЧА ЩЕГОСЯ ФОРМИР ЕМЫЕ В РЕЗ Л ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
МОД ЛЯ**

ПК	М
З	
Уровень 1	клинические проявления патологических состояний, симптомов
Уровень 2	клинические и лабораторные проявления патологических состояний, симптомов, синдромов кожных заболеваний, нозологических форм.
Уровень 3	клинические и лабораторные проявления патологических состояний, симптомов, синдромов кожных заболеваний, нозологических форм; клиническую классификацию кожных болезней; клинику распространенных дерматозов и ИППП;
Уровень 1	опросить больного и получить наиболее достоверные сведения о дерматологическом заболевании; правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни кожного больного.
Уровень 2	опросить больного и получить наиболее достоверные сведения о дерматологическом заболевании; правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни кожного больного; выявить характерные признаки имеющегося кожного заболевания; обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований. оценить данные параклинических методов исследования при диагностике патологического процесса и определении его активности.

Уровень 3	<p>опросить больного и получить наиболее достоверные сведения о дерматологическом заболевании; правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни кожного больного; выявить характерные признаки имеющегося кожного заболевания; обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований;</p> <p>оценить данные параклинических методов исследования при диагностике патологического процесса и определении его активности;</p> <p>выявить клинические показания для срочной или плановой госпитализации, или перевода больного дерматологического профиля на лечение к другому специалисту, определить профиль медицинской организации или специалиста с учетом особенности и тяжести заболевания;</p> <p>провести дифференциальную диагностику психического заболевания; поставить и обосновать окончательный диагноз.</p>
-----------	---

В

Уровень 1	<p>выбором наиболее информативного способа лабораторной диагностики развивающегося патологического процесса;</p> <p>обоснованием назначения необходимого лабораторно-инструментального исследования для определения степени и тяжести поражения внутренних органов и органов ЦНС.</p>
Уровень 2	<p>выбором наиболее информативного способа лабораторной диагностики развивающегося патологического процесса;</p> <p>обоснованием назначения необходимого лабораторно-инструментального исследования для определения степени и тяжести поражения внутренних органов и органов ЦНС; опросом больного с кожным и венерическим заболеванием;</p> <p>выявления характерных признаков и особенностей дерматологических симптомов и синдромов;</p> <p>выявления особенностей формирования кожного заболевания; проведения дифференциальной диагностики.</p>
Уровень 3	<p>выбором наиболее информативного способа лабораторной диагностики развивающегося патологического процесса;</p> <p>обоснованием назначения необходимого лабораторно-инструментального исследования для определения степени и тяжести поражения внутренних органов и органов ЦНС;</p> <p>опросом больного с кожным и венерическим заболеванием;</p> <p>выявления характерных признаков и особенностей дерматологических симптомов и синдромов;</p> <p>выявления особенностей формирования кожного заболевания; проведения дифференциальной диагностики;</p> <p>формулировкой диагноза при кожных заболеваниях и ИППП в соответствии с требованиями международной классификации болезней.</p>

ПК**З**

Уровень 1	<p>современные методы лечения дерматозов и ИППП;</p> <p>основы клинической фармакологии;</p> <p>фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов, применяемых в дерматовенерологии.</p>
Уровень 2	<p>современные методы лечения дерматозов и ИППП;</p> <p>основы клинической фармакологии;</p> <p>фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов, применяемых в дерматовенерологии;</p> <p>особенности лечения кожных заболеваний у женщин, лиц молодого и пожилого возраста;</p>
Уровень 3	<p>современные методы лечения дерматозов и ИППП;</p> <p>основы клинической фармакологии;</p> <p>фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов, применяемых в дерматовенерологии;</p> <p>особенности лечения кожных заболеваний у женщин, лиц молодого и пожилого возраста;</p> <p>основные принципы лечения неотложных состояний в дерматологии; общую соматическую терапию и частные виды терапии распространенных дерматозов;</p> <p>основные принципы фито и рефлексотерапии в дерматологии; клинику ремиссий и рецидивов при кожных болезнях и ИППП.</p>

Уровень 1	<p>современные методы лечения дерматозов и ИППП;</p> <p>основы клинической фармакологии;</p> <p>фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов, применяемых в дерматовенерологии;</p> <p>особенности лечения кожных заболеваний у женщин, лиц молодого и пожилого возраста;</p> <p>основные принципы лечения неотложных состояний в дерматологии; общую соматическую терапию и частные виды терапии распространенных дерматозов;</p> <p>основные принципы фито и рефлексотерапии в дерматологии; клинику ремиссий и рецидивов при кожных болезнях и ИППП.</p>
-----------	--

Уровень 2	<p>разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;</p> <p>обосновать лечебную тактику при терапии кожного больного с сопутствующим поражением сердечно-сосудистой системы, легких, хирургическим вмешательством;</p> <p>обосновать показания к назначению больному лекарственных средств; разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и противорецидивного лечения кожного больного; организовать и провести, с учетом современных данных, лечение дерматологических больных женщин, лиц молодого и пожилого возраста; реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами и пациентами;</p> <p>определить показания и осуществить при необходимости неотложную помощь при острых состояниях в дерматологии;</p> <p>провести комплексное лечение больного дерматовенерологического профиля с учетом психопатологического и соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, заместительной и поддерживающей терапии, лечебную физкультуру, физиотерапию, реабилитационные мероприятия;</p> <p>проводить обучающие занятия с больными, направленные на выработку мотивации к лечению, формированию у пациентов навыков улучшения способности к разрешению проблем;</p>
Уровень 3	<p>разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;</p> <p>обосновать лечебную тактику при терапии кожного больного с сопутствующим поражением сердечно-сосудистой системы, легких, хирургическим вмешательством;</p> <p>обосновать показания к назначению больному лекарственных средств; разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и противорецидивного лечения кожного больного; организовать и провести, с учетом современных данных, лечение дерматологических больных женщин, лиц молодого и пожилого возраста; реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами и пациентами;</p> <p>определить показания и осуществить при необходимости неотложную помощь при острых состояниях в дерматологии;</p> <p>провести комплексное лечение больного дерматовенерологического профиля с учетом психопатологического и соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, заместительной и поддерживающей терапии, лечебную физкультуру, физиотерапию, реабилитационные мероприятия;</p> <p>проводить обучающие занятия с больными, направленные на выработку мотивации к лечению, формированию у пациентов навыков улучшения способности к разрешению проблем;</p> <p>оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по предупреждению срывов и рецидивов заболевания;</p>
В	
Уровень 1	<p>навыками оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе; участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; планирования и организации лечебного процесса.</p>
Уровень 2	<p>навыками оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе; участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; планирования и организации лечебного процесса.</p> <p>разработки обоснованной схемы современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии кожных заболеваний.</p>
Уровень 3	<p>навыками оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе; участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; планирования и организации лечебного процесса;</p> <p>разработки обоснованной схемы современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии кожных заболеваний;</p> <p>выделения в состоянии больного группы дерматологических симптомов, требующих медикаментозного воздействия;</p> <p>учета фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств и возможности возникновения осложнений при их взаимодействии; обеспечения режима дозирования и частоты введения лекарственного средства</p> <p>обеспечения эффективного и безопасного применения лекарств; выбора базовых лекарственных средств при лечении больного на этапе ремиссии;</p> <p>обеспечения дерматологическому больному поддерживающего и противорецидивного лечения;</p> <p>транспортировки пациента в специализированную медицинскую организацию.</p>

В

	3
3.1.1	1.Общие знания:

3.1.2	законодательство Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере здравоохранения;
3.1.3	основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;
3.1.4	основы общей патологии человека;
3.1.5	основы иммунобиологии и реактивности организма;
3.1.6	основы и клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний;
3.1.7	основы современных классификаций кожных болезней и ИППП;
3.1.8	современные направления развития медицины;
3.1.9	вопросы экспертизы трудоспособности и законодательства Российской Федерации и Кыргызской республики по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации;
3.1.10	основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья населения;
3.1.11	основы медицинского страхования и деятельности медицинских организаций в условиях страховой медицины;
3.1.12	2.Специальные знания:
3.1.13	основы государственной системы профилактики кожных заболеваний и ИППП;
3.1.14	основы профилактики кожных заболеваний и санитарно-просветительной работы в дерматовенерологии;
3.1.15	принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения;
3.1.16	распространенность дерматологических заболеваний среди населения и в половозрастных группах, значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения;
3.1.17	современные методы обследования в дерматовенерологии;
3.1.18	клиническую классификацию кожных болезней и ИППП;
3.1.19	клинику распространенных дерматозов и ИППП;
3.1.20	экспертизу в дерматовенерологии;
3.1.21	современные методы лечения при кожных болезнях и ИППП;
3.1.22	основы клинической фармакологии;
3.1.23	фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов, применяемых в дерматовенерологии;
3.1.24	особенности лечения дерматозов у женщин, лиц молодого и пожилого возраста;
3.1.25	основные принципы лечения неотложных состояний в дерматологии;
3.1.26	общую терапию и частные виды терапии кожных заболеваний и ИППП;
3.1.27	основные принципы фито и рефлексотерапии в дерматологии;
3.1.28	клинику ремиссий и рецидивов дерматозов и ИППП;
3.1.29	принципы и методы реабилитации больных с кожными заболеваниями;
3.1.30	законодательство Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере дерматовенерологии;
3.1.31	систему организации дерматовенерологической помощи в стране;
3.1.32	задачи и структуру дерматовенерологической службы;
3.1.33	организацию и объем медицинской помощи на догоспитальном этапе при дермато-зах и ИППП;
3.1.34	учет, отчетность медицинских организациях дерматовенерологического профиля; организацию работы неотложной дерматологической помощи; 3.Знание сопутствующих и смежных дисциплин:
3.1.35	вопросы организации гигиенического воспитания и формирования здорового об-раза жизни у населения;
3.1.36	клинику, дифференциальную диагностику, терапию и профилактику кожных заболеваний;
3.1.37	методы терапии кожных заболеваний; основы профилактики и реабилитации в дерматовенерологии; организация дерматовенерологической помощи и законодательство Российской Федерации и Кыргызской Республики);
3.1.38	основы клиники, ранней диагностики и терапии инфекционных и паразитарных болезней, в том числе карантинных инфекций;
3.2.1	реанимационными мероприятиями (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца;
3.2.2	методами простейшего обезболивания;
3.2.3	методом определения групповой принадлежности крови;
3.2.4	методом катетеризации мочевого пузыря;
3.2.5	способами различного введения лекарственных средств (подкожно, внутримышеч-но, внутривенно);
3.2.6	методами индивидуального и группового консультирования;
3.2.7	методами реабилитации больных дерматовенерологического профиля;
3.2.8	формами и методами профилактики дерматозов и ИППП;

3.2.9	компьютерной техникой, возможностью применения современных информацион-ных технологий для решения профессиональных задач.
	В
3.3.1	владения основными моделями профилактики (медицинской, образовательной, психосоциальной);
3.3.2	организации условий для проведения профилактической работы в образовательной среде;
3.3.3	проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-серного наблюдения;
3.3.4	организации противоэпидемических мероприятий;
3.3.5	мониторинга за кожными болезнями и ИППП на участке обслуживания;
3.3.6	сбора сведений о численном, возрастном, половом, профессиональном составе больных с дерматозами на обслуживаемом участке;
3.3.7	выявления микросредовых факторов, способствующих формированию кожных болезней;
3.3.8	выявления значимых медицинских, психологических, социальных факторов, спо-собствующих развитию дерматозов и ИППП;
3.3.9	выявления половозрастных особенностей формирования дерматозов и ИППП;
3.3.10	мониторинга профилактической деятельности врачей-дерматовенерологов и оцен-ки эффективности профилактических программ;
3.3.11	выбора наиболее информативного способа лабораторной диагностики развивающегося патологического процесса;
3.3.12	обоснования назначения необходимого лабораторно-инструментального исследо-вания для определения степени и тяжести поражения внутренних органов и органов ЦНС;
3.3.13	опроса дерматовенерологического больного;
3.3.14	выявления характерных признаков и особенностей дерматологических симптомов и синдромов;
3.3.15	выявления особенностей формирования дерматозов;
3.3.16	проведения дифференциальной диагностики;
3.3.17	клинического обследования пациента при подозрении на инфекционное заболева-ние;
3.3.18	организации проведения необходимых исследований при подозрении на онкологическое заболевание;
3.3.19	формулировки диагноза при кожных и венерических болезнях в соответствии с требованиями международной классификации болезней;
3.3.20	организации условий для проведения освидетельствования на наличие кожного заболевания и ИППП;
3.3.21	выполнения требований к заполнению актов и протоколов освидетельствования на наличие кожного заболевания и ИППП;
3.3.22	проведения освидетельствования у человека, находящегося в тяжелом физическом состоянии;
3.3.23	формулировки заключения при проведении освидетельствования на наличие кож-ного заболевания;
3.3.24	оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе;
3.3.25	участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
3.3.26	планирования и организации лечебного процесса;
3.3.27	разработки обоснованной схемы современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;
3.3.28	выделения в состоянии больного группы симптомов, требующих медикаментозно-го воздействия;
3.3.29	учета фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств и возможности возникновения осложнений при их взаимодействии;
3.3.30	обеспечения режима дозирования и частоты введения лекарственного средства;
3.3.31	обеспечения эффективного и безопасного применения лекарств;
3.3.32	выбора базовых лекарственных средств при лечении больного на этапе ремиссии;
3.3.33	обеспечения дерматовенерологическому больному поддерживающего и противо-рецидивного лечения;
3.3.34	введения препаратов внутривенно;
3.3.35	желудочного зондирования и промывания желудка через зонд;
3.3.36	фиксации позвоночника, конечностей при переломах, травмах;
3.3.37	остановки кровотечения;
3.3.38	введения медикаментозных средств при купировании боли в сердце;
3.3.39	участия врача-дерматовенеролога в терапевтическом процессе, предупреждения социально-опасных действий со стороны больного;
3.3.40	мониторинга эффективности терапии дерматологических больных;
3.3.41	транспортировки пациента в специализированную медицинскую организацию;
3.3.42	оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе в медицинской эвакуации;

3.3.43	создания и поддержания реабилитационной среды и обеспечения реабилитационного процесса;
3.3.44	осуществления основных форм и методов реабилитационного процесса;
3.3.45	проведения поддерживающей и противорецидивной терапии;
3.3.46	обеспечения основных компонентов реабилитации;
3.3.47	консультирования пациентов и их родственников по вопросам реабилитации;
3.3.48	консультирования педагогов и специалистов по вопросам индивидуальной работы с учащимися, родителями;
3.3.49	осуществления методических приемов формирования специальных знаний, умений и навыков у пациентов дерматовенерологического профиля;
3.3.50	формирования способности у лиц, страдающих кожными и венерическими болезнями, к позитивным формам общения;
3.3.51	коррекции эмоционально-волевой сферы и проблем поведения у пациентов дерматовенерологического профиля;
3.3.52	формирования реальной жизненной перспективы у больного с психическим расстройством;
3.3.53	оформления медицинской документации
3.3.54	ведения документации при анонимном лечении;
3.3.55	обеспечения правил и порядка выдачи справок и других документов в медицинских организациях дерматовенерологического профиля;
3.3.56	организации волонтерской деятельности;

СТР КТ РА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОД ЛЯ

К	Н	С	Ч	К	Л	И	П
	Р О						
1.1	Анатомия и физиология кожи. Основы диагностики кожных болезней. Принципы лечения кожных болезней. /Лек/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
1.2	Принципы лечения кожных болезней. Комплексная терапия кожных болезней. Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. Симптоматическое лечение. Принципы реабилитации кожных больных. Общая терапия кожных больных. /Пр/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.3	Общая патология кожных болезней. Первичные и вторичные морфологические элементы кожи. Патогистологические изменения в коже. иммунитет и иммунопатологические процессы в коже. Инструментальные методы исследований в дерматовенерологии. /Пр/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л2.1 Л2.2	0	
1.4	Пиодермии. Чесотка. Педикулез. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика, принципы лечения. /Лек/	1	2	ПК-6 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	0	

1.5	Стафилодермии. Клинические формы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Стрептодермии. Смешанные пиодермии. Клинические формы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Хронические язвенные пиодермии. Клинические формы. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии. Паразитарные болезни кожи. Чесотка. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Клиника. Диагноз. Дифференциальная диагностика. Лабораторная диагностика. Лечение и профилактика. Фтириаз. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение и профилактика. /Пр/	1	6	ПК-5 ПК-6	Л1.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	0	
1.6	Лепра. Этиология и патогенез лепры. Эпидемиология лепры. Клиническая классификация лепры по Ридли-Джоплингу. Клинические формы лепры. Диагностика, лечение и профилактика лепры. Организация борьбы с лепрой. Лейшманиоз кожный. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника зоонозного лейшманиоза. Лейшманиоз кожный антропонозный. Межтипные клинические формы лейшманиоза. Иммунитет при лейшманиозе. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. /Ср/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.7	Поражения кожи при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции. Брюшной тиф. Сыпной тиф. Дифтерия. скарлатина. Паратифы А и В. Боррелиоз. Туляремия. Сибирская язва. Бруцеллез. бактериальная дизентерия. Листерииоз. Сап. Риносклерома. Лаймская болезнь. Этиология и патогенез. Классификация. Поражение кожи при Лаймской болезни. Лимфоцитомы. Хронический атрофический акродерматит. Клиника. Диагностика и лечение. Эризепеллоид. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. /Пр/	1	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	

1.8	Вирусные дерматозы. Этиология и патогенез. Герпес простой. Этиология и патогенез. Клинические формы. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение. Герпес опоясывающий. Этиология и патогенез. Клинические формы. Синдром Ханта. Синдром Бернара-Хорнера. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение. Бородавки. Этиология. Клиника. Клинические формы бородавок. Диагноз. Лечение. Кондиломы остроконечные. Клиника. Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна. Контагиозный моллюск. Клиника. Атипичные формы. Узелки доильщиц. Болезнь кошачьих царапин (фелиноз). Клиника. лечение. Клиника. диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. /Пр/	1	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.9	Грибковые заболевания кожи. Классификация микозов. Кератомикозы. Дерматомикозы. Кандидозы кожи и слизистых оболочек. Этиология и патогенез. Клиника. диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения грибковых болезней кожи и слизистых оболочек. /Пр/	1	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.10	Экзема. Этиология и патогенез. Клинические формы. диагностика. дифференциальная диагностика. принципы лечения. /Пр/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.11	Дерматиты и токсикодермии. Профессиональные болезни кожи. Синдром Лайелла. Этиология и патогенез. Клиника. диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии. /Ср/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.12	Атопический дерматит. Крапивница. Ангионевротический отек Квинке. Фотодерматозы. этиология и патогенез. Клинические формы. диагностика. дифференциальная диагностика. Принципы терапии. /Лек/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
1.13	Псориаз. Параспориоз Брока и лихены. Розовый лишай Жибера. /Пр/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
	Р В						
2.1	Сифилис, этиология и патогенез, классификация, иммунитет при сифилисе. Клинические формы, дифференциальная диагностика, лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики. /Лек/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
2.2	Первичный, вторичный и третичный сифилис, клиника, дифференциальная диагностика. Врожденный сифилис. Сифилис нервной системы. Экспериментальный сифилис. /Пр/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	

2.3	Гонорея.Этиология и патогенез.Классификация.Клиника.Осложнения гонореи.Орофарингеальная и аногенитальная гонорея.Лабораторная диагностика.Принципы лечения. /Ср/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
2.4	Негонококковые уретриты. Хламидиоз.Этиология и патогенез.Клиника.Лабораторная диагностика.Принципы лечения. /Ср/	1	4	ПК-5 ПК-6	Л1.4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
2.5	Микоплазменная инфекция.Мягкий шанкр.Этиология и патогенез.Клиника. лабораторная диагностика. Принципы лечения. /Ср/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
2.6	Трихомониаз.Гарднереллез.Этиология и патогенез.Клиника. лабораторная диагностика. Принципы лечения. /Ср/	1	2	ПК-5 ПК-6	Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	
2.7	Вирусные заболевания урогенитального тракта.Этиология и патогенез. Клиника. лабораторная диагностика. Принципы лечения. Кандидоз мочеполовых органов.Этиология и патогенез. Клиника.Лабораторная диагностика.Принципы лечения. /Ср/	1	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л2.1 Л2.2	0	

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

К

Знать:

- 1.Кожа как часть иммунной системы.
- 2.Кандидоз слизистой полости рта: причины возникновения, диагностика, лечение.
- 3.Простой контактный дерматит: причины возникновения, клиническая характеристика.
- 4.Критерии диагностики первичного сифилиса (с описанием клиники твердого шанкра).
- 5.Кровоснабжение кожи.
- 6.Общая характеристика стафилококковых пиодермий.
- 7.Гидраденит: этиология, клиника, лечение в разные стадии развития.
- 8.Особенности строения кожи у детей.
- 9.Рубромикоз стоп, кистей, ногтей: этиология, клиника, лабораторная диагностика.
- 10.Дайте понятие спонгиоза, вакуольной дегенерации, гиперкератоза. Какие изменения на коже возникают при этом, при каких заболеваниях встречаются?
- 11.Стрептококковое импетиго: клиника, лечение.
- 12.Токсикодермия: понятие, клинические проявления в зависимости от тяжести.
- 13.Строение дермы.
- 14.Чесотка: этиология, осложнение, диагностика.
- 15.Присыпки, примочки, взбалтываемые взвеси: их состав, показание к назначению, выписать рецепты.
- 16.Лечение микроспории гладкой кожи. Противозидемические мероприятия.
- 17.Дайте понятие акантоза, акантолиза, паракератоза. Какие изменения на коже возникают при этом, при каких заболеваниях встречаются?
- 18.Микроспория гладкой кожи: этиология, клиника, диагностика, лечение.
- 19.Терморегуляционная функция кожи
- 20.Отрубевидный лишай: клиника, диагностика, лечение.
- 21.Секреторная и экскреторная функции кожи.
- 22.Сквамозная, интертригинозная эпидермофития: этиология, диагностика, лечение.
- 23.Пятна: клинико-морфологическая характеристика.
- 24.Распространенная стрептодермия: этиология, клиника, лечение.
- 25.Лечение истинной экземы в период обострения.
- 26.Микроспория волосистой части головы: этиология, клиника, диагностика.
- 27.Микробная экзема: этиология, патогенез, клиника.
- 28.Поражение нервной и костной системы при раннем врожденном сифилисе.
- 29.Клинико-морфологическая характеристика пузырьков, гнойничков.
- 30.Клинико-морфологическая характеристика пузыря, волдыря.
- 31.Строение эпидермиса: функционально-гистологическая характеристика слоев.
- 32.Лечение межпальцевой и буллезной эпидермофитии стоп.
- 33.Патогенез атопического дерматита.
- 34.Клинические проявления себорейного дерматита, пиодермий при СПИДе.
- 35.Буллезная эпидермофития стоп: этиология, клиника, лечение.

36. Лечение рубромикоза стоп, кистей, ногтей.
37. Патогенез аллергодерматозов.
38. Фурункул верхней половины лица: этиология, клиника, осложнения, лечение.
39. Понятие ложного и истинного полиморфизма, лихенизации. Для каких заболеваний они характерны? Какие проявления на коже вызывают?
40. Фурункулез: причины развития, лечение.
41. Дифференциальная диагностика простого и аллергического контактного дерматита.
42. Понятие ложного и истинного полиморфизма, лихенизации. Для каких заболеваний они характерны? Какие проявления на коже вызывают?
43. Терморегуляционная функция кожи
44. Общая характеристика стрептококковых пиодермий. Стрептококковое импетиго: клиника, лечение.
45. Печесуха взрослых Гебры: Патогенез, клиника, лечение.
46. Секреторная и экскреторная функции кожи.
47. Кандидоз крупных складок: этиология, клиника, диагностика, лечение.
48. Хронический гранулематозный кандидоз, клиника, диагностика и лечение.
49. Клинические проявления диффузного нейродермита.
50. Пятна: клинко-морфологическая характеристика.
51. Кандидоз ногтевых валиков, ногтей: этиология, клиника, диагностика, лечение.
52. Пасты. Мази: их состав, механизм действия, выписать рецепты.
53. Клиника, диагностика, лечение чесотки, противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
54. Синдром Лайелла: этапность появления симптомов, лечение.
55. Дайте понятие спонгиоза, вакуольной дегенерации, акантолиза. Какие изменения на коже возникают при этом?
56. Критерии диагностики микроспории (с описанием клиники).
58. Клиника и рентгенологические изменения псориазического артрита, особенности лечения.
59. Рубромикоз ногтевых пластинок: клиника, диагностика, лечение.
60. Опоясывающий герпес: этиология, клиника, лечение. Синдром Ханта. Синдром Бернара-Хорнера. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение
61. Особенности строения и физиологии кожи детей. Понятие ложного и истинного полиморфизма, лихенизации. Для каких заболеваний они характерны?
62. Клинко-морфологическая характеристика бугорка, узла.
63. Дайте понятия ложного и истинного полиморфизма, лихенизации.
64. Простой герпес: этиология, клиника, диагностика, лечение.
65. Клинко-морфологическая характеристика пузыря, волдыря. При каких заболеваниях встречается
66. Лечение микроспории волосистой части головы.
67. Кровоснабжение кожи.
68. Антибактериальная функция кожи.
69. Вульгарные бородавки, остроконечные кондиломы: этиология, клиника, лечение.
70. Защита кожи от УФО. Дайте понятие акантоза, акантолиза. Какие изменения на коже они вызывают?
71. Отрубевидный лишай: этиология, клиника, диагностика, лечение.
72. Отек Квинке: этиология, клиника, лечение.
73. Рубец, рубцовая атрофия. Итогом каких патологических процессов являются?
74. Хронический гранулематозный кандидоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
75. Клиника, диагностика псориаза в прогрессивную стадию.
76. Кожа как часть иммунной системы.
77. Буллезная эпидермофития: этиология, клиника, лечение.
78. Особенности строения детской кожи.
79. Паховая эпидермофития: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.
80. Красный плоский лишай. Этиология, клинические формы, дифференциальная диагностика с псориазом, лечение.
81. Терморегуляционная и выделительная функции кожи.
82. Трихофития: классификация, клиника инфильтративно-нагноительной трихофитии, диагностика, лечение.
83. Дать понятие первичных и вторичных морфологических элементов, перечислить первичные и вторичные морфологические элементы. Волдырь, морфологическая характеристика, при каких заболеваниях встречается.
84. Классификация пиодермий. Отличия стрепто- и стафилодермий. Сикоз, причины возникновения, клиника, лечение.
85. Дать понятие паракератоза, гиперкератоза. Какие изменения на коже возникают при этом? При каких заболеваниях встречаются?
86. Специфическая и неспецифическая иммунотерапия при пиодермиях. Показания к назначению.
87. Истинная экзема: этиология, клиника, лечение.
88. Клинко-морфологическая характеристика папул.
89. Лаймская болезнь. Этиология и патогенез. Классификация. Поражение кожи при лаймской болезни. Лимфоцитома. Хронический атрофический акродерматит. Клиника. Диагностика и лечение.
90. Эризмеллоид. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.
91. Кожный зуд. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.
92. Печесуха узловатая Гайда. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика.
93. Крапивница. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
94. Парасориаз Брока. Этиология и патогенез. Клинические формы. Гистопатология. Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.

95. Особенности строения и физиологии кожи детей. Понятие ложного и истинного полиморфизма, лихенизации. Для каких заболеваний они характерны?
96. Розовый лишай Жибера: этиология, клиника, лечение.
97. Лепра. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Реактивные фазы лепры. Диагноз. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
98. Лейшманиоз кожный. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника зоонозного лейшманиоза. Лейшманиоз кожный антропонозный. Межтипные клинические формы лейшманиоза. Иммунитет при лейшманиозе. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
99. Поражение нервной и костной системы при раннем врожденном сифилисе.
100. Поздний врожденный сифилис: достоверные (описать проявления) и вероятные признаки. Критерии постановки диагноза врожденного сифилиса.
101. Клиника и дифференциальная диагностика сифилитической розеолы и сифилитической ангины.
102. Поражение костной системы при раннем врожденном сифилисе.
103. Сифилитическая пузырчатка: клиника, лабораторные методы диагностики, дифференциальная диагностика.
104. Вирусные заболевания при СПИДе.
105. Понятие профилактического и превентивного лечения сифилиса. Показания к их назначению.
106. Механизмы развития иммунной супрессии при ВИЧ-инфекции
107. Скрытый сифилис: понятие, классификация, критерии диагностики
108. Клиника пятнистого и папулезного сифилида кожи и слизистых.
109. Особенности кандидозной и пиогенной инфекции при СПИДе.
110. Сифилитическая ангина. Дифференциальная диагностика, диагностика.
111. Дифференциальная диагностика папулезного сифилида и широких кондилом.
112. Дифференциальная диагностика широких кондилом.
113. Атипичные формы твердого шанкра. Дифференциальная диагностика.
114. Сущность серологических реакций при сифилисе: RW, ИФА, РИБТ, РПГА, реакция иммуноблотинга, ПЦР.
115. Общее течение сифилиса. Иммунитет и аллергия.
116. Дифференциальная диагностика папулезного сифилида.
117. Болезнь Рейтера: этиология, клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная диагностика с другими поражениями суставов, лечение.
118. Хламидийный уретрит: этиология, клиника, диагностика, лечение. Донованоз. Этиология. Патогенез. Клиника, лечение.
119. Лечение гонорейного уретрита.
120. Саркома Капоши у больных СПИДом.
121. Клиника, принципы лечения восходящей гонореи и гонореи нижних отделов мпс.
122. Клиника, осложнения твердого шанкра.
123. Поражение внутренних органов при первичном и вторичном сифилисе.
124. Патогенез гонорейного уретрита.
125. Урогенитальный кандидоз. Клиника. Диагностика. Лечение.
126. Дифференциальная диагностика твердого шанкра.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБУЧЕННОСТИ УМЕТ :

На курируемом пациенте необходимо:

1. Собрать и анализировать генеалогический анамнез, анамнез жизни и заболевания.
2. Выбрать факторы риска возникновения заболевания.
3. Провести полное клиническое обследование больного. Сформулировать предварительный диагноз.
4. Своевременно определить синдромы, требующие оказания неотложной помощи.
5. Назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, дать оценку их результатов.
6. Решить вопрос о необходимости дополнительных специальных исследований и консультаций специалистов.
7. В комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструментальных и функциональных исследований, заключений специалистов.
8. Поставить клинический диагноз в соответствии с международной классификацией заболеваний.
9. Назначить лечение, контролировать его результаты, проводить коррекцию. Установить объем помощи при неотложных состояниях и последовательность её оказания.
10. Провести реабилитационные мероприятия с проведением традиционных и нетрадиционных методов.
11. Кратко резюмировать этиологию, патогенез, клинику и лечение дерматоза по современным данным литературных источников.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

1. Современные аспекты патогенеза, клиники и лечение пиодермий.
2. Глубокие микозы клиника и лечение.
3. Псориаз (вопросы патогенеза, клиники и современные методы лечения).
4. Особенности клинических проявлений дерматомикозов. Дерматомикозы, передающиеся половым путем.
5. Современные методы лечения чесотки и фтириаза.
6. Негонококковые уретриты (хламидиоз, вопросы патогенеза, клиника и современные методы лечения).
7. Негонококковые уретриты (микоплазмозы, вопросы патогенеза, клиника и современные методы лечения).
8. Современная лабораторная диагностика сифилиса.
9. Вирусные дерматозы (патогенез, классификация, клиника и современные методы лечения).

Т

Написание курсовой работы не предусмотрено.

Ф

ФРОНТАЛ НЫЙ ОПРОС. Перечень вопросов в приложении .

ТЕСТЫ.

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов)

Выберите один правильный ответ:

1.Базальный слой состоит из:

- а)одного слоя цилиндрических клеток
- б)3-8 рядов цилиндрических клеток
- в)одного ряда кубических клеток
- г)эластических волокон
- д)клеток Лангерганса

2.Меланоциты входят в состав:

- а)базального слоя
- б)шиповатого слоя
- в)зернистого слоя
- г)блестящего слоя
- д)рогового слоя

3.Акантоз это:

- а)потеря связи между эпидермальными клетками
- б)утолщение рогового слоя
- в)утолщение зернистого слоя
- г)неполное ороговение клеток
- д)увеличение количества рядов клеток шиповатого слоя

4.К первичным морфологическим элементам кожной сыпи не относят:

- а)пятно
- б)бугорок
- в)узел
- г)волдырь
- д)эрозию

5.Примочки оказывают следующее действие:

- а)согревающее
- б)противовоспалительное
- в)дезинфицирующее
- г)кератолитическое
- д)иммуномодулирующее

6.Какое действие оказывают лаки:

- а)кератолитическое
- б)согревающее
- в)противовоспалительное
- г)антигистаминное
- д)акарицидное

7.Назовите осложнения антибиотикотерапии:

- а)анафилактический шок
- б)витилиго
- в)алопеция
- г)повышение артериального давления
- д)сахарный диабет

8.При образовании волдыря возникают:

- а)инфильтрация дермы
- б)отек сосочкового слоя дермы
- в)расширение сосудов
- г)акантоз
- д)правильно а) и в)

9.Предрасполагающими факторами в развитии пиодермии не являются:

- а)наличие на коже микроорганизмов
- б)иммунодефицит
- в)повреждение кожи
- г)сахарный диабет
- д)несбалансированное питание

10.К стафилодермиям относят:

- а)фолликулит
- б)простой лишай лица
- в)импетиго
- г)эктима
- д)заеда

11. К стрептодермиям относят:

- а) сикоз
- б) импетиго
- в) остеофолликулит
- г) гидраденит
- д) карбункул

12. Назовите преимущественную локализацию гидраденита:

- а) лицо
- б) кисти
- в) волосистая часть головы
- г) подмышечные ямки
- д) голени

13. Развитию глубоких хронических рецидивирующих пиодермий способствует:

- а) сахарный диабет
- б) ожирение
- в) онихомикоз
- г) витаминотерапия
- д) прием кетоконазола

14. Укажите наиболее характерный признак простого герпеса:

- а) хроническое длительное течение без периодов ремиссий
- б) склонность к рецидивированию
- в) возникновение рецидивов после нервного перенапряжения
- г) начало заболевания преимущественно в пожилом возрасте
- д) провоцирующее воздействие нарушений в диете

15. Укажите препараты, которые применяются для лечения простого герпеса:

- а) преднизолоновая мазь
- б) целестодерм с гирамицином
- в) салициловая мазь
- г) синтомициновая эмульсия
- д) крем «Ацикловир»

16. Для контагиозного моллюска характерны, все перечисленные признаки, кроме:

- а) микровезикул
- б) узелков
- в) пупковидное вдавление в центре папулы
- г) выделения творожистой массы при сдавливании элементов пинцетом
- д) изъязвления

17. Укажите клинические проявления на коже, патогномичные для неосложненной чесотки:

- а) эктима
- б) чесоточный ход
- в) папула
- г) розеола
- д) волдырь

18. Какие участки тела у взрослых не поражаются чесоткой?

- а) межпальцевые складки кистей
- б) молочные железы
- в) генитальная область
- г) лицо
- д) кожа бедер

19. Профилактика грибковых заболеваний кожи включает:

- а) выявление источников заражения, их изоляцию и дезинфекцию помещения
- б) ветеринарный надзор за животными
- в) обследование контактов
- г) периодический медицинский осмотр персонала, подверженного грибковым заболеваниям (детские и бытовые учреждения)
- д) все перечисленное

20. Грибковые заболевания кожи вызываются всеми перечисленными возбудителями, кроме:

- а) эпидермофитонов
- б) трихофитонов
- в) палочек Ганзена
- г) микроспорумов
- д) дрожжеподобных грибов

21. Для хронической трихофитии волосистой части головы характерны:

- а) крупные очаги, сплошное поражение волос
- б) мелкие очаги с симптомом «черных точек»
- в) белая муфта у основания волос
- г) четкие очертания очага
- д) выраженные воспалительные явления в очагах

22. Волосы обламываются на уровне 5- 8 мм от поверхности кожи:

- а)при микроспории
б)при фавусе
в)при поверхностной трихофитии
г)при трихофитии инфильтративно-нагноительной
д)при алопеции
23. Укажите клинические формы кандидоза:
а)кандидоз складок кожи
б)кандидоз слизистых оболочек
в)висцеральный кандидоз
г)хронический генерализованный кандидоз
д)все перечисленное
24. Для местного лечения кандидоза применяют:
а)раствор буры (10 %-20 %) в глицерине
б)мазь преднизолоновая
в)мази: бонафтоновую, оксолиновую, теброфеновую
г)мазь тетрациклиновая 0,1%
д)гиоксизон
25. Укажите клинические формы дерматита:
а)солнечный дерматит
б)горшочный дерматит
в)простой контактный дерматит
г)аллергический контактный дерматит
д)верно все
26. Для аллергического контактного дерматита характерно все, кроме:
а)эритема
б)мокнутые
в)эрозии
г)пузырьки
д)пустулы
27. Синдром Лайелла характеризуется следующими клиническими симптомами:
а)эозинофилией
б)лихорадкой
в)благоприятным исходом
г)положительным симптомом Никольского
д)верно б,г
28. Общие признаки экземы, все кроме:
а)симметричность высыпаний
б)острое начало
в)дермографизм красный
г)атопический синдром
д)эволюционный полиморфизм
29. Какое патоморфологическое изменение является характерным для экземы:
а)папилломатоз
б)гранулез
в)агранулез
г)спонгиоз
д)акантолиз
30. К профессиональным стигмам относятся:
а)узелки доильщиц
б)омозолелости
в)поздняя рентгеновская лучевая язва
г)эризипеллоид
д)сибирская язва
31. При кожном зуде для уточнения диагноза не назначают следующие лабораторные исследования:
а)глюкозы крови
б)биохимический анализ крови
в)на LE-клетки
г)кала на яйца глистов
д)спинномозговой жидкости
32. Больному атопическим дерматитом не назначают: а) санаторно-курортное лечение
б)кисломолочные продукты
в)седативные препараты
г)прием препаратов кальция
д)диету, богатую фруктами, ягодами, овощами
33. В классификации атопического дерматита выделяют:
а)5 клинических форм, 3 возрастных периода
б)3 степени тяжести
в)5 возрастных периода

- г) 2 степени активности
д) 5 форм по этиологическому фактору
34. Для местного лечения ограниченного нейродермита применяются мази, содержащие:
- а) глюкокортикоиды
 - б) акарицидные вещества
 - в) антибиотики
 - г) противогрибковые препараты
 - д) цитостатики
35. Для детской чесотки не характерно:
- а) сильный зуд с невротическими расстройствами
 - б) серозные корки, экскориации
 - в) поражение ладоней и подошв
 - г) поражение разгибательных поверхностей конечностей
 - д) увеличение периферических лимфатических узлов
36. Первичный элемент при острой крапивнице:
- а) пятно
 - б) волдырь
 - в) пузырь
 - г) узелок
 - д) бугорок
37. Первичные элементы при псориазе:
- а) узлы
 - б) волдыри
 - в) папулы
 - г) бугорки
 - д) пятна
38. Для псориаза патогномичны все симптомы кроме:
- а) феномен Кебнера
 - б) «терминальной пленки»
 - в) «стеаринового пятна»
 - г) «яблочного желе»
 - д) «кровавой росы»
39. Для розового лишая характерно появление:
- а) пузырей
 - б) пустул
 - в) волдырей
 - г) материнской бляшки по типу медальона
 - д) пятен лилового цвета
40. Феномен Кебнера выявляется в следующих стадиях псориаза:
- а) прогрессирующей
 - б) стационарной
 - в) регрессирующей
 - г) ремиссии
 - д) во всех стадиях

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.

Задача 1

К дерматологу обратилась женщина 40 лет с жалобами на зуд анальной области в течении 3-х лет. лечится самостоятельно: ванночки с травами, смазывание синтомициновой эмульсией. Улучшение не значительное. Из анамнеза установлено, что больная страдает хроническими запорами.

Объективно: в области анальных складок трещинка, складки утрированы, поверхность их инфильтрирована, мацерированна, процесс переходит на промежность. Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Назовите предрасполагающие факторы.
3. Назначьте лечение.

Задача 2

У больного при мед.осмотре обнаружены очаги на гладкой коже и волосистой части головы. На волосистом покрове головы 3 очага без воспалительных явлений. В пределах которых волосы обломлены на одинаковом уровне, муковидное шелушение. В области груди несколько округлых очагов размером 0,5 x 0,7 до 1,5 x 1,5 см, с ярким периферическим венчиком, гиперемией и шелушением в центре.

Вопросы:

1. Ваш предлагаемый диагноз?
2. перечислите методы, которые могут уточнить диагноз?
3. В 1-4 классах школы обучаются 250 школьников. Всех необходимо осмотреть. При подозрении грибкового заболевания, каким методом желательно пользоваться?

Эталон ответа:

дерматофития гладкой кожи и волосистой части головы.

Всех школьников необходимо осмотреть кожные покровы и волосистую часть головы. Волосистую часть головы

осмотреть под лампой Вуда.
П
Фронтальный опрос Тесты Ситуационная задача Доклад с презентацией Курация, обследование и лечение больного

ЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОД ЛЯ

Р

О

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	М.К.Балтабаев	Частная дерматология: Учебник	Бишкек: Изд-во КPCY 2013
Л1.2	Бутов .С., Скрипкин .К., Иванов О.Л.	Дерматовенерология. Национальное руководство: Учеб. пособие	М.: ГЭОТАР-Медиа 2013
Л1.3	Скрипкина .К., Бутова .С. М	Клиническая дерматовенерология в 2 т. : Дерматовенерология	ГЭОТАР – Медиа 2009
Л1.4	А.И. Якубович, А.Р. Корепанов	Урогенитальный хламидиоз	Иркутск.: РИЭЛ 2007
Л1.5	.К. Скрипкин	Кожные и венерические болезни: Учебник для врачей и студ. мед. вузов	Москва .: Триада-фарм 2001
Л1.6	Родионов А.Н.	Сифилис: Рук-во для врачей.	Санкт-Петербург: Питер 1997

Д

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	К.Н. Суворова, А.А. Антоньев, Н.П. Кузнецова, И.О. Малова	Кожные и венерические болезни у детей	Иркутск.: Изд-во Иркут. ун-та 1995
Л2.2	.К. Скрипкин, А.Л. Машкиллейсон, Г.Я. Шарапова	Кожные и венерические болезни: Учебник для мед. вузов	
Л2.3	Токтоматова А.Н.	Сифилис у беременных женщин: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук	Бишкек 2006

П

К

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии: Для организации изучения дисциплины используются репродуктивные образовательные технологии, к которым относятся пояснительно иллюстративные лекции, объяснительно-разъяснительные практические занятия. Решение ситуационных задач и разбор историй болезней по нозологиям.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии:интерактивная форма образовательной технологии - даются темы для изучения, контроль которых производится в виде презентаций-докладов с использованием мультимедиа.Обходы профессора и преподавателей кафедры в клинических отделениях, демонстрация и разбор больных.
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии:самостоятельное использование ординатором компьютерной техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы.

П

6.3.2.1	Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
6.3.2.2	Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: http:// .cni i.ru/
6.3.2.3	Национальный сервер дерматологии: http:// .dermatology.ru/
6.3.2.4	Вестник дерматологии и венерологии: http:// . estni d .ru/
6.3.2.5	Российский журнал кожных и венерических болезней: http:// .medlit.ru/
6.3.2.6	Consilium medicum: дерматология/ http://dermatology.con-med.ru/
6.3.2.7	Клиническая дерматология и венерология: http:// .mosderm.ru/
6.3.2.8	Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
6.3.2.9	PubMed/ https:// .ncbi.nlm.nih.go /

МАТЕРИАЛ ПО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОД ЛЯ	
7.1	Лекционные аудитории на 50 посадочных мест на базе Республиканского Центра Дерматовенерологии (кафедра Дерматовенерологии и Фтизиатрии).
7.2	Учебные аудитории для проведения практических занятий 3 учебные аудитории на базе Республиканского Центра Дерматовенерологии (кафедра Дерматовенерологии и Фтизиатрии).
7.3	Специально оборудованные аудитории и учебные кабинеты с комплексом учебно-методического обеспечения на базе Республиканского Центра Дерматовенерологии (кафедра Дерматовенерологии и Фтизиатрии).
7.4	Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростометр).
7.5	Противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий,облучатель бактерицидный) и расходным материалом.(На базе Республиканского Центра Дерматовенерологии).
7.6	Мультимедийный комплекс (ноутбук,проектор).
7.7	Набор слайдов по реализуемым тематикам и мультимедийные лекции.
7.8	Учебные таблицы.
7.9	Учебные плакаты и стенды.

МЕТОДИЧЕСКИЕ КАЗАНИЯ ДЛЯ ОБ ЧА ЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ МОД ЛЯ
<p>Технологическая карта дисциплины в ПРИЛОЖЕНИИ 2</p> <p>МОДУЛ ЊЫЙ КОНТРОЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВКЛ ЧАЕТ:</p> <p>1.Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (лекциях, практических, в том числе учитывается посещение и активность) и выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы</p> <p>2.Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля.</p> <p>3.Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой зачетных модулей.</p> <p>ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛ</p> <p>При явке на зачѣт ординаторы обязаны иметь при себе зачѣтные книжки, которые они предъявляют экзаменатору в начале зачета.</p> <p>Научно-педагогическому работнику предоставляется право поставить зачѣт без опроса по билету тем ординаторам, которые набрали более 60 баллов за текущий и рубежный контроли.</p> <p>На промежуточном контроле ординатор должен верно ответить на теоретические вопросы билета и выполнить ситуационные задания.</p> <p>Ординаторы могут использовать технические средства, справочно-нормативную литературу, наглядные пособия, учебные программы.</p> <p>Оценка промежуточного контроля:</p> <p>-min 20 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТ (в случае, если при ответах на заданные вопросы студент правильно формулирует основные понятия)</p> <p>-20-25 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТ и ВЛАДЕТ (в случае, если ординатор правильно формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению)</p> <p>-25-30 баллов - Задания для проверки уровня обученности УМЕТ и ВЛАДЕТ (в случае полного выполнения контрольного задания).</p> <p>МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:</p> <p>Обучение складывается из аудиторных занятий (72ч.), включающих лекционный курс (8ч.), практические занятия (40ч.), и самостоятельной работы (24ч.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по определенным нозологическим формам при дерматовенерологической патологии. В изучении кожных болезней и ИППП необходимо широко использовать курацию и ведение больных, клинические разборы и освоение практических навыков работы с больным. Практические занятия проводятся в виде усного опроса, работы у постели больного, демонстрации тематического видеоматериала и других наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых заданий, разбора клинических примеров, проведения деловых ролевых игр.</p> <p>При разборе нозологических форм кожных болезней и ИППП рекомендовано придерживаться следующей последовательности:</p> <p>-определение:</p> <p>-актуальность изучаемой нозологической формы и история изучаемого вопроса;</p> <p>-эпидемиология;</p> <p>-этиология;</p> <p>-патогенез, роль экзогенных и эндогенных, в том числе генетически факторов в развитии заболевания, наличие сопутствующей патологии, патоморфология;</p> <p>-клиническая картина;</p> <p>-критерии оценки степени тяжести течения в разные периоды болезни;</p> <p>-осложнения;</p>

- возможные исходы, критерии выздоровления, развития хронического течения, причины летальных исходов;
- лабораторная диагностика;
- критерии постановки диагноза в разные периоды заболевания;
- дифференциальный диагноз;
- лечение - этиологическое, патогенетическое, симптоматическое с учетом возраста и тяжести течения заболевания, оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в дерматологической патологии, лечение тяжелых форм заболеваний, лечение и профилактика возможных осложнений, лечение в условиях стационара и в амбулаторных условиях);
- диспансеризация, реабилитация;
- мероприятия в очаге при выявлении заразных кожных заболеваний и ИППП;
- профилактика.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО необходимо широкое использование в учебном процессе активных форм проведения занятий (разбор конкретных клинических ситуаций, выполнение заданий поисково-исследовательского характера при помощи интернет – ресурсов и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 10% аудиторных занятий.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРОВ:

подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных медицинских сайтах); выполнение заданий поисково-исследовательского характера с помощью интернет- ресурсов; подготовка конспектов, выступлений на семинаре, рефератов, мультимедийных презентаций. Самостоятельная работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах отводимых на СРС часов. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к учебно-методическому кабинету кафедры и библиотечным фондам ВУЗа.

По каждому разделу на кафедре разработаны методические рекомендации для ординаторов, а также методические указания для научно-педагогических работников.

Работа ординатора в группе формирует чувства коллективизма, личной ответственности и коммуникабельность. Необходимо уделять внимание формированию навыков общения с больным. Работа с пациентами способствует формированию деонтологического поведения, аккуратности, дисциплинированности.

Исходный уровень знаний ординаторов на зачетном занятии определяется тестированием по всем пройденным темам в виде компьютерного тестирования или с применением бумажных носителей; и устным опросом по всем пройденным темам цикла «дерматовенерология». Текущий контроль усвоения предмета определяется в ходе практических занятий комплексным путем на основании устного опроса, во время клинических разборов больных, при решении типовых ситуационных задач, фото-задач и тестовых контрольных заданий.

Вопросы по дерматовенерологии включены в Итоговую государственную аттестацию ординаторов по специальности «Инфекционные болезни».

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА. Эталоны ответов

Задача 1.

К Вам обратился больной с жалобами на зуд области туловища, усиливающийся в вечернее и ночное время. Объективно: на коже туловища, особенно в паховой и поясничной области, в межпальцевых промежутках пальцев кистей, локтевом суставе мелкие папуло-везикулярные элементы, эксфолиации, геморрагические корочки.

Задание:

1. Назовите алгоритм обследования.
2. Предположительный диагноз.
3. Определите лечебную тактику.
4. Проведите дифференциальную диагностику.
5. Назовите возможные варианты лечения.

Эталон ответа:

1. Соскоб с очагов на чесоточный клещ и просмотр патологического материала под световым микроскопом.
2. Паразитарный дерматоз.
3. Сбор эпидемиологического анамнеза, выявление контактных лиц, дезинфекция одежды, нательного белья, оповещение СЭС, выбор способа лечения.
4. Дифференциальная диагностика: пруриго, хроническая экзема, распространенный нейродермит Брока-Жаке.
5. Противоскабиозная, антигистаминная и десенсибилизирующая терапия.

Задача 2

У больного при мед.осмотре обнаружены очаги на гладкой коже и волосистой части головы. На волосистой части головы 3 очага без воспалительных явлений. В пределах которых волосы обломлены на одинаковом уровне, муковидное шелушение. В области груди несколько округлых очагов размером 0,5 x 0,7 до 1,5 x 1,5 см, с ярким периферическим венчиком, гиперемией и шелушением в центре. Вопросы:

Задание:

1. Ваш предлагаемый диагноз?
2. перечислите методы, которые могут уточнить диагноз?
3. В 1-4 классах школы обучаются 250 школьников. Всех необходимо осмотреть. При подозрении грибкового заболевания, каким методом желательно пользоваться?

Эталон ответа:

1. Микоз гладкой кожи и волосистой части головы (трихофития, микроспория)
2. Бактериологический метод (исследование чешуек волос)

3. Культурным методом исследование в мазках Вуда (микроспория - зеленое свечение, трихофития - свечения нет)

ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. Правила подготовки и написание:

Устное выступление-доклад должен представлять собой не пересказ чужих мыслей, а попытку самостоятельной проблематизации и концептуализации определенной, достаточно узкой и конкретной темы. Все имеющиеся в работе сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в Интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий список всех использованных источников.

Подготовка доклада к занятию.

Основные этапы подготовки доклада:

- выбор темы;
- консультация преподавателя;
- подготовка плана доклада;
- работа с источниками и литературой, сбор материала;
- написание текста доклада;
- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность ординатора к выступлению;
- выступление с докладом, ответы на вопросы.

Тематика доклада предлагается преподавателем в ФОС.

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы ординаторов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков ординатора по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у ординаторов навыки работы на компьютере.

Материалы-презентации готовятся ординатором в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.

Требование к ординаторам по подготовке презентации и ее защите на занятиях в виде доклада.

1. Тема презентации выбирается ординатором из предложенного списка ФОС и должна быть согласована с научно-педагогическим работником и соответствовать теме занятия.

2. Этапы подготовки презентации

Составление плана презентации (постановка задачи; цели данной работы)

Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать вручную на бумаге), при этом важно ответить на вопросы:

-как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации?

-что будет на слайде?

-что будет говориться?

-как будет сделан переход к следующему слайду?

3. Изготовление презентации с помощью Microsoft PowerPoint:

-Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам ординатор - докладчик подошёл спустя рукава.

-Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.

-Количество слайдов не более 30.

-Оптимальное число строк на слайде от 6 до 11.

-Распространённая ошибка читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи.

-Оптимальная скорость переключения один слайд за 1–2 минуты.

-Приветствуется в презентации использовать больше рисунков, картинок, формул, графиков, таблиц. Можно использовать эффекты анимации.

-При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему столбцы.

-Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада невозможно.

-В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими словами время дорого.

-Любая фраза должна говориться за чем-то. Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление.

-Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо.

-Если на слайде много формул, рекомендуется набирать его полностью в Microsoft Word (иначе формулы приходится размещать и выравнивать на слайде вручную). Для этого удобно сделать заготовку пустой слайд с одним большим Word-объектом «Вставка / Объект / Документ Microsoft Word», подобрать один раз его размеры и размножить на нужное число слайдов.

Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится издали. Обязательно установите в MathType основной размер шрифта равным основному размеру шрифта в тексте.

Никогда не выравнивайте размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок.

4. Ординатор обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время научно-педагогическим работником, и в срок.

5. Инструкция докладчикам.

-сообщать новую информацию;

-использовать технические средства;

-знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;

-уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;

-четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; дискуссия - 5 мин.;

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:

-название презентации;

-сообщение основной идеи;

-современную оценку предмета изложения;

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

-живую интересную форму изложения;

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио - визуальных и визуальных материалов. Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУРАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО.

1. Теоретическая подготовка к курации больного (ознакомление с тематикой дерматоза, страдающего больного).

2. Соблюдение режима и выполнение правил, установленные, Республиканским Центром Дерматовенерологии (РЦДВ) для нахождения ординаторов в стационаре клиники.

3. Распределение пациентов среди ординаторов один ординатор на двух- трех больных.

4. Установление доверительного контакта с пациентом.

5. Сбор жалоб и анамнеза болезни и жизни больного.

6. Терапевтический осмотр и обследование больного по системам внутренних органов.

7. Осмотр и описание дерматологического статуса.

8. Постановка предварительного диагноза.

9. Сбор лабораторных данных исследования больного.

10. Проведение дифференциального диагноза дерматоза.

11. Постановка клинического диагноза.

12. Определение тактики предполагаемого лечения.

13. Написание дневников, этапного или выписного эпикриза в истории больного.

14. Краткое резюме по этиологии, патогенезу, клинике и лечению дерматоза по современным данным литературных источников.

15. Обсуждение истории болезни в группе среди ординаторов и с научно-педагогическим работником кафедры.

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА

1. В одном тестовом задании 50 закрытых вопросов.
2. К заданиям даются готовые ответы на выбор, один правильный и остальные неправильные.
3. Обучающемуся необходимо помнить: в каждом задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть.
4. За каждый правильно ответ – 2 балла
5. Общая оценка определяется как сумма набранных баллов.
6. Отметка (в %).

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1. Поставить правильный диагноз - 25%.
2. Выбрать правильный план обследования – 25%.
3. Провести дифференциальную диагностику – 25%.
4. Назначить правильное лечение – 25%.

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ

1. Ознакомиться с тематикой дерматоза, страдающего больного – 5 %.
2. Выполнить правила, установленные Республиканским Центром дерматовенерологии (РЦДВ) -5%
3. Установить доверительный контакт с пациентом - 5%.
4. Произвести сбор жалоб анамнеза болезни и жизни пациента – 5%.
5. Произвести терапевтический осмотр и обследование пациента по системам внутренних органов - 10%.
6. Описать дерматологический статус – 15%.
7. Поставить предварительный диагноз – 5%.
8. Собрать лабораторные данные исследования – 5% .
9. Провести дифференциальный диагноз дерматоза – 10%.
10. Поставить клинический диагноз – 15%.
11. Определить тактику предполагаемого лечения – 10% .
12. Написать дневники этапного или выписного эпикриза в истории больного – 5%.
13. Кратко резюмировать этиологию, патогенез, клинику и лечение дерматоза по современным данным литературных источников – 5 % .

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

	Н	О
ФОРМА		10
1	Деление текста на введение, основную часть и заключение	0-5
2	Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей	0-5
СОДЕРЖАНИЕ		50
1	Соответствие теме по разделу дерматовенерологии	0-10
2	Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю	0-10
3	Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами по этиологии, патогенезу, клинике и лечению кожного больного или пациента, страдающего ИППП.)	0-15
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной Части	0-15
ПРЕЗЕНТАЦИЯ		25
1	Титульный лист с заголовком по разделу дерматовенерологии	0-2
2	Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графики)	0-5

3	Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи ясно изложены и структурированы, раскрывающие основные моменты этиологии, патогенеза, клиники и лечения дерматоза.	0-10
4	Слайды представлены в логической последовательности	0-5
5	Слайды распечатаны в формате заметок	0-3
ДОКЛАД		15
1	Правильность и точность речи во время защиты	0-5
2	Широта кругозора (ответы на вопросы)	0-5
3	Выполнение регламента	0-5
В		С

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

ЗНАТ

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТ учитываются следующие критерии:

1. Знание основных разделов общей, частной дерматологии и венерологии.
2. Глубина и полнота раскрытия вопроса.
3. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.
4. Умение объяснить сущность этиологии патогенеза кожных и венерических болезней, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
5. Владение логичностью и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные дополнительные вопросы.

Отметкой **(16-)** оценивается ответ, который изложен логически правильно доступной форме соответственно терминологии применяемой в дерматовенерологии, а также в целом в медицине; отличные знания о этиологии и патогенезе дерматозов; глубоко разбирается в статистике основных вопросов по эпидемиологии (заболеваемость, распространение инфекций, передающихся половым путем - ИППП); свободно ориентироваться в основных клинических симптомах дерматозов, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза кожных и венерических болезней.

Отметкой **(10-)** оценивается ответ, который показывает прочные знания в вопросах общей и частной дерматовенерологии, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза дерматозов и инфекций, передающихся половым путем, не достаточно глубокие знания этиологии и патогенеза дерматозов и ИППП; средне разбирается в статистике основных вопросов (заболеваемость и распространение ИППП); свободно ориентироваться в основных клинических симптомах дерматозов и ИППП, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза кожных и венерических болезней.

Отметкой **(5-)** оценивается ответ, который показывает средние знания в вопросах общей и частной дерматовенерологии, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза кожных болезней и ИППП, средние знания о этиологии и патогенезе дерматозов и ИППП; не глубоко разбирается в статистике основных вопросов (заболеваемость и распространение); относительно свободно ориентироваться в основных симптомах, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза дерматозов и ИППП.

Отметкой **(1-)** оценивается ответ, который показывает очень слабые знания в вопросах общей и частной дерматовенерологии, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза дерматозов и ИППП; плохо знания о этиологии и патогенезе кожных и венерических болезней; не разбирается в статистике основных вопросов (заболеваемость и распространение); относительно свободно ориентироваться в основных клинических симптомах, особенностей клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и прогноза кожных и венерических болезней, допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

КАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

МЕТ ВЛАДЕТ

При оценке ответов на проверку уровня обученности УМЕТ и ВЛАДЕТ учитываются следующие критерии:

Отметкой **(8-** , оценивается ответ, при котором ординатор ставит постановку диагноза дерматоза самостоятельно; оценивает альтернативные решения для диагностики и лечения дерматозов и ИППП; профессионально выражает и обосновывает свою позицию по основным клиническим нозологиям, по организации и структуре дерматовенерологической службы, по современным подходам в комплексном лечении дерматозов (этиотропная и патогенетическая терапия, физиотерапия, лучевая диагностика и терапия); глубоко выявляет степень и характер поражения органов и систем при различных дерматозах и ИППП; отлично выявляет причинно-следственные связи в этиологии и патогенезе развития кожных и венерических болезней; умеет анализировать и аналитически мыслить при постановке диагноза, дифференциальной диагностике и назначении терапии при различных дерматозах и ИППП.

Отметкой **(4-** , оценивается ответ, при котором ординатор ставит постановку диагноза кожного заболевания самостоятельно, но не оценивает альтернативные решения диагностики; недостаточно профессионально выражает и обосновывает свою позицию по основным клиническим формам дерматозов и ИППП, по организации и структуре дерматовенерологической службы, по современным подходам в комплексном лечении дерматозов (этиотропная и патогенетическая терапия, физиотерапия, хирургическое лечение); достаточно глубоко выявляет степень и характер поражения органов и систем при дерматозах и ИППП; не совсем грамотно выявляет причинно-следственные связи в этиологии и патогенезе развития кожных и венерических болезней. Демонстрирует достаточное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.

T

1. Псевдолейкодерма - это:

- а) участки депигментации на месте бывших высыпаний
- б) геморрагическое невоспалительное пятно
- в) воспалительное пятно
- г) очаг лихенификации
- д) искусственное пятно

2. В клинику поступил больной с жалобами на наличие распространенных высыпаний, на месте которых после разрешения остаются рубчики. Высыпания были представлены инфильтрированными бесполостными, возвышающимися над уровнем кожи элементами желтоватого цвета, мягкой консистенции, полушаровидной формы, округлых очертаний. Была произведена биопсия одного из первичных элементов. Гистологически высыпания представляли собой инфекционную гранулему. Назовите элемент:

- а) узелок
- б) бугорок
- в) пузырек
- г) волдырь
- д) пузырь

3. Больной жалуется на зудящие высыпания, возвышающиеся над окружающей кожей, розового цвета, рассеянные на коже туловища. Болен 2 дня. Высыпные элементы существуют в течение нескольких часов, самопроизвольно исчезают и появляются вновь. Дайте определение морфологическому элементу.

- а) узелок
- б) волдырь
- в) узел
- г) бугорок
- д) пузырек

4. Укажите механизм образования внутриэпидермального пузыря:

- а) Акантолиз
- б) Баллонирующая дистрофия
- в) Вакуольная дистрофия
- г) Спонгиоз
- д) Экзоцитоз

5. Мономорфная сыпь представлена:

- а) Несколькими видами первичных элементов
- б) Первичными и вторичными элементами
- в) Одним видом вторичных элементов
- г) Одним видом первичных элементов
- д) Несколькими видами вторичных элементов

6. Лихенификация характеризуется всем перечисленным, кроме:

- а) уплотнения кожи
- б) усиления кожного рисунка
- в) образования эрозий
- г) утолщения кожи

д) пигментации

7. Назовите морфологическую основу бугорка:

- а) акантоз
- б) периваскулярная инфильтрация
- в) вакуольная дистрофия
- г) инфекционная гранулема
- д) папилломатоз

8. В амбулаторию клиники обратился больной с жалобами на появление ярко-розовых, отечных элементов, сопровождающихся зудом. Через 2-3 часа после появления элементы бесследно регрессируют. Назовите элемент:

- а) бугорок
- б) узелок
- в) волдырь
- г) узел
- д) пузырек

9. Лихенификация формируется в результате:

- а) механического повреждения кожи
- б) длительного расчесывания
- в) заживления эрозий
- г) вскрытия пузырей
- д) слияния бугорков

10. По величине различают следующие воспалительные пятна:

- а) розеола
- б) пурпура
- в) эритема
- г) экхимозы
- д) вибицес

11. Веснушки являются пятнами:

- а) воспалительными
- б) геморрагическими
- в) искусственными
- г) пигментными
- д) телеангиэктазиями

12. Бородавки формируются в результате разрастания эпидермиса типа акантоза и являются:

- а) бугорками
- б) невоспалительными узелками
- в) воспалительными узелками
- г) невоспалительными узлами
- д) вегетацией

13. Укажите, какими путями осуществляется заражение чесоткой:

- а) половым
- б) через игрушки
- в) через одежду и постель
- г) через животных

д) через насекомых

14. Укажите факторы естественной резистентности кожи к пиококкам:

- а) целостность рогового слоя кожи
- б) кислая рН кожной поверхности
- в) физиологическое шелушение
- г) повышенное салоотделение
- д) повышенное потоотделение

15. К группе стафилококковых пиодермий относятся:

- а) сикоз простой
- б) фурункулез
- в) гидраденит
- г) заеда
- д) вульгарная эктима

16. При лечении пиодермий противопоказано применение:

- а) сухого тепла
- б) УФО
- в) УВЧ
- г) водных процедур
- д) иглорефлексотерапии

17. Показаниями для наложения ихтиоловой «лепешки» являются:

- а) импетиго вульгарное
- б) фурункул
- в) заеда
- г) гидраденит
- д) фолликулит

18. Назначение антибиотиков считается обязательным при:

- а) пиодермиях, сопровождающихся лихорадкой
- б) рецидивирующих пиодермиях
- в) локализации пиодермий на лице и голове
- г) одиночных фурункулах
- д) глубоких пиодермиях

19. Разновидностями стрептококковой пиодермии являются:

- а) стрептококковая заеда
- б) буллезное импетиго
- в) щелевидное импетиго
- г) поверхностный панариций
- д) вульгарное импетиго

20. Норвежская чесотка встречается:

- а) у больных с психическими заболеваниями
- б) у больных с сахарным диабетом
- в) на фоне длительного приема цитостатиков
- г) у больных атопическим дерматитом
- д) у нечистоплотных людей

21. Укажите, какие первичные морфологические элементы чаще составляют клиническую картину чесотки:

- а) пузырек
- б) бугорок
- в) узелок
- г) пятно
- д) корка

22. К числу эндогенных факторов, благоприятствующих развитию пиодермий, относятся:

- а) гиповитаминозы
- б) нарушения обмена веществ
- в) вегетативные неврозы
- г) местное нарушение кровоснабжения
- д) иммунодефицит

23. Для местного лечения пиодермий применяют следующие средства:

- а) фукорцин
- б) гентамициновая мазь
- в) левомеколь
- г) чистый ихтиол
- д) 2% салициловый спирт

24. Лечение больного чесоткой предусматривает:

- а) применение эмульсии бензилбензоата
- б) применение УФО
- в) назначение серных мазей
- г) исключение острой пищи
- д) применение спрея «Спрегаль»

25. Укажите среди нижеперечисленных глубокую форму стрептодермии:

- а) стрептококковое импетиго
- б) околоногтевая фликтена
- в) эктима вульгарная
- г) буллезное импетиго
- д) заеда

26. Укажите наиболее характерные признаки чесотки:

- а) инфильтрация в очагах поражения
- б) папуло-везикулезные элементы
- в) импетигинизация в очагах поражения
- г) ночной зуд
- д) локализация в области волосистой части головы

27. Укажите типичную локализацию высыпаний при не осложненной чесотке у взрослых:

- а) лицо
- б) область сосков
- в) межпальцевые складки кистей
- г) боковые поверхности туловища
- д) половые органы у мужчин

28. Укажите экзогенные факторы, имеющие значение в развитии пиодермий:

- а) микротравмы кожи

- б) загрязнение кожи
- в) переохлаждение
- г) перегревание
- д) употребление жирной пищи

29. Укажите, какие из нижеперечисленных средств необходимы для лечения неосложненной чесотки:

- а) гидрокортизоновая мазь
- б) 2% борная мазь
- в) 5% салициловая мазь
- г) 33% серная мазь
- д) 5% нафталановая мазь

30. Укажите, с какими кожными заболеваниями нет необходимости дифференцировать чесотку:

- а) атопический дерматит
- б) розовый лишай
- в) кожный зуд
- г) экзема
- д) пруриго

31. При развитии аллергического контактного дерматита кистей от стирального порошка необходимо:

- а) прекратить пользование стиральным порошком
- б) исключить частое мытье рук
- в) назначить внутрь – Зиртек
- г) назначить местно – крем «Элоком»
- д) применять при стирке местные защитные средства.

32. Причинами развития аллергического дерматита могут быть:

- а) металлические украшения
- б) синтетические ткани
- в) моющие средства
- г) декоративная косметика
- д) горчичники.

33. Причинами развития простого дерматита являются:

- а) механическое трение
- б) кипяток
- в) стиральный порошок
- г) концентрированные щелочи
- д) концентрированные кислоты.

34. Причинами развития аллергического дерматита могут быть:

- а) УФ-лучи
- б) косметический крем
- в) тени для век
- г) пена для бритья
- д) дезодорант.

35. Обязательными причинами (простых дерматитов) являются факторы:

- а) механические

- б) физические
- в) химические
- г) биологические
- д) инфекционные.

36. Для аллергического контактного дерматита характерны следующие признаки:

- а) выраженность воспаления кожи зависит от концентрации раздражителя
- б) воспаление кожи выходит за пределы участка, подвергнувшегося воздействию раздражителя
- в) возникает при повторном контакте с раздражителем
- г) четкие границы, очагов поражения
- д) наличие временного интервала между первым контактом с аллергеном и развитием кожных проявлений.

37. Простой контактный дерматит характеризуется следующими признаками:

- а) четким границам
- б) локализацией в местах контакта с раздражителем
- в) ввыраженностью воспаления в зависимости от силы раздражителя
- г) образованием волдырей
- д) быстрым регрессом после устранения раздражителя.

38. Для истинной экземы характерны следующие клинические признаки:

- а) нечеткие границы очагов поражения
- б) асимметричность
- в) зуд
- г) мокнущие эрозии – «серозные колодцы»
- д) мономорфность сыпи.

39. Назовите признаки, не характерные для микробной экземы:

- а) симметричность
- б) четкие границы
- в) локализация вокруг трофических и пиококковых язв
- г) географические очертания
- д) импетигиозные корки.

40. Для себорейной экземы характерным является:

- а) мокнутие
- б) локализация в зонах с усиленным салоотделением
- в) шелушение жирными чешуйками
- г) розовато-желтый оттенок высыпаний
- д) слабо инфильтрированные бляшки.

41. Для профессиональной экземы характерными клиническими признаками являются:

- а) поражение кистей
- б) симметричность
- в) быстрый регресс при назначении терапии
- г) рецидивы во время отпуска
- д) моновалентная сенсibilизация.

42. Назовите патогномичные патогистологические признаки экземы:

- а) спонгиоз
- б) субэпидермальные пузыри

- в) лимфогистиоцитарная инфильтрация дермы
- г) гранулез
- д) отек сосочкового слоя дермы.

43. Назовите признаки, характерные для дисгидротической экземы:

- а) локализация высыпаний на ладонях и подошвах
- б) асимметричность
- в) везикулы с плотными покрывками
- г) локализация высыпаний в локтевых и подколенных ямках
- д) локализации на кистях и стопах.

44. Общую кортикостероидную терапию при экземе назначают в случаях:

- а) большой распространенности процесса
- б) резистентности к обычной терапии
- в) упорного течения
- г) присоединения вторичной инфекции.
- д) повышенной температуры тела

45. При хронической экземе вне обострения назначают:

- а) примочки
- б) теплые ванночки
- в) пасты
- г) окклюзионные повязки с редуцирующими мазями
- д) тепловые физиопроцедуры.

46. Наиболее характерными клиническими проявлениями руброфитии являются:

- а) преимущественное поражение слизистых
- б) тенденция к универсальному поражению ногтевых пластинок кистей и стоп
- в) генерализованное поражение волосистой части головы
- г) частое поражение кожи стоп эритематозно-сквамозного характера
- д) поражение крупных складок кожи

47. Укажите принципы диагностики микозов:

- а) сбор эпидемиологического анамнеза
- б) люминесцентный метод (лампа Вуда)
- в) микроскопия (КОН-тест)
- г) культуральный метод
- д) серологический метод

48. Источником заражения микроспорией является:

- а) человек
- б) кошка
- в) собака
- г) лошадь
- д) корова

49. При грибковом поражении волос необходимо:

- а) провести эпиляцию (для теста КОН)
- б) применить аппликации кортикостероидных мазей
- в) назначить системный антимикотик
- г) назначить антибиотик широкого спектра действия
- д) назначить физиопроцедуры (ультразвук)

50. В стадии мокнутия при дисгидротической форме эпидермофитии для наружной терапии необходимо применять:

- а) присыпки
- б) мази
- в) взбалтываемые взвеси («болтушки»)
- г) примочки
- д) спиртовые протирания

51. Укажите наиболее характерную локализацию интертригинозной формы эпидермофитии:

- а) передняя поверхность голеней
- б) межпальцевые складки стоп
- в) паховые складки
- г) подмышечные области
- д) межягодичные складки

52. Возбудителем эритразмы является:

- а) *Corynebacterium minutissimum*
- б) *Trichophyton violaceum*
- в) *Candida albicans*
- г) *Trichophyton rubrum*
- д) *Microsporum canis*

53. Назовите клинические формы эпидермофитии стоп:

- а) интертригинозная
- б) дисгидротическая
- в) атрофическая
- г) сквамозно-гиперкератотическая
- д) стертая

54. Назовите анатомо-физиологические признаки, характерные для дерматофитов (дерматомицетов):

- а) кератофильность
- б) наличие глико-, протео- и липолитических ферментов
- в) выраженная аэробность
- г) наличие хитина в клеточной оболочке
- д) выраженная анаэробность

55. Для лечения отрубевидного лишая применяют:

- а) шампунь «Низорал»
- б) спрей «Ламизил»
- в) эритемное УФ-облучение
- г) 5% салициловый спирт
- д) втирание кортикостероидных мазей

56. Для микроспории волосистой части головы характерными признаками являются:

- а) эритема
- б) мокнутие
- в) зуд
- г) обломанные волосы
- д) шелушение

57. Назовите факторы, способствующие развитию микозов:

- а) эндокринопатии
- б) иммуносупрессивная терапия
- в) прием антибиотиков
- г) витаминотерапия
- д) оральные контрацептивы

58. Орунгал является препаратом:

- а) противовоспалительным
- б) противовирусным
- в) противопротозойным
- г) фунгистатическим
- д) антибактериальным

59. Перечислите признаки, характерные для кератомикозов:

- а) поражение рогового слоя эпидермиса
- б) мокнутие
- в) десквамация
- г) образование пятен цвета «кофе с молоком»
- д) отсутствие воспаления

60. Назовите заболевания из группы дерматофитий:

- а) эпидермофития
- б) руброфития
- в) трихофития
- г) кандидоз
- д) микроспория

61. При красном плоском лишае кроме кожи могут поражаться:

- а) суставы
- б) слизистые оболочки
- в) волосы
- г) ногти
- д) внутренние органы

62. Укажите клинические симптомы красного плоского лишая:

- а) зуд
- б) распространенные кожные высыпания
- в) поражение слизистых
- г) боли в суставах
- д) жжение

63. Для лечения красного плоского лишая применяются:

- а) плаквенил
- б) дипроспан
- в) кларитин
- г) сонапакс
- д) нистатин

64. Для вульгарной формы псориаза характерным является:

- а) отсутствие отечности высыпаний
- б) ярко-красные папулы, покрытые серебристо-белыми чешуйками

- в) отсутствие чешуе-корок
- г) отсутствие артралгии
- д) универсальное поражение кожных покровов

65. Укажите характерные локализации красного плоского лишая:

- а) туловище
- б) голени
- в) лицо
- г) половые органы
- д) слизистые оболочки полости рта

66. На прием к дерматологу обратилась больная 42 лет с жалобами на появление после нервного потрясения обильной сыпи, сопровождающейся зудом. Больна 10 дней. При осмотре: на туловище, передней поверхности предплечий и голеней имеются многочисленные плоские папулезные высыпания размером от булавочной головки до горошины синюшно-красного цвета, с гладкой блестящей поверхностью и пупкообразным вдавлением в центре. Описанная клиническая картина соответствует диагнозу:

- а) псориаз
- б) пруриго
- в) вторичный сифилис
- г) красный плоский лишай
- д) чесотка

67. Розовый лишай начинается с появления:

- а) волдыря
- б) пигментированного пятна
- в) папулы
- г) везикулы
- д) воспалительного пятна

68. Выберите симптом, патогномоничный для красного плоского лишая:

- а) симптом Никольского
- б) симптом Бенъе-Мещерского
- в) симптом Викема
- г) симптом Горчакова-Арди
- д) симптом Пильнова

69. Для экссудативной формы псориаза наиболее характерными признаками являются:

- а) наличие муковидных чешуек
- б) наличие геморрагических корок
- в) наличие гнойных корок
- г) наличие серозных чешуе-корок
- д) наличие отежных папул

70. Для лечения псориаза эффективными физиотерапевтическими методами являются:

- а) селективная фототерапия (СФТ)
- б) озонотерапия
- в) фотохимиотерапия (ПУВА)
- г) оксигенотерапия
- д) криотерапия

71. Помимо кожи при псориазе могут поражаться:

- а) волосы
- б) суставы
- в) роговица глаза
- г) ногти
- д) сердце

72. Псориазная эритродермия характеризуется:

- а) универсальным поражением кожи
- б) увеличением лимфатических узлов
- в) подъемом температуры тела
- г) поражением слизистых оболочек
- д) поражением печени

73. Красный плоский лишай необходимо дифференцировать с:

- а) псориазом
- б) сифилисом
- в) плоскими бородавками
- г) токсикодермией
- д) пруриго

74. Выберите клинические признаки, характерные для розового лишая

- а) полициклические очертания высыпаний
- б) желтовато-розовый цвет высыпаний
- в) восковидный блеск высыпаний
- г) наличие «материнской бляшки»
- д) расположение пятен по линиям натяжения Лангера

75. Выберите диагностические феномены, характерные для псориаза:

- 1) феномен Кебнера
- 2) сетка Викема
- 3) симптом стеаринового пятна
- 4) симптом Никольского
- 5) симптом Бенъе-Мещерского

76. Кожный зуд, как симптом, часто встречается при следующих заболеваниях:

- а) сахарный диабет
- б) глистная инвазия
- в) лейкозы
- г) красная волчанка
- д) болезни печени

77. Диагноз атопического дерматита может быть поставлен на основании:

- а) указания на начало заболевания в детстве
- б) улучшения в летнее время
- в) наличия лихенификации в локтевых и подколенных сгибах
- г) развития везикуляции в очагах поражения
- д) белого дермографизма

78. В возникновении стропулюса первостепенную роль играют:

- а) пищевая аллергия
- б) контакт со стиральным порошком
- в) детский возраст

- г) нервные факторы
- д) памперсы

79. Хроническую крапивницу нужно дифференцировать с:

- а) укусами насекомых
- б) чесоткой
- в) токсидермией
- г) экземой
- д) дерматитом Дюринга

80. Какие из перечисленных элементов наиболее характерны для клинической картины атопического дерматита у взрослых?

- а) волдырь
- б) эксфолиация
- в) эритема
- г) лихенификация
- д) узел

81. Какие из перечисленных элементов наиболее характерны для клинической картины пруриго взрослых?

- а) серопапула
- б) папула
- в) волдырь
- г) эксфолиация
- д) пустула

82. Какими действиями не обладает кортикостероидная мазь?

- а) вазоконстрикторным
- б) противозудным
- в) противомикробным
- г) противовоспалительным
- д) дезодорирующим

83. Какие утверждения неверны в отношении антигистаминных препаратов?

- а) оказывают гистаминопектическое действие
- б) являются Н1 блокаторами
- в) являются Н2 блокаторами
- г) оказывают противозудное действие
- д) являются Н3 блокаторами

84. Обострения и ремиссии атопического дерматита зависят от:

- а) сезонности
- б) погрешностей в диете
- в) стрессогенных ситуаций
- г) инсоляции
- д) наследственности

85. Зуд кожи как симптом характерен для следующих заболеваний:

- а) сахарного диабета
- б) глистной инвазии
- в) болезней печени
- г) опоясывающего герпеса

д) простого герпеса

86. Каким заболеваниям и состояниям кожный зуд может сопутствовать в качестве симптома?

- а) беременности
- б) СПИДу
- в) болезням почек
- г) гепатитам
- д) пузырчатке

87. Какие утверждения противоречат общепринятым представлениям о зудящих дерматозах?

- а) кожный зуд может быть как нозологией, так и симптомом
- б) крапивница характеризуется полиморфизмом высыпаний
- в) строфулюс – это детская почесуха
- г) экзема не относится к нейродерматозам
- д) зудящие дерматозы это аллергические заболевания

88. Какие цели должна преследовать наружная терапия при атопическом дерматите?

- а) противозудное действие
- б) барьерстабилизирующее действие
- в) противовоспалительное действие
- г) кератопластическое действие
- д) увлажняющее действие

89. Какие изменения лабораторных параметров не характерны для больных атопическим дерматитом?

- а) повышенный уровень сывороточных IgE антител
- б) выявление акантолитических клеток
- в) эозинофилия крови
- г) повышение цитокинов 2-го типа
- д) повышение креатинина сыворотки

90. Отметьте нетипичную локализацию высыпаний при атопическом дерматите у взрослых:

- а) лицо
- б) ягодицы
- в) шея
- г) локтевые сгибы
- д) ладони и подошвы

91. Укажите типичную локализацию себореи:

- а) верхняя треть спины
- б) лицо
- в) верхняя треть груди
- г) волосистая часть головы
- д) паховые складки

92. Укажите заболевания, в клинической картине которых встречается алопеция:

- а) вторичный сифилис
- б) микроспория
- в) дискоидная красная волчанка

- г)розацеа
- д)вульгарные угри

93. Укажите заболевания, триггер фактором которого является злоупотребление кортикостероидными мазями:

- а)масляные угри
- б)ринофима
- в)атерома
- г)периоральный дерматит
- д)себорейный дерматит

94. Укажите побочные эффекты длительного лечения розацеа кортикостероидными мазями:

- а)атрофия кожи лица
- б)телеангиэктазии
- в)гипертрихоз лица
- г)милиумы
- д)гиперплазия сальных желез

95. Для простого герпеса наиболее характерными элементами сыпи являются:

- а) гнойнички, язвы, гнойные корки
- б) узелки, чешуйки, гиперпигментация
- в) бугорки, язвы, геморрагические корки
- г) пузырьки, эрозии, серозные корки
- д) папулы, волдыри, эскориации

96. К Вам обратился пациент с жалобами на болезненные эрозии на половом члене. В анамнезе выявлено частое появление подобных высыпаний в течение года. При осмотре: на головке полового члена сгруппированные пузырьки полициклических очертаний, на отечном основании, мягком при пальпации. Наиболее вероятный диагноз:

- а) вульгарная пузырчатка
- б) шанкриформная пиодермия
- в) рецидивирующий герпес
- г) первичный герпес
- д) первичный сифилис

97. Укажите наиболее характерные признаки простого герпеса:

- а) наличие предвестников
- б) начало заболевания в пожилом возрасте
- в) хроническое течение дерматоза
- г) связь рецидивов с приёмом сульфаниламидов
- д) склонность к рецидивам

98. Укажите наиболее эффективные препараты для купирования рецидива простого герпеса:

- а) ацикловир
- б) тетрациклин
- в) валтрекс
- г) трихопол
- д) фамвир

99. К Вам обратился пациент с жалобами на появление высыпаний, сопровождающихся зудом. При осмотре - в области угла рта справа на эритематозном, отёчном фоне сгруппированные мелкие пузырьки, наполненные серозным содержимым, и мелкие эрозии. Между какими заболеваниями, в первую очередь, следует проводить дифференциальный диагноз:

- а) первичный сифилис
- б) стрептококковое импетиго
- в) вульгарная пузырчатка
- г) простой герпес
- д) опоясывающий герпес

100. Укажите наиболее эффективные методы лечения контагиозного моллюска:

- а) 5% салициловая мазь
- б) диатермокоагуляция
- в) мазь Зовиракс
- г) механическое удаление
- д) УФО

101. Укажите субъективное ощущение, наиболее характерное для опоясывающего герпеса:

- а) зуд
- б) жжение
- в) чувство стягивания кожи
- г) чувство покалывания в коже
- д) болевой синдром

102. Укажите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать простой герпес:

- а) опоясывающий герпес
- б) аллергический дерматит
- в) стрептококковое импетиго
- г) первичный сифилис
- д) вульгарный псориаз

103. Язвенная форма простого герпеса и рецидивы опоясывающего лишая могут быть маркерами следующих системных заболеваний:

- а) злокачественных новообразований
- б) глистной инвазии
- в) инфекция ВИЧ на стадии СПИДа
- г) хронической почечной недостаточности
- д) хронического лимфолейкоза

104. Наиболее тяжелой разновидностью первичного герпеса (нередко с летальным исходом) является:

- а) первичный герпетический гингивостоматит
- б) первичный герпетический вульво-вагинит
- в) герпетический панариций
- г) первичный герпес новорожденных
- д) первичный герпес гениталий

105. К заболеваниям, передающимся половым путем, относятся следующие разновидности вирусных дерматозов:

- а) плоские бородавки

- б) остроконечные кондиломы
- в) синдром Ханта
- г) простой герпес гениталий
- д) контагиозный моллюск

106. Среди разновидностей бородавок выделяют следующие:

- а) обычные
- б) плоские
- в) подошвенные
- г) остроконечные
- д) псориазиформные

107. При типичном развитии рецидива простого герпеса принято выделять следующие стадии:

- а) Предвестников
- б) Эритематозная
- в) Везикулезная
- г) Эрозивная
- д) Шелушения

108. Наиболее эффективными методами вторичной профилактики рецидивов простого герпеса являются следующие:

- а) аутогемотерапия
- б) герпетическая поливакцина
- в) инъекции антибиотиков
- г) индукторы интерферона
- д) витаминотерапия

109. Укажите признаки, наиболее характерные для опоясывающего герпеса:

- а) пузырьковые высыпания
- б) склонность к рецидивированию
- в) боли по ходу нервных стволов
- г) положительный симптом Никольского
- д) развитие пост-герпетической невралгии

ТЕСТЫ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

Раздел 1

ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ

1. Дерматологический диагноз формулируется, включая все перечисленное, кроме
 - а) нозологической формы
 - б) клинической формы
 - в) характера течения
 - г) стадии процесса
 - д) эффективности предшествующего лечения
2. Гипоаллергенная диета может назначаться больным
 - а) псориазом
 - б) буллёзными дерматозами
 - в) склеродермией
 - г) экземой, атопическим дерматитом
 - д) все перечисленное
3. Диета больных дерматитом Дюринга предусматривает
 - а) исключение из рациона продуктов, приготовленных из злаков
 - б) ограничение углеводов
 - в) ограничение белков
 - г) ограничение поваренной соли
 - д) снижение калорийности пищевого рациона
4. К препаратам, блокирующим H₂-гистаминовые рецепторы, относится
 - а) циметидин
 - б) димедрол
 - в) супрастин
 - г) фенкарол
 - д) диазолин
5. Понятие «дозовый режим» включает все перечисленное, кроме
 - а) суточных доз в единицах веса или объема
 - б) промежутков между введением
 - в) путей введения
 - г) скорости введения
 - д) общей продолжительности лечения
6. К препаратам, тормозящим высвобождение медиаторных веществ из тучных клеток, относятся
 - а) задитен
 - б) кромолин-натрий
 - в) циметидин
 - г) правильно а) и б)
 - д) ни один из указанных
7. Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают все перечисленные препараты, кроме

- а) кортикостероидов
 - б) антигистаминных препаратов
 - в) препаратов кальция
 - г) тиосульфата натрия
 - д) транквилизаторов
8. Дезинтоксикационным эффектом обладают
- а) гипосульфит натрия
 - б) пантотеновая кислота
 - в) аскорбиновая кислота
 - г) сернокислая магнезия
 - д) все перечисленное
9. Гиперергические реакции, связанные с клеточными антителами, имеют следующие проявления
- а) буллезные
 - б) эксфолиативные
 - в) геморрагические
 - г) экзематозные
 - д) все перечисленные
10. К лечебному питанию больных акантолитическими буллезными дерматозами предъявляются все перечисленные требования, исключая обогащение
- а) животными белками
 - б) продуктами, содержащими соли калия
 - в) углеводами и жирами
 - г) продуктами, содержащими соли кальция
 - д) правильно в) и г)
11. Алкоголь влияет на эффективность лекарств путем
- а) изменения резорбции и метаболизма лекарств
 - б) повышения токсичности барбитуратов
 - в) повышения эффективности оральных сахароснижающих препаратов
 - г) правильно а) и б)
 - д) правильно б) и в)
12. Экскреция лекарств с низким молекулярным весом производится в основном
- а) почками
 - б) желчной системой
 - в) кишечником
 - г) легкими
 - д) железами кожи
13. Системные аллергические реакции замедленного типа, связанные с клеточными антителами, вызывают все перечисленное, кроме
- а) генерализованного аллергического дерматита
 - б) грибковоподобной эритемато-везикулезной сыпи
 - в) гиперергических реакций
 - г) крапивницы
 - д) обострения основного заболевания (коллагенозы, экзема и пр.)
14. О начале «синдрома отмены» при лечении глюкокортикоидными гормонами свидетельствуют

- а) анорексия
 - б) недомогание
 - в) гипотония
 - г) миалгия
 - д) все перечисленное
15. Лечебное питание больных себорей и вульгарными угрями предусматривает все перечисленное, кроме
- а) гипоаллергенной диеты
 - б) уменьшения в рационе животных жиров
 - в) исключения поваренной соли
 - г) исключения острых блюд
 - д) ограничения углеводов
16. Лечебное питание больных дерматитом Дюринга требует исключения
- а) продуктов из пшеничной и ржаной муки
 - б) круп содержащих глютен
 - в) острых блюд
 - г) углеводов
 - д) правильно все, кроме г)
17. Экскреция лекарств с высоким молекулярным весом производится в основном
- а) почками
 - б) желчной системой
 - в) кишечником
 - г) легкими
 - д) железами кожи
18. К побочному действию лекарств относятся
- а) токсические реакции
 - б) дисбактериоз
 - в) массивный бактериолиз (реакция Герксгеймера)
 - г) реакция с особой чувствительностью
19. Пути введения лекарственных веществ могут быть
- а) внутривенный
 - б) внутримышечный
 - в) подкожный
 - г) эндолимфатический
 - д) все перечисленное
20. Начало лечения иглорефлексотерапией при хронических заболеваниях возможно во все периоды, кроме
- а) периода обострения
 - б) периода стабилизации воспалительного процесса
 - в) периода частичной или полной ремиссии
 - г) периода фиксированных сезонных обострений
 - д) правильно в) и г)
21. Лечебное питание больных хронической пиодермией предусматривает в пищевом рационе все перечисленное, кроме
- а) ограничения углеводов
 - б) ограничения животных жиров

- в) увелечения белков
 - г) увеличения витаминов
22. Эккриновые потовые железы выделяют пот, состоящий
- а) из воды
 - б) из солей кальция
 - в) из сульфатов хлорида натрия
 - г) из органических веществ (мочевая кислота, аммиак, углеводы и т.д.)
23. Апокриновые потовые железы в своем секрете содержат все перечисленное, кроме
- а) обычных составных частей пота
 - б) железа
 - в) холестерина и его эфиров
 - г) гликогена
 - д) нейтральных жиров
24. Основными компонентами секрета сальных желез являются
- а) нейтральные жиры
 - б) азотистые и фосфорные соединения
 - в) стероидные гормоны
 - г) стеарины
 - д) все перечисленное
25. Функция эккриновых потовых желез регулируется симпатическими нервами, центры которых расположены
- а) в спинном мозге
 - б) в продолговатом мозге
 - в) в промежуточном мозге
 - г) все перечисленное верно
26. Гиперкератоз – это утолщение
- а) эпидермиса
 - б) базального слоя
 - в) шиповидного слоя
 - г) зернистого слоя
 - д) рогового слоя
27. Секретция сальных желез регулируется всем перечисленным, кроме:
- а) нервной системы
 - б) гормонов половых желез
 - в) гормонов гипофиза
 - г) гормонов надпочечников
 - д) гормонов поджелудочной железы
28. Белковый обмен в коже происходит за счет
- а) коллагена
 - б) продуктов белкового обмена
 - в) альбуминов и глобулинов
 - г) кератина
 - д) всего перечисленного
29. Недостаток в организме витаминов группы В обуславливает все вышеперечисленное, кроме
- а) дистрофии волос

- б) пеллагры
 - в) дистрофии ногтей
 - г) глосситов
 - д) стоматитов
30. При старении кожи происходит
- а) изменение биохимического состава кожи
 - б) снижение активности ферментов в эпидермисе
 - в) усиление активности ферментов в дерме
 - г) повышение содержания в коже кальция и калия
 - д) все перечисленное
31. Гипертрофия эпидермиса – утолщение
- а) рогового слоя
 - б) зернистого слоя
 - в) базального слоя
 - г) шиповидного слоя
 - д) всех слоев кожи, кроме базального
32. К осложнениям, наблюдающимся при наружном применении глюкокортикоидных гормонов, относятся
- а) атрофия кожи
 - б) пиодермия
 - в) келоидный рубец
 - г) гиперкератоз
 - д) правильно а) и б)
33. При образовании волдыря возникают
- а) инфильтрация дермы
 - б) отек сосочкового слоя дермы
 - в) расширение сосудов
 - г) акантоз
 - д) правильно а) и в)
34. Атрофия дермы – это
- а) уплощение сосочкового слоя
 - б) истончение сетчатого слоя
 - в) сглаженность дермо-эпидермальной границы
 - г) уменьшение количества сосудов дермы
 - д) все перечисленное кроме г)
35. Оценка морфологических элементов предусматривает определение
- а) размеров и цвета
 - б) формы и конфигурации
 - в) консистенции
 - г) поверхности, дна, содержимого, границ
36. Спонгиоз – это
- а) скопление в межклеточных щелях отечной жидкости
 - б) раздвижение эпителиальных клеток
 - в) растягивание межклеточных мостиков и разрыв межклеточных связей
 - г) формирование микровезикул
 - д) все перечисленное

37. Вторичными элементами, появляющимися после нарушения целостности только эпидермиса, являются
- а) эрозия
 - б) язва
 - в) поверхностная трещина
 - г) рубец
 - д) все перечисленное
38. Дискератоз – это
- а) нарушение ороговения отдельных клеток
 - б) нарушение ороговения групп клеток
 - в) нарушения ороговения всего эпителия
 - г) любое отклонение от нормального рогообразования
 - д) правильно а) и б)
39. Акантолиз – это
- а) разрушение межклеточных мостиков клеток шиповидного слоя
 - б) скопление серозной жидкости
 - в) образование внутридермальных пузырей
 - г) дегенеративное изменение эпидермальных клеток, утративших связь с окружающими и плавающими в пузырьной жидкости
 - д) все перечисленное
40. Гранулез – это утолщение
- а) эпидермиса
 - б) шиповидного слоя
 - в) зернистого слоя
 - г) базального слоя
 - д) рогового слоя
41. Дерма состоит
- а) из волокнистых субстанций
 - б) из основного межклеточного вещества
 - в) из клеточных элементов
 - г) из сосудов и нервов
 - д) из всего перечисленного
42. Роговой слой кожи обеспечивает все перечисленное, кроме
- а) механической резистентности
 - б) противолучевой резистентности
 - в) противохимической резистентности
 - г) электросопротивления
 - д) антимикробной резистентности
43. Проницаемость кожи – это
- а) адсорбирование вещества на роговом слое
 - б) прохождение вещества через роговой барьер
 - в) прохождение вещества через эпидермис и сосочковый слой дермы
 - г) поступление вещества через стенки кровеносных сосудов в кровь
 - д) все перечисленное кроме а)
44. Воспаление дермы характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) отека

- б) расширения сосудов
 - в) выхода белков плазменного происхождения и форменных элементов крови за пределы сосудистого русла
 - г) формирования периваскулярных или диффузных клеточных пролифератов
 - д) сглаживания сосочков дермы
45. К первичным полостным морфологическим элементам относятся
- а) пятно
 - б) узелок и узел
 - в) бугорок
 - г) волдырь
 - д) пузырек
46. Клиническая оценка кожной сыпи предусматривает все перечисленное, кроме
- а) определения характера сыпи (воспалительная или невоспалительная)
 - б) распространенности процесса
 - в) локализации
 - г) определения морфологических элементов
 - д) определения кожных сосудистых реакций
47. Проницаемость кожи повышается при всем перечисленном, кроме
- а) мацерации рогового слоя
 - б) смазывания раздражающими веществами, усиливающими кровоток
 - в) влияния ионизирующего излучения
 - г) голодания
 - д) механических воздействий
48. Противопоказания для лечения низоралом являются
- а) повышенная чувствительность к препарату
 - б) недостаточность кровообращения
 - в) недостаточность функции печени и почек
 - г) заболевания органов дыхания
 - д) правильно а) и в)
49. Лихенификация характеризуется
- а) уплотнением
 - б) пигментацией
 - в) утолщением кожи
 - г) усмлением кожного рисунка
 - д) всем перечисленным
50. Первичным морфологическим элементом, характерным для герпесов является
- а) пятно
 - б) узелок и бугорок
 - в) везикула и пузырь
 - г) волдырь
 - д) все перечисленное
51. Функция апокриновых желез (потовых)
- а) начинают активно функционировать в период полового созревания
 - б) связана с нервной системой
 - в) связана с эндокринной системой
 - г) связана с полом

- д) все правильно, кроме г)
52. Кожа участвует в обмене
- а) углеводов, липидов, белков
 - б) меланина
 - в) витаминов
 - г) воды и солей
 - д) всего перечисленного
53. Меланин защищает от УФ-лучей
- а) клетки базального слоя эпидермиса
 - б) клетки дермы
 - в) нервы
 - г) сосуды
 - д) все перечисленное
54. Апокриновые железы по строению могут быть
- а) трубчатыми
 - б) альвеолярными
 - в) смешанного строения
 - г) строение зависит от локализации железы
 - д) строение не зависит от локализации железы
55. К высыхающим, то есть густеющим от поглощения воздуха, растительным маслам относятся
- а) подсолнечное масло
 - б) оливковое масло
 - в) льняное масло
 - г) ореховое масло
 - д) все перечисленное кроме б)
56. Мази назначаются
- а) для изоляции кожных покровов от влияния химических, механических травм, трения
 - б) как смягчающие кожу и зудоутоляющие
 - в) как проводники лекарственных веществ
 - г) как очищающие кожу от вторичных наслоений
 - д) правильно все перечисленное
57. Время полного обновления клеток эпидермиса зависит
- а) от пола
 - б) от возраста
 - в) от национальной принадлежности
 - г) от индивидуальных особенностей
58. Сальные железы могут быть
- а) трубчатыми
 - б) альвеолярными
 - в) отсутствуют на ладонях и подошвах
 - г) связаны с волосяными фолликулами
 - д) правильно все перечисленное, кроме а)
59. Барьерно-защитная функция кожи включает
- а) противолучевую резистентность

- б) бактерицидную активность
 - в) сопротивление кожи электрическому току
 - г) механическую резистентность
 - д) все перечисленное
60. Эпидермис имеет слои
- а) роговой
 - б) зернистый
 - в) шиповидный
 - г) базальный
 - д) все перечисленные
61. В слоях дермы различают
- а) базальный
 - б) сосочковый
 - в) сосудистый
 - г) сетчатый
 - д) правильно б) и г)
62. Осмотр больного кожным заболеванием предусматривает оценку
- а) тургора кожи
 - б) цвета кожи
 - в) воспалительных и невоспалительных изменений кожи
 - г) состояния придатков кожи
 - д) всего перечисленного
63. Бактерицидная активность кожи обеспечивается
- а) самоочищением кожи естественным отшелушиванием рогового слоя
 - б) стерилизующими свойствами кожи
 - в) кислой реакцией поверхности кожи
 - г) направлением движения секрета сальных и потовых желез
 - д) всем перечисленным
64. В базальном слое имеют место все перечисленные клетки, кроме
- а) кератиноцитов(эпидермоцитов)
 - б) меланоцитов
 - в) клеток Лангерганса
 - г) клеток Меркеля
 - д) гистиоцитов
65. Основными клеточными компонентами дермы являются
- а) фибробласты
 - б) фиброциты
 - в) гистиоциты
 - г) тучные клетки
 - д) все перечисленные
66. Бактерицидные свойства кожи снижаются
- а) при истощающих заболеваниях
 - б) при ионизирующем излучении
 - в) при повреждении химическими веществами
 - г) при воздействии веществ, ощелачивающих кислотную мантию
 - д) при всем перечисленном

67. Меланиновый пигмент синтезируется
- а) кератиноцитами
 - б) меланоцитами
 - в) клетками Лангерганса
 - г) клетками Меркеля
 - д) всем перечисленным
68. Электросопротивление кожи зависит от всех перечисленных факторов, кроме
- а) интенсивности салоотделения
 - б) интенсивности потоотделения
 - в) степени кровонаполнения
 - г) концентрации солей в тканевой жидкости
 - д) целостности эпидермиса
69. При проникновении микробов через верхние слои эпидермиса бактерицидная защита осуществляется
- а) миграцией лейкоцитов из сосудов в дерму и эпидермис
 - б) мобилизацией гуморальных бактерицидных факторов (бактериолизин, агглютининов, лизоцима, комплемента, антимикробных ферментов и др.)
 - в) выполнением клетками Лангерганса функции макрофагов
 - г) лизосомальными ферментами кератиноцитов
 - д) всем перечисленным
70. Вещества сенсibiliзирующего действия вызывают все перечисленное, кроме
- а) контактного дерматита
 - б) аллергического дерматита
 - в) экземы
 - г) крапивницы
 - д) токсикодермии
71. Степень химического ожога зависит
- а) от вида и концентрации вещества
 - б) от продолжительности контакта
 - в) от локализации
 - г) от своевременности и правильности первой помощи
 - д) от всего перечисленного
72. Комплексное клиническое исследование кожи включает все перечисленное, кроме
- а) граттажа (поскабливания)
 - б) пальпации
 - в) диаскопии
 - г) измерения температуры кожи
 - д) измерения электросопротивления
73. Проведение дифференциального диагноза предусматривает оценку
- а) анамнеза
 - б) клинической картины заболевания
 - в) результатов лабораторного и гистологического обследования
 - г) пробного лечения
 - д) всего перечисленного
74. При хронических воспалительных негнойных процессах деготь оказывает следующее действие

- а) противовоспалительное и кератопластическое
- б) противопаразитарное и антисептическое
- в) пртивогаудное
- г) фунгицидное
- д) правильно все, кроме г)

75. К первичным морфологическим элементам кожи относят:

- а) узелки
- б) вегетации
- в) чешуйки
- г) рубцы
- д) пятна

76. К придаткам кожи относятся

- а) волосы
- б) ногти
- в) мышечные волокна
- г) нервные окончания
- д) потовые и сальные железы

77. К вторичным морфологическим элементам кожи относят:

- а) пузырьки
- б) пустулы
- в) узлы
- г) волдыри
- д) язвы

78. К разновидностям пустулы относят:

- а) узел
- б) импетиго
- в) эктиму
- г) язву
- д) фликтену

79. Спонгиоз наблюдается при:

- а) красном плоском лишае
- б) псориазе

80. Типы серозного воспаления:

- а) внутриклеточный отек
- б) гиперкератотический отек
- в) межклеточный отек
- г) баллонизирующая дегенерация

81. Гранулез – это:

- а) усиленное размножение клеток шиповатого слоя
- б) увеличение рядов зернистого слоя
- в) истончение всех слоев эпидермиса

82. При оценке роли внешних факторов в патогенезе дерматозов обращают внимание на все, кроме:

- а) условий работы
- б) уровня сахара в крови
- в) условий быта

- г) курения
 - д) употребления алкоголя
83. Сосудистые пятна больших размеров называют:
- а) розеолой
 - б) эритемой
 - в) пурпурой
 - г) гематомой
 - д) лентиго
84. Если у больного имеются пузырьки, эрозии, эскориации, корочки, папулы – какой это полиморфизм?
- а) истинный
 - б) ложный
85. Кожа состоит из слоев:
- а) эпидермиса
 - б) сосудистого слоя
 - в) мышечного слоя
 - г) дермы
 - д) гиподермы
86. Чья кожа содержит большее количество воды?
- а) детская
 - б) взрослая
87. Отеки нижних конечностей могут быть обусловлены:
- а) флебитом
 - б) сердечно – сосудистой недостаточностью
 - в) заболеваниями печени
 - г) всем перечисленным
88. В цикле роста волоса различают следующие стадии:
- а) анагенную
 - б) анагенную и катагенную
 - в) катагенную и телогенную
 - г) правильно а) и в)
 - д) правильно б)
89. Проницаемость кожи повышается при всем перечисленном, кроме
- а) мацерации рогового слоя
 - б) смазывания раздражающими веществами, усиливающими кровоток
 - в) влияния ионизирующего излучения
 - г) голодания
 - д) наложения окклюзионной повязки
90. Принципы построения дерматологического диагноза основаны на всем перечисленном, кроме:
- а) нозологической принадлежности
 - б) клинической картины
 - в) характера течения заболевания
 - г) присоединения вторичной инфекции
 - д) стадии процесса
91. При наложении окклюзионной повязки с гормональной мазью в организм через кожу всасывается:

- а) 0,5 % препарата
 - б) до 10 % препарата
 - в) 100 % препарата
 - г) не всасывается
 - д) сведения отсутствуют
92. Иглорефлексотерапия показана при всех перечисленных заболеваниях кожи, кроме:
- а) аллергодерматозов
 - б) красного плоского лишая
 - в) пиодермии
 - г) псориаза
 - д) алопеции
93. Лимфоплазия кожи проявляется:
- а) узелками
 - б) бляшками
 - в) инфильтративно – опухолевыми образованиями
 - г) всем перечисленным
94. К антигенам дермы относятся:
- а) коллаген
 - б) ядерные антигены
 - в) антигены эндотелиальных клеток
 - г) антигены клеток Лангерганса
95. Пиротерапия применяется при:
- а) сифилисе
 - б) фурункулезе
 - в) псориазе
 - г) туберкулезной волчанке
 - д) герпесе
96. Строение ногтевой пластины у детей отличается от таковой у взрослых?
- а) нет
 - б) да
97. При нарушении кератинизации кожи наиболее эффективным является назначение:
- а) тигазона
 - б) роаккутана
 - в) рибофлавина
 - г) варфарина
98. Жизненный цикл клеток эпидермиса составляет:
- а) 10 – 14 дней
 - б) 35 – 37 дней
 - в) 26 – 28 дней
99. Какова дневная норма потери рогового слоя?
- а) 10 – 14 г
 - б) 2 – 5 г
 - в) 20 – 30 г
100. Наибольшее значение для внешнего вида кожи имеют
- а) кератинизация

- б) функции сальных желез
 - в) гидратация
 - г) все перечисленное
101. Увеличение лимфоузлов по всей шее – спереди и сзади возможно при:
- а) инфекционном мононуклеозе
 - б) кори
 - в) аллергической реакции на лекарства
 - г) всем перечисленным
102. Без предшествующих высыпаний могут развиваться:
- а) лихенизация
 - б) атрофия
 - в) вегетации
103. Разновидности вегетаций:
- а) эпидермальные
 - б) эпидермо-дермальные
 - в) дермальные
 - г) не покрытые роговым слоем
 - д) все правильно
104. Биохимические процессы, присущие только коже включают образование:
- а) кератина
 - б) меланина
 - в) кожного сала
 - г) пота
 - д) все перечисленное верно
 - е) все кроме б
105. При задержке испарения кислотность эпидермиса:
- а) снижается
 - б) повышается
 - в) не изменяется
106. Быстрое испарение с кожи приводит к концентрации жирных кислот, что приводит к:
- а) повышению pH (ощелачиванию)
 - б) понижению pH (закислению)
107. Одним из признаков снижения бактерицидной функции кожи является:
- а) повышение pH (ощелачивание)
 - б) понижение pH (закисление)
108. В чем заключается наибольшее различие слоев дермы?
- а) в клеточном составе
 - б) в иммунных реакциях
 - в) в характере волокнистости
109. При каких заболеваниях в воспалительном инфильтрате присутствуют лимфоциты с «мозговидными» ядрами?
- а) васкулит
 - б) синдром Сезари
 - в) дискоидная красная волчанка
 - г) парапсориаз

- д) все перечисленное
110. Наличие розовых пятен на щеках (рубцеозы) наряду с сухостью кожи являются признаком:
- а) сахарного диабета
 - б) туберкулеза легких
 - в) цирроза печени
 - г) фосфатного диабета
111. Эозинофилия периферической крови характерна для всех заболеваний, кроме:
- а) недержание пигмента
 - б) герпетиформного дерматоза Дюринга
 - в) парагонимоза
 - г) огибающего ихтиоза Комеля
 - д) всех перечисленных
112. Во время лечения метотрексатом необходимо контролировать:
- а) содержания в крови тромбоцитов
 - б) содержания в крови лейкоцитов
 - в) функциональное состояние печени
 - г) содержание в моче сахара
113. Увеличение языка в размерах может быть проявлением:
- а) снижения функции щитовидной железы
 - б) опухоли гипофиза
 - в) амилоидоза
 - г) лейкемии
 - д) всего перечисленного
114. Какой фермент выделенный с потом, усиливает бактерицидные свойства кожи?
- а) лизоцим
 - б) гиалуронидаза
 - в) каталаза
115. К медикаментам, в связи с приемом которых может наблюдаться усиленный рост волос (гипертрихоз), относятся:
- а) псоралены
 - б) тестостерон
 - в) пенициллин
 - г) циклоспорин
 - д) кортикостероиды

Раздел 2

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ

1. Лихеноидный парапсориаз характеризуется всем перечисленным, кроме
 - а) мелких лихеноидных буровато-красноватых папул с отрубевидной чешуйкой
 - б) буроватой пигментацией с телеангиэктазиями после инволюции чешуек
 - в) незначительной пурпуры после поскабливания
 - г) сильного зуда
 - д) длительного течения и резистентности к терапии
2. В патогенезе розацеа имеют значение следующие факторы, кроме
 - а) ангионевротических расстройств
 - б) инсоляции
 - в) себорейного дерматита
 - г) ринофимы
 - д) ксантелазмы
3. Себорея способствует развитию всех перечисленных ниже заболеваний, кроме
 - а) вульгарных угрей
 - б) розацеа
 - в) себорейного дерматита
 - г) ринофимы
 - д) ксантелазмы
4. Трихонодозис – это
 - а) узловатые образования на стержне волоса
 - б) пучки коротких волос
 - в) веретеновидные волосы
 - г) спутанные волосы
5. При артропатическом псориазе целесообразно назначить все перечисленное, кроме
 - а) пенициллина и преднизолона
 - б) нестероидных противовоспалительных препаратов
 - в) оксиферрискорбона
 - г) детоксицирующих средств
 - д) антиоксидантов
6. Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют следующие особенности, кроме
 - а) папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета
 - б) вдавления в центре папулы
 - в) восковидного блеска
 - г) сетки Уикхема на поверхности папул
 - д) преимущественной локализацией на лице
7. Проявления бляшечного парапсориаза характеризуются следующими признаками, кроме:
 - а) желтовато-бурых пятен с четкими границами

- б) небольшого шелушения мелкими чешуйками, иногда незаметного, выявляющегося с помощью граттажа
 - в) преимущественной локализации на туловище и нижних конечностях
 - г) отсутствия зуда
 - д) выраженной инфильтрации и нарушения общего состояния
8. При гипотиреозе развивается
- а) генерализованная микседема
 - б) узелковая микседема
 - в) претибиальная микседема
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
9. Телеангиоэктатическая форма пигментной крапивницы обычно наблюдается
- а) в детском возрасте
 - б) исключительно у взрослых больных
 - в) с самого рождения
 - г) в пубертантный период
 - д) в любом возрасте с одинаковой частотой
10. Гистологические изменения при кольцевидной гранулеме включают
- а) фокусный некробиоз коллагена средней части дермы
 - б) радиально расположенный клеточный инфильтрат из лимфоцитов, гистиоцитов, эпителиоидных клеток, гигантских клеток типа инородного тела
 - в) расширение сосудов верхней части дермы, набухание эндотелия, утолщение стенки сосудов, периваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты, возможен стаз эритроцитов
 - г) фрагментация и отечность коллагена средней части дермы
 - д) все перечисленное
11. Причиной дерматозов, развивающихся при сахарном диабете, является
- а) снижение защитной функции кожи
 - б) нарушение обмена веществ
 - в) микроангиопатии
 - г) аллергические реакции
 - д) все перечисленное
12. Мочка ушной раковины наиболее часто поражается
- а) при псориазе
 - б) при себорейном дерматите
 - в) при микотической экземе
 - г) при стрептодермии
 - д) при контактном дерматите
13. Саркома Капоши при СПИДе (эпидемическая форма) в отличие от идиопатической классической формы, характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) молодого возраста больных
 - б) внезапного развития и стремительного прогрессирования распространенных узелковых и опухолевых образований
 - в) отсутствия субъективных ощущений и осложнения вторичной инфекцией
 - г) атипичной локализации на голове, шее, туловище, во рту

- д) сочетания с висцеральными поражениями и увеличением лимфатических узлов
14. Гиперэластическая кожа (синдром Элерса – Данлоса) характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) проявления с раннего детского возраста
 - б) повышенной ранимости кожи с легким образованием гематом, медленно заживающих ран и атрофических рубцов
 - в) чрезмерной растяжимости кожи в области суставов и на лице
 - г) чрезмерной гибкости и подвывихов суставов
 - д) ангиоидных полос на сетчатке глаз
15. Лентиго отличается от веснушек всем перечисленным, кроме
- а) большего размера пятен
 - б) ущемствования с первого года жизни
 - в) отсутствия приуроченности к участкам, подвергающимся инсоляции
 - г) увеличения количества меланоцитов в биоптате из пятна
 - д) более светлой окраски
16. Диагностика моногенных дерматозов включает все перечисленное, кроме
- а) пробы на потоотделение и салоотделение
 - б) исследования дерматоглифики и комплекса диспластических стигм
 - в) исследования кариотипа
 - г) гистологического и электронномикроскопического исследования кожи
 - д) микроскопии стержня волоса
17. Наследственную эритему ладоней и подошв надо дифференцировать со следующими болезнями, кроме
- а) эритемы ладоней при циррозе печени
 - б) ладонно-подошвенной формы болезни Девержи
 - в) рубромикоза ладоней и подошв
 - г) центробежной эритемы
 - д) ладонно-подошвенной формы псориаза
18. Типичные пигментации при множественном нейрофиброматозе (болезни Реклингхаузена) характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) появления пигментации с первого года жизни
 - б) овальных и округлых крупных «кофейных» пятен
 - в) веснушчатоподобной пигментации в подмышечных и паховых складках
 - г) постепенного увеличения числа «кофейных» пятен (не менее 6)
 - д) темного цвета пигментаций и обильных волос на их поверхности
19. Диагноз буллезной ихтиозоформной эритродермии может быть поставлен на основании наличия всего перечисленного, кроме
- а) пузырей
 - б) папилломатозных роговых разрастаний
 - в) эрозий
 - г) гиперемии
 - д) характерного диспластического лица
20. В течении атопического дерматита выделяются
- а) сезонные стадии
 - б) две стадии в зависимости от активности процесса

- в) три стадии возрастной эволютивной динамики
 - г) четыре стадии в зависимости от осложнений
 - д) стадийности не выявляется
21. При обычном псориазе излюбленной и наиболее частой локализацией высыпаний является все перечисленное, кроме
- а) волосистой части головы
 - б) разгибательных поверхностей конечностей
 - в) сгибательных поверхностей конечностей
 - г) локтей и колен
 - д) области крестца
22. Для поражения ногтей при псориазе характерно все перечисленное, кроме
- а) наперстковидного вдавления
 - б) онихолизиса
 - в) подногтевых геморрагий
 - г) симптома масляного пятна
 - д) платонихии, койлонихии, онихошизиса
23. Пустулезный псориаз Барбера (верно все, кроме)
- а) относится к осложненным формам
 - б) относится к неосложненным формам
 - в) отличается особенной торпидностью
 - г) характеризуется полиморфизмом высыпных элементов
 - д) не сопровождается системными симптомами
24. Склередеме Бушке предшествует
- а) лекарственная болезнь
 - б) лимфаденит лимфангоит
 - в) голодание и авитаминоз
 - г) стрептококковая инфекция верхних дыхательных путей, ангина, пневмония, скарлатина, рожа
 - д) ни одного из перечисленного
25. Профессиональная крапивница
- а) не отличается клинически от непрофессиональной
 - б) отличается от непрофессиональной путями попадания в организм аллергена и сильным зудом
 - в) профессиональный характер должен быть подтвержден доказательством этиологической роли производственного аллергена
 - г) достаточно анамнестического указания на связь крапивницы с профессиональными факторами
 - д) правильно а) и в)
26. Профессиональный кандидоз наиболее часто развивается у всех перечисленных групп профессий, кроме
- а) работников производства антибиотиков
 - б) работников кондитерских пищевых предприятий
 - в) работников фруктово-консервных предприятий
 - г) зубных врачей
 - д) лаборантов медицинских лабораторий, производящих исследования на кандидоз

27. Какие побочные эффекты могут возникать при лечении больного псориазом циклоспорином А?
- а) повышение артериального давления
 - б) гипертрихоз
 - в) увеличение креатинина в сыворотке крови, миалгии
 - г) нефротоксическое действие
 - д) выпадение волос
28. Пигментная ксеродерма развивается при наследовании патологического гена
- а) от отца
 - б) от матери
 - в) от одного из родителей любого пола
 - г) от обоих родителей, являющихся гетерозиготными носителями
 - д) не относится к менделирующим дерматозам
29. Причиной токсического действия лекарств является все перечисленное, кроме
- а) передозировки
 - б) замедления метаболизма у лиц с генетической недостаточностью ацетилтрансферазы
 - в) функциональной недостаточности печени
 - г) функциональной недостаточности почек
 - д) функциональной недостаточности щитовидной железы
30. После контактного аллергического дерматита слизистой оболочки рта
- а) проводить пробу нельзя в остром периоде
 - б) проба на коже может быть отрицательная
 - в) проба проводится путем помещения подозреваемого вещества на внутреннюю часть нижней губы
 - г) проба проводится путем нанесения вещества под язык
 - д) все перечисленное верно
31. Для профессиональной экземы характерны
- а) поражение кистей и предплечий
 - б) рецидив во время отпуска
 - в) связь с психотравмами
 - г) регресс в условиях стационара
 - д) правильно а) и г)
32. Обязательными раздражителями являются
- а) концентрированные растворы минеральных кислот и щелочей
 - б) газообразные и парообразные вещества (сероводород и др.)
 - в) боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия
 - г) концентрированные растворы солей тяжелых и щелочных металлов
 - д) все перечисленные
33. Условием развития дерматоза от воздействия фотодинамических веществ является
- а) повреждение кожи (микротравма)
 - б) наличие других заболеваний кожи
 - в) предшествующее солнечное облучение
 - г) одновременное солнечное облучение
 - д) все перечисленное

34. Контактный неаллергический дерматит характеризуется
- а) острым воспалением кожи на месте соприкосновения с раздражителем
 - б) острым воспалением кожи, выходящим за пределы участка, подвергнувшегося воздействию раздражителя
 - в) четкими границами
 - г) нечеткими границами
 - д) правильно а) и в)
35. Профессиональные фотодерматиты характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) возникновения через несколько часов после одновременного контакта с фотодинамическим веществом и солнечного облучения
 - б) возникновения через несколько дней после контакта с фотодинамическим веществом и одновременным солнечным облучением
 - в) жжения, светобоязни
 - г) гиперемии, отека, пузырей на коже
 - д) конъюнктивита, ринита, воспаления слизистой оболочки верхних дыхательных путей
36. Простой контактный дерматит характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) четких границ
 - б) локализации в местах контакта с раздражителем
 - в) волдырей
 - г) гиперемии
 - д) жжения
37. При контактном дерматите наименее поражаются
- а) веки
 - б) шея
 - в) половые органы
 - г) руки
 - д) ладони
38. Перiorальный дерматит (помимо перiorальной зоны) может локализоваться на коже следующих участков, кроме
- а) носогубной складки
 - б) подбородка и шеи
 - в) щек
 - г) перiorбитальной области и лба, переносицы
 - д) ушных раковин и волосистой части головы
39. Причинами возникновения профессиональных дерматозов могут быть все перечисленные ниже производственные вредности, кроме
- а) химических
 - б) физических
 - в) инфекционных
 - г) психо-эмоциональных
 - д) паразитарных
40. Факультативные раздражители могут вызывать
- а) эпидермозы
 - б) неаллергические контактные дерматиты
 - в) масляные фолликулиты

- г) гиперкератозы
 - д) все перечисленное
41. Развитие периорального дерматита связывают со всеми перечисленными причинами, кроме
- а) косметических средств
 - б) раздражающих зубных паст, раздражающей губной помады
 - в) длительного применения кортикостероидных наружных средств
 - г) себореи
 - д) микробной сенсibilизацией
42. Масляный фолликулит объясняется
- а) затвердением масла в фолликуле
 - б) активизацией роста бактерий под влиянием масла
 - в) фолликулярным гиперкератозом
 - г) всеми перечисленными факторами
 - д) правильно б) и в)
43. У больных сахарным диабетом могут развиваться следующие поражения кожи, кроме
- а) липоидного некробиоза
 - б) ксантом
 - в) кольцевидной гранулемы
 - г) диабетической дермопатии
 - д) пойкилодермии
44. Комплексное лечение при витилиго включает все перечисленные воздействия, кроме
- а) фотосенсибилизирующих средств
 - б) лечения заболеваний, усиливающих аутоаллергические процессы
 - в) устранения психо-эмоциональных расстройств и нарушений вегетативной нервной системы
 - г) устранения неблагоприятных физико-химических воздействия на кожу
 - д) наружного применения белой ртутной мази
45. Для наружного лечения основного очага микотической экземы во время мокнутия и везикуляции целесообразно применить
- а) нитрофунгин
 - б) резорциновую примочку 1%, раствор цинка сульфата 0,25%
 - в) 10% серную мазь на вазелине
 - г) целестодерм
 - д) формалиновую мазь
46. В патогенезе атопического дерматита играют роль все перечисленные факторы, кроме
- а) блокады β -адренергических рецепторов, мембранодеструктивных процессов
 - б) аллергии к микробным антигенам
 - в) аллергии к пищевым продуктам
 - г) врожденного дефекта ингибитора C3-комплемента
 - д) иммунодефицита
47. Длительное применение наружной гормональной терапии больному атопическим дерматитом может привести ко всему перечисленному, кроме

- а) полного выздоровления; наиболее эффективно, не дает осложнений
 - б) подавления глюкокортикоидной функции коры надпочечников
 - в) атрофии кожи
 - г) гипертрихоза
 - д) инфицирования очагов поражения на коже
48. Отрицательно влияют на прогноз при псориазе все перечисленные факторы, кроме
- а) диабета
 - б) наличия фокальных инфекций и нарушения иммунитета
 - в) нарушений функций печени, эндогенной интоксикации
 - г) наличия нарушений липидного обмена
 - д) низкого веса
49. Для стационарной стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме
- а) элементы полностью покрыты серебристо-белыми чешуйками
 - б) вокруг элементов – «псевдоатрофический» ободок Воронова и ободок Пильнова
 - в) прекращения появления новых высыпаний
 - г) отсутствия периферического роста элементов
 - д) насыщенно красного цвета высыпных элементов
50. Красные угри характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) эритемы
 - б) пустул
 - в) локализации в зоне бабочки на лице
 - г) телеангиэктазии
 - д) комедон, папулопустулезных элементов на шее
51. Для себорейного дерматита не характерны перечисленные признаки, кроме
- а) везикул и пузырей
 - б) лихенификации и лихеноидных полигональных папул
 - в) депигментации
 - г) шелушения жирными чешуйками в эритематозносквамозных очагах
 - д) поражения локтевых и подколенных складок, ладоней
52. К наследственным дерматозам относят все перечисленные заболевания, кроме
- а) эпидемической пузырчатке новорожденных
 - б) врожденного буллезного эпидермолиза
 - в) доброкачественной семейной пузырчатке Хейли-Хейли
 - г) буллезной ихтиозиформной эритродермии
 - д) световой оспы Базена
53. Для лечения саркомы Капоши следует применить все перечисленное, кроме
- а) средств для устранения венозной недостаточности, дапсона и препаратов мышьяка
 - б) проспидина в комплексной химиотерапии
 - в) винкристина или винбластина в комплексной химиотерапии
 - г) леакадина
 - д) реаферона
54. Кольцевидная гранулема характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) отсутствия субъективных ощущений

- б) высыпания расположены кольцевидно
 - в) исчезает спонтанно
 - г) связь с хроническими инфекционными очагами
 - д) оставляет рубцы
55. Частыми причинами ломкости ногтей является все перечисленное, кроме
- а) недостаточности периферических сосудов
 - б) постоянного травмирования и высушивания
 - в) вегетососудистой дистонии
 - г) заболевания щитовидной железы
 - д) заболевания легких
56. Характерная эволюция клинической картины атопического дерматита обусловлена
- а) длительностью заболевания
 - б) тяжестью процесса
 - в) возрастной эволютивной динамикой
 - г) наследственной отягощенностью
 - д) ассоциированными дефектами метаболизма
57. Болезнь Девержи у взрослых больных имеет следующие перечисленные признаки, кроме
- а) дебют болезни Девержи может быть во взрослом возрасте
 - б) у больных, впервые заболевших во взрослом возрасте, обычно в семье нет идентичных больных
 - в) на пальцах имеются конусы Бенье
 - г) при стертых формах поражения может длительно ограничиваться гиперкератотическими очагами на ладонях и подошвах
 - д) резко выражены феномены Ауспитца
58. Для регрессивной стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме
- а) изоморфной реакции и симптома Пильнова
 - б) развития вокруг элементов «псевдоатрофического» ободка Воронова
 - в) отсутствие периферического роста элемента
 - г) исчезновения высыпаний
 - д) побледнения окраски высыпных элементов
59. Для склеродермы Бушке характерно все перечисленное, кроме
- а) поражает чаще взрослых женщин
 - б) возникает после острой инфекции или травмы
 - в) впервые проявления возникают на лице и шее
 - г) быстро прогрессирует
 - д) характерны поражения пальцев рук, гиперпигментации, телеангиэктазии
60. Кожа моряков и земледельцев характеризуется
- а) предшествующим фотодерматитом
 - б) застойной гиперемией
 - в) поражением преимущественно открытых участков кожи
 - г) является разновидностью сенильной атрофии
 - д) всем перечисленным
61. Прогрессирующая идиопатическая атрофия кожи характеризуется всем перечисленным, кроме

- а) возникновения только в глубоком старческом возрасте
 - б) начала поражения с дистальных отделов конечностей
 - в) начальной гиперемии с тестоватым инфильтратом и отеком
 - г) последующего побледнения с сиреневатым или перламутровым оттенком, мелкопластинчатым шелушением, морщинистостью, истончением
 - д) снижения сало- и потоотделения, выпадения волос
62. Зуд кожи сопровождается
- а) сахарный диабет
 - б) уремию
 - в) лимфогранулематоз
 - г) цирроз печени
 - д) саркому Капоши
63. Наиболее характерным серологическим показателем для герпеса беременных является
- а) реакция связывания комплемента с антителами против антигенов базальной мембраны кожи при иммунофлюоресцентном исследовании сыворотки крови беременной женщины
 - б) антиядерные антитела
 - в) фактор Хазерика
 - г) повышения уровня IgA
 - д) повышение титра кожносенсibiliзирующих антител
64. При каком буллезном дерматозе у больных нередко одновременно обнаруживается повышенная чувствительность к глютену?
- а) при герпесе беременных
 - б) при герпетиформном дерматите Дюринга
 - в) при приобретенном буллезном эпидермолизе
 - г) при эритематозной пузырчатке
 - д) при синдроме Стивенса – Джонсона
65. Акантолиз с высоким расположением эпидермальных пузырей в зернистом слое в биоптате кожи обнаруживается
- а) при герпесе беременных
 - б) при листовидной пузырчатке
 - в) при приобретенном буллезном эпидермолизе
 - г) при претибиальном буллезном эпидермолизе
 - д) при буллезном пемфигоиде Левера
66. Исходом поражения мышц при дерматомиозите может быть все перечисленное, кроме
- а) мышечной атрофии
 - б) фиброзного миозита
 - в) фиброзных контрактур
 - г) кальциноза
 - д) амилоидоза
67. Развитию полной картины системной склеродермии предшествуют
- а) снижение аппетита и падение веса
 - б) общая слабость и быстрая утомляемость при привычной физической нагрузке

- в) периодические боли в крупных и мелких суставах и тянущие боли в мышцах по ночам
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
68. У старческой, кортикостероидной и цинготной пурпуры один и тот же патогенетический механизм – это
- а) тромбоцитопения
 - б) увеличенное внутрисосудистое давление
 - в) потеря сосудистого тонуса
 - г) ломкость сосудов
 - д) недостаточное свертывание крови
69. При геморрагическом васкулите наиболее характерны
- а) кровоизлияния в слизистую оболочку рта
 - б) кровоизлияния в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта
 - в) кровоизлияния в конъюнктиву
 - г) кровоизлияния во всех перечисленных локализациях
 - д) кровоизлияния в слизистые оболочки не характерны
70. Для кожной формы узелкового периартериита характерны
- а) толчкообразно проявляющиеся узелки диаметром 15мм и меньше, с нормальной или багрово-цианотичной кожей над ними, расположенные по ходу сосудов
 - б) ливедо
 - в) ограниченные отеки кожи лица, суставов, ног, кистей
 - г) узлы с геморрагическим некрозом, изъязвлением и кровоточивостью
 - д) все перечисленное
71. Трансформация пигментного невуса в злокачественную меланому может проявиться
- а) неравномерной зоной гиперемии вокруг невуса
 - б) увеличением или неравномерностью пигментации
 - в) увеличением или неравномерностью плотности
 - г) изъязвлением, кровоточивостью, увеличением размеров
 - д) всем перечисленным
72. Для кератоакантомы характерно
- а) начало с шаровидного узла
 - б) быстрый центральный распад с образованием блюдцеобразной опухоли
 - в) отторжение распадающихся масс с одновременным уплощением опухоли
 - г) образование депигментированного звездчатого рубца не позднее 3 месяцев с начала заболевания
 - д) все перечисленное
73. Диагностические критерии вульгарного аутосомно-доминантного ихтиоза основаны на выявлении (исключите неправильный ответ)
- а) шелушение кожи преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей
 - б) фолликулярного кератоза
 - в) утолщения и усиленной складчатости ладоней и подошв
 - г) эритродермии и дисморфии лица

- д) аутосомно-доминантного типа наследования
74. Клиническими проявлениями при грибковидном микозе может быть все перечисленное, кроме
- а) сильного зуда
 - б) эритематозных очагов, инфильтративных бляшек
 - в) опухолевидно-узловатых образований с язвенным распадом
 - г) эритродермии и кератодермии ладоней и подошв
 - д) лимфангиэктатических кист
75. При лечении метотрексатом больных псориазом нежелательно применять препараты
- а) ретиноиды
 - б) сульфаниламиды
 - в) салицилаты, нестероидные противовоспалительные средства
 - г) гипогликемические и диуретические средства
 - д) пантотенат кальция и гепатопротекторы
76. При длительном применении пенициллина для лечения больных склеродермией возможны побочные явления, кроме
- а) зуда, крапивницы, токсикодермии
 - б) изменения периферической крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения)
 - в) гематурии, протеинурии, нефрита
 - г) цинк-дефицитного состояния
 - д) усиления индукции кожи и образования келоидов
77. Основой патогенеза пигментной ксеродермы является
- а) нарушение темновой репарации ДНК
 - б) нарушение порфиринового обмена
 - в) повышение активности коллагеназы
 - г) недостаточность фермента арисульфатазы
 - д) снижение активности тирозиназы
78. Наиболее распространенными веществами сенсibiliзирующего действия являются
- а) полимеры
 - б) соли тяжелых металлов
 - в) фосфорорганические и хлорорганические пестициды и инсектоциды
 - г) медикаменты
 - д) все перечисленные
79. К физическим факторам, которые могут вызывать профессиональные дерматозы, относятся
- а) механические воздействия
 - б) воздействия низких и высоких температур
 - в) различные виды лучистой энергии (проникающие и непроникающие излучения)
 - г) воздействие электрическим током
 - д) все перечисленные
80. К веществам фотодинамического действия относятся
- а) продукты перегонки каменного угля
 - б) продукты перегонки нефти

- в) продукты перегонки сланцев
 - г) некоторые лекарства и растения
 - д) все перечисленные
81. Ожог, вызванный концентрированной щелочью, характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) сухого струпа
 - б) мягкого струпа
 - в) нечетких границ
 - г) постепенного распространения некроза вглубь и по периферии
 - д) рыхлого струпа
82. Токсикодермия характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) бурной воспалительной реакцией кожи
 - б) большой распространенностью, вплоть до эритродермии
 - в) нарушением общего состояния
 - г) быстрым регрессом после устранения контакта с аллергеном
 - д) всем перечисленным
83. Патогенетическим механизмом старческой и кортикостероидной пурпуры является
- а) тромбоцитопения
 - б) увеличенное внутрисосудистое давление
 - в) потеря сосудистого тонуса
 - г) ломкость сосудов
 - д) недостаточное свертывание крови
84. Профилактика злокачественных опухолей кожи включает
- а) лечение предрака
 - б) исключение повторного лечения лучами Рентгена
 - в) ограничение применения мышьяка
 - г) диспансерное наблюдение за работающими с углеводородами (продуктами перегонки нефти, угля, сланцев)
 - д) все перечисленные
85. При геморрагическом васкулите наиболее характерны кровоизлияния:
- а) кровоизлияния в слизистую оболочку рта
 - б) кровоизлияния в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта
 - в) кровоизлияния в конъюнктиву
 - г) кровоизлияния во всех перечисленных локализациях
 - д) кровоизлияния в слизистые оболочки не характерны
86. Дерматиты вызываются:
- а) механическими воздействиями
 - б) термическими воздействиями
 - в) психотравмами
 - г) пищевыми продуктами
 - д) туберкулезной палочкой
87. После вскрытия пузырька при экземе образуется:
- а) эрозия
 - б) серозный колодец
 - в) серозная корочка

- г) чешуйка
 - д) рубец
88. К микробной экземе не относится:
- а) эрозия сосков
 - б) роговая
 - в) паратравматическая
 - г) этиологически связанная с грибковой инфекцией
 - д) варикозная
89. Основной механизм развития токсикодермии:
- а) токсическая реакция
 - б) аллергическая реакция
 - в) идиосинкразия
 - г) атопия
90. В формировании пузырька характерны явления баллонной дегенерации при:
- а) истинной экземе
 - б) герпетиформной экземе Капоши
 - в) простом пузырьковом лишае
 - г) аллергическом дерматите
91. Возникновение эризипелоида способствуют:
- а) микротравма
 - б) висцеропатии
 - в) стрессы
 - г) переохлаждения конечностей
92. Какие пробы используют для подтверждения профессионального характера заболевания кожи?
- а) йодная проба Ядассона
 - б) капельная проба
 - в) йодная проба Бальцера
 - г) компрессная проба
 - д) верно б) и г)
93. Критерии диагноза профдерматоза включают все перечисленное, кроме
- а) анамнеза
 - б) профмаршрута
 - в) локализации процесса
 - г) течения дерматита
 - д) кожных проб
 - е) состояния ЖКТ
94. Для профессиональной экземы характерно
- а) поражение кистей
 - б) рецидив во время отпуска
 - в) связь с психотравмами
 - г) высокая чувствительность кожи к кобальту и трехвалентному железу
 - д) все перечисленное
95. Развитие масляных фолликулитов объясняется:
- а) затвердением масла в фолликуле
 - б) активизацией роста бактерий под влиянием масла

- в) фолликулярным гиперкератозом
 - г) всеми перечисленными факторами
 - д) правильно б и в
96. Генерализованный зуд кожи наблюдается при
- а) болезнях печени
 - б) сахарном диабете
 - в) лимфоме
 - г) заболеваниях щитовидной железы
 - д) всем перечисленным
97. Какие из перечисленных элементов встречаются при кожном зуде?
- а) эритема
 - б) папулы
 - в) эксфолиации
 - г) лихенификации
 - д) волдырь
98. Основной механизм образования волдыря
- а) инфильтрация дермы
 - б) отек сосочкового слоя
 - в) расширение сосудов
 - г) акантоз
 - д) паракератоз
99. Какие из перечисленных элементов свойственны детской крапивнице?
- а) волдыри
 - б) папуло-везикулы
 - в) лихенификации
 - г) эксфолиации
 - д) бугорки
100. Типичный ограниченный нейродермит имеет 3 зоны
- а) центральную
 - б) эритематозную
 - в) среднюю
 - г) пограничную
 - д) периферическую
101. Среди почесух наиболее тяжелое течение и тяжелые кожные проявления наблюдаются при
- а) строфумозе
 - б) узловатой почесухе Гебры
 - в) пруриго беременных
 - г) солнечном пруриго
 - д) остром пруриго взрослых
102. Атопический хейлит могут провоцировать
- а) навязчивое механическое самоповреждение
 - б) раздражающая пища
 - в) бактериальная инфекция
 - г) кандидозная инфекция
 - д) все перечисленное

103. Простой хронический лишай Видаля представляет собой
- а) ограниченный нейродермит
 - б) белый лишай
 - в) амилоидный лишай
 - г) атопический дерматит
104. При каких дерматозах наблюдается морфологический элемент – серопапула?
- а) строфулюсе
 - б) чесотке взрослых
 - в) транзиторном акантолитическом дерматозе Гровера
105. Для пруриго Гебры не характерны
- а) локализация на разгибательных поверхностях
 - б) пруригинозные узелки
 - в) лихенифицированные участки в складках
 - г) увеличение лимфатических узлов в виде пруригинозных бубонов
 - д) наличие эскориаций и кровянистых корок
106. Нарушение какого обмена наиболее часто выявляется при солнечной крапивнице?
- а) белкового
 - б) минерального
 - в) порфиринового
 - г) углеводного
 - д) липидного
107. Повышенное содержание эозинофилов периферической крови у больных с интенсивным зудом может наблюдаться при:
- а) атопическом дерматите
 - б) лимфоме
 - в) лейкозе
 - г) глистной инвазии
 - д) аллергическом дерматите
108. При мастоцитозах можно определить:
- а) накопление тучных клеток
 - б) увеличение в моче концентрации гистамина и его метаболитов
 - в) повышение в плазме крови уровня триптазы
 - г) все перечисленное верно
109. Какая проба используется для диагностики холинергической крапивницы?
- а) с никотиновой кислотой
 - б) с адреналином
 - в) проба Ядассона
 - г) проба Бальцера
 - д) триада Ауспитца
110. Основные диагностические критерии дискоидной красной волчанки
- а) эритема
 - б) фолликулярный гиперкератоз
 - в) атрофия
 - г) фотосенсибилизация
 - д) все перечисленное
111. Симптомы, характерные для дискоидной красной волчанки:

- а) дамского каблучка
 - б) яблочного желе
 - в) Бенъе-Мещерского
 - г) Горчакова-Арди
 - д) Проваливания зонда
112. Базисные препараты, используемые для лечения красной волчанки
- а) пенициллин
 - б) супрастин
 - в) преднизолон
 - г) гипосульфат натрия
 - д) антамалярийные средства
113. стадии развития ограниченной склеродермии:
- а) стадия отека
 - б) эритематозная
 - в) индуративная
 - г) стадия атрофии
 - д) сквамозная
114. Какой морфологический элемент характерен для склеродермии?
- а) эритема
 - б) бляшка
 - в) волдырь
 - г) эрозия
 - д) бугорок
115. Виды склеродермии, при которых процесс локализуется в области лица, шеи
- а) полосовидная
 - б) системная
 - в) поверхностная
 - г) болезнь белых пятен
116. Трансформация кожной формы красной волчанки в системную наиболее вероятно при:
- а) центробежной эритеме Биетта
 - б) диссеминированной красной волчанке
 - в) глубокой форме красной волчанке
 - г) все перечисленное верно
117. Диагноз при дерматомиозите основывается на:
- а) кожно-мышечном синдроме
 - б) признаках патоморфологических, дистрофических изменений со стороны поперечно-полосатых мышц
 - в) повышение трансaminaз
 - г) патологической миограмме
 - д) правильно все
118. К признакам активности склеродермического процесса относится все, кроме:
- а) увеличения размеров очага
 - б) увеличения плотности очага
 - в) появления лилового венчика вокруг бляшки
 - г) нарастания атрофии

119. Диспансерное наблюдение больных склеродермией проводится:
- а) 1 раз в год
 - б) 2 раза в год
 - в) 4 раза в год
 - г) Ежемесячно
120. Препараты применяемые для лечения ограниченной склеродермии:
- а) антибиотики
 - б) гипосенсибилизирующие
 - в) витамины
 - г) микроциркуляторы
 - д) ферменты
121. активность процесса при хроническом эритематозе определяется:
- а) содержанием R-белков
 - б) содержанием фибронектина
 - в) нахождением LE-клеток
 - г) абсолютным числом Т-РОК
 - д) всем перечисленным
122. Свечение в лучах лампы Вуда очагов красной волчанки при отсутствии гиперкератоза на слизистой оболочки:
- а) беловато-желтое
 - б) нет свечения
 - в) снежно-голубое
 - г) темно-коричневое
123. К большим симптомам дерматомиозита относят:
- а) кожный синдром
 - б) мышечный синдром
 - в) повышение уровня аминотрансфераз
 - г) изменения электромиограммы
 - д) гистологические признаки поражения мышц
 - е) все перечисленное
124. К малым симптомам дерматомиозита относят:
- а) кожный синдром
 - б) кальциноз
 - в) дисфагию
 - г) повышение уровня аминотрансфераз на 50%
125. Для дермального папуло-некротического васкулита характерно:
- а) диссеминированное расположение
 - б) локализация на сгибательных поверхностях конечностей
 - в) локализация на разгибательных поверхностях конечностей
 - г) частые поражения лица
126. Наличие боли в области подошв, особенно при ходьбе характерно для:
- а) узловатого периартериита
 - б) атрофического злокачественного папулеза
 - в) криоглобулинемии
 - г) гранулематоза Вегенера
127. Симптом «кровоточащего подкожного узла» характерен для:

- а) Узелкового периартериита
 - б) Эритемы Базена
 - в) Узлового васкулита
 - г) Острого гиподермита
128. Буро-лиловый оттенок (цвет гелиотропа) характер для высыпаний при:
- а) дерматомиозите
 - б) склеродермии
 - в) красном плоском лишае
 - г) дискоидной красной волчанке
129. Отечные геморрагические пятна – «пальпируемая пурпура» характерны для:
- а) васкулитов кожи
 - б) б-ни Кавасаки
 - в) гранулематоза Вегенера
130. Синдром Бехчета:
- а) ассоциирован с антигеном HLA – B51
 - б) является аутоиммунным заболеванием
 - в) часто является семейным заболеванием
 - г) часто тяжелее протекает у женщин
 - д) распространен в Африке
131. Клинические проявления синдрома Бехчета включают:
- а) изъязвление слизистой оболочки рта
 - б) многоформную эритему
 - в) васкулит сетчатки
 - г) периостит
 - д) синдром Бадди-Киари
132. Лечение синдрома Бехчета включает:
- а) талидомид при узловой эритеме
 - б) циклофосфамид при упорных заболеваниях глаз
 - в) циклоспорин А при изъязвлениях в полости рта и на гениталиях
 - г) азатиоприн при заболеваниях глаз
 - д) верно а,б,в
 - е) все перечисленное верно
133. При каком буллезном дерматозе у больных нередко обнаруживается повышение чувствительности к глютену:
- а) герпесе беременных
 - б) герпетическом дерматозе Дюринга
 - в) приобретенном буллезном эпидермолизе
 - г) эритродермической пузырчатке
 - д) синдроме Стивенса-Джонса
134. Для пузырчатки и дерматоза Дюринга общими являются:
- а) первичный морфологический элемент – пузырь
 - б) мономорфизм сыпи
 - в) положительный симптом Никольского
 - г) отсутствие субъективных ощущений
135. Йодная проба проводится при:
- а) дерматозе Дюринга

- б) вульгарной пузырчатке
 - в) разноцветном лишае
 - г) красном плоском лишае
136. У больных дерматозом Дюринга отмечается повышенная чувствительность к препаратам:
- а) серы
 - б) меди
 - в) йода
 - г) золота
137. Интраэпидермальное расположение пузыря наблюдается при:
- а) пузырчатке
 - б) простом герпесе
 - в) буллезной форме СКВ
 - г) болезни Хейли-Хейли
 - д) дерматозе Дюринга
138. При каком пузырьном дерматозе вследствие длительного течения патогномичным является наличие фолликулярного гиперкератоза в области лица, спины?
- а) листовидной пузырчатке
 - б) буллезном пемфигоиде
 - в) дерматозе Дюринга
139. Симптом «сползания» эпидермиса относится к основному признаку:
- а) вульгарной пузырчатки
 - б) пемфигоида
 - в) герпетиформного дерматоза Дюринга
 - г) синдрома Лайелла
 - д) синдрома Стивенса-Джонсона
140. Для диагностики каких заболеваний показан метод прямой иммунофлюоресценции:
- а) буллезного пемфигоида
 - б) васкулита
 - в) герпеса беременных
 - г) герпетиформного дерматоза Дюринга
 - д) все верно
141. Акантолиз с высоким расположением эпидермальных пузырей в зернистом слое в биоптате кожи обнаруживается при:
- а) герпесе беременных
 - б) листовидной пузырчатке
 - в) приобретенном буллезном эпидермолизе
 - г) претибиальном буллезном эпидермолизе
 - д) при буллезном пемфигоиде Левера
142. Общим признаком для субкорнеального пустулеза Уилкинсона и листовидной пузырчатки являются:
- а) напряженные пузыри, пузырьки, пустулы, фликтены
 - б) группировка элементов в виде дуг и гирлянд
 - в) фестончатые края очага поражения

- г) расположение пузыря под роговым слоем
 - д) отрицательный симптом Никольского
143. При псориазе в большей степени имеются нарушения:
- а) липидного обмена
 - б) углеводного обмена
 - в) обмена кальция
 - г) белкового обмена
 - д) верно а и б
144. Какие первичные элементы не характерны для псориаза?
- а) волдырь
 - б) вапула
 - в) пузырек
 - г) пятно
 - д) бугорок
145. Триада Ауспитца выявляется при:
- а) красной волчанке
 - б) лепре
 - в) псориазе
 - г) экземе
 - д) туберкулезе
146. Для красного плоского лишая характерно все, кроме:
- а) папул
 - б) геморрагических пятен
 - в) розово-синюшной окраски элементов
 - г) восковидного блеска
 - д) полигональной формы и пупковидного вдавления
147. Отрицательно влияют на прогноз при псориазе все перечисленные факторы, кроме:
- а) диабета
 - б) фокальных инфекций и нарушений иммунитета
 - в) нарушений функций печени, эндогенной интоксикации
 - г) нарушений липидного обмена
 - д) низкого веса
148. Противопоказаниями для использования ПУВА-терапии являются:
- а) гиперчувствительность к псоралену
 - б) фотосенсибилизация
 - в) меланома
 - г) беременность
 - д) отсутствие хрусталика
 - е) все правильно
149. Какие клинические формы псориаза нуждаются в специальном трудоустройстве:
- а) артропатическая
 - б) эритродермия
 - в) ладонно-подошвенная
 - г) все перечисленное
150. К клиническим формам псориаза не относятся:

- а) точечный
 - б) каплевидный
 - в) географический
 - г) гиперкератотический
 - д) атрофический
151. к клиническим формам красного плоского лишая не относят:
- а) кольцевидный
 - б) пемфигоидный
 - в) бородавчатый
 - г) атрофический
 - д) системный
152. Лихеноидный хронический параспориоз характеризуется всеми перечисленными симптомами, кроме:
- а) феномена «облатки»
 - б) феномена скрытого шелушения
 - в) появления мелких плотных красно-коричневых папул
 - г) положительной пробы «жгута»
 - д) положительной триады Ауспитца
153. Какие из иммунопрепаратов наиболее показаны к использованию при любой форме псориаза?
- а) тактивин
 - б) миелопид
 - в) полиоксидоний
 - г) тималин
 - д) верно а,б,в
154. Признаками озлокачествления меланоцитарного невуса являются:
- а) увеличение площади и высоты элемента
 - б) усиление интенсивности пигментации или элементов сателлитов
 - в) развитие воспалительной реакции в невусе
 - г) образование эрозий или изъязвления
 - д) все перечисленное верно
155. Чаще всего эритроплазия Кейра локализуется:
- а) на коже кистей
 - б) на коже туловища
 - в) в области половых органов мужчин
 - г) в области половых органов женщин
 - д) на коже нижних конечностей
156. Эритроплазия кейра относится к группе
- а) предрака
 - б) внутриэпидермального рака
 - в) плоскоклеточного рака
 - г) базалиом
 - д) папиллом
157. Дифференциально-диагностическим признаком поверхностной формы базалиомы является:
- а) шелушение

- б) наличие мелких блестящих узелков по периферии пятна
 - в) безболезненность
 - г) интенсивный зуд
 - д) верно а и в
158. К так называемым «меланонеопасным» невусам относят:
- а) фиброэпителиальный невус
 - б) папилломатозный
 - в) веррукозный
 - г) «монгольское» пятно
 - д) Невус Сеттона (галоневус)
159. К невусам – предшественникам меланомы относят:
- а) невус Ота
 - б) гигантский пигментный невус
 - в) меланоз Дюбрея
 - г) верно б и в
 - д) все перечисленное верно
160. Важной клинической особенностью ангиоретикулеза Капоши является:
- а) многоочаговость
 - б) распространенность
 - в) симметричность
 - г) поражение слизистых оболочек
 - д) увеличение периферических лимфузлов
161. Стадийность классификации Т-клеточных лимфом кожи подразумевает:
- а) ограниченные бляшки (< 10% поверхности кожи)
 - б) распространенная (>10% поверхности кожи)
 - в) опухоли на коже
 - г) эритродермия
 - д) все перечисленное
162. Для кератоакантомы не характерна:
- а) «псевдоязва»
 - б) спонтанная инволюция
 - в) трансформация в базалиому
 - г) локализация на открытых участках кожи
 - д) плотноэластическая консистенция
163. Какой из приведенных признаков не характерен для классической саркомы Капоши?
- а) частое развитие у женщин
 - б) частое развитие у мужчин
 - в) локализация в области голеней и стоп
 - г) наличие пятен, бляшек, узлов
 - д) заканчивается лимфостазом
164. К клиническим типам бовеноидного папулеза относят следующие:
- а) в виде эритематозных пятен
 - б) лихеноидные и пигментированные папулы
 - в) лейкоплакиеподобные очаги поражения
 - г) верно а,в

- д) верно все перечисленное
165. На самых ранних стадиях Т-лимфомы кожи при медленном прогрессировании предпочтительно:
- а) ограничиться местным лечением
 - б) проводить регулярную полихимиотерапию
 - в) назначить интерлейкин-2
 - г) провести лейкаферез
 - д) провести экстракорпоральную фотохимиотерапию
166. Трихонодоз – это:
- а) узловатые образования на стержне волоса
 - б) пучки коротких волос
 - в) скрученные волосы
 - г) веретеновидные волосы
 - д) спутанные волосы
167. Кожа лица свободна от высыпаний при следующих дерматозах, кроме:
- а) болезни Ходжкина
 - б) каплевидного парапсориаза
 - в) баланита
 - г) хронического акродерматита Галлопо
 - д) розовых угрей
168. Для клинической картины розового лишая не характерно наличие:
- а) пятен
 - б) волдырей
 - в) овальной формы высыпаний
 - г) «медальонов»
 - д) Синюшной окраски элементов
169. Симптомы жидкой себореи наиболее часто наблюдаются на коже:
- а) лица
 - б) волосистой части головы
 - в) груди
 - г) спины
 - д) все перечисленное верно
170. Симптомы густой себореи наиболее часто наблюдаются на коже:
- а) груди
 - б) спины
 - в) лица
 - г) волосистой части головы
 - д) все перечисленное верно
171. Лечебное питание больных себореей и угревой болезнью предусматривает все перечисленное, кроме:
- а) гипоаллергенной диеты
 - б) уменьшение в рационе животных жиров
 - в) исключение поваренной соли
 - г) исключение острых блюд
 - д) ограничение углеводов
172. Выделяют типы гнездной алопеции:

- а) атопический
 - б) прегипертензивный
 - в) смешанный
 - г) аутоиммунный
 - д) все перечисленное верно
173. Наследственную природу гнездной алопеции подтверждают следующие наблюдения, кроме:
- а) семейного накопления аналогичного поражения
 - б) высокой частоты идентичного заболевания у однояйцевых близнецов
 - в) связи с генетическими детерминантами тканевых антигенов
 - г) сцепленного с полом наследования
 - д) верно а и б
174. Клиническая гетерогенность гнездной алопеции проявляется:
- а) в разнообразии клинических форм
 - б) в различии типов течения заболевания
 - в) в различной связи с другими конституциональными факторами
 - г) все перечисленное верно
 - д) верно а и б
175. Основной причиной гнездной алопеции считают:
- а) иммунные нарушения
 - б) неправильный уход за волосами
 - в) патологию антенатального развития
 - г) наследственные нарушения синтеза кератина
 - д) гиперандрогению
176. Перiorальный дерматит может локализоваться на коже следующих участков, кроме:
- а) носогубной складки
 - б) подбородка и шеи
 - в) щек
 - г) периорбитальной области
 - д) всех перечисленных участков
177. К клиническим формам розацеа относят все, кроме:
- а) стероидной
 - б) гранулематозной (люпоидной)
 - в) грамнегативной
 - г) конглобатной
 - д) граммпозитивной
178. Для вульгарного ихтиоза характерно все, кроме:
- а) сухости кожи
 - б) наслоения чешуек
 - в) ломкости ногтей
 - г) сочетания с отолитическим дерматитом
 - д) отсутствия фолликулярного гиперкератоза
179. Различают такие клинические формы болезни Дарье:
- а) узелково-роговая
 - б) узелково-везикулярная

- в) пемфигоидная
 - г) вегетирующая
 - д) все перечисленное
180. Узловатая эритема развивается при следующих инфекционных заболеваниях:
- а) иерсинеозе
 - б) вирусных инфекциях
 - в) стрептококковых инфекциях
 - г) при всех перечисленных
 - д) верно а и в
181. Наиболее значимые признаки кольцевидной центробежной эритемы Дарье:
- а) пятна розового цвета
 - б) папулы розового цвета
 - в) выражен
 - г) эксцентричный рост
 - д) западает центральная часть элемента
 - е) все перечисленное верно
182. Какие факторы в настоящее время относят к центральным патогенетическим механизмам гнездной алопеции?
- а) психические отклонения
 - б) неврологические нарушения
 - в) иммунопатологические процессы
 - г) метаболические дефекты
 - д) инфекционные процессы
183. иммунопатогенез гнездной алопеции связан:
- а) с высоким уровнем IgE
 - б) с активацией Т-хелперов и накоплением их вокруг волосяных фолликулов
 - в) с иммунодефицитом
 - г) с циркуляцией и депозитами иммунных комплексов
 - д) верно а и в
184. Болезни ороговения на слизистых присущи:
- а) б-ни Девержи
 - б) б-ни Дарье
 - в) кератодермии Тоста-Унны
 - г) порокератозу Мибелли
 - д) всему перечисленному
185. Какое исследование необходимо назначить для выявления латентной формы пахионихии (с-м Ядассона-Левандовского)?
- а) биопсию
 - б) развернутый анализ крови
 - в) оценка коэффициента Тх/Тс
 - г) оценка коэффициента гидроксипролина и мукополисахаридов
 - д) все перечисленное
186. Папулезные и узловые токсидермии могут иметь клиническую картину:
- а) красного плоского лишая
 - б) острой узловатой эритемы

- в) аллергического васкулита
 - г) псориаза
187. О каком течении крапивницы свидетельствует периодическое появление уртикарных высыпаний в срок до 6 недель ?
- а) остром
 - б) хроническом
188. К самым тяжелым формам лекарственной токсидермии относят :
- а) синдром Стивенса-Джонсона
 - б) синдром Лайелла
 - в) ТЭН
 - г) злокачественную экссудативную эритему
189. Среди первых ученых, описавших профдерматозы были :
- а) Agricola
 - б) Paracelsus
 - в) Ramazzini
 - г) Willan
 - д) правильно все
200. При интенсивной физической нагрузке возникает крапивница:
- а) холинергическая
 - б) механическая
 - в) солнечная
 - г) холодовая

Раздел 3

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ

1. Инфекции ВИЧ не передаются
 - а) трансфузионным путем
 - б) трансмиссивным путем
 - в) от заболевшей матери к плоду
 - г) инъекционным путем
 - д) половым путем
2. СПИДу могут сопутствовать
 - а) оппортунистические инфекции внутренних органов

- б) поражения нервной системы
 - в) эпидемическая саркома Капоши
 - г) волосатая лейкоплакия языка
 - д) все перечисленное
3. Для стрептококкового импетиго характерно все перечисленное, кроме
- а) появления на коже фликтен
 - б) желтых корок
 - в) быстрого распространения
 - г) воспалительных узлов
 - д) воспалительного ободка вокруг фликтен
4. При стрептококковом импетиго назначается все перечисленное, кроме
- а) растворов анилиновых красок
 - б) мазей со стероидными гормонами
 - в) вскрытия фликтен
 - г) паст с антибиотиками
 - д) мазей с антибиотиками
5. Для простого пузырькового лишая характерны все перечисленные признаки, кроме
- а) эритемы
 - б) отека
 - в) группы пузырьков
 - г) пузырей
 - д) эрозий
6. К клиническим симптомам простого пузырькового лишая относится все перечисленное, кроме
- а) пятен и волдырей
 - б) пузырьков
 - в) наличия венчика гиперемии вокруг очага
 - г) группировки высыпаний на ограниченном участке кожи
 - д) склонности к рецидивам
7. К препаратам, предназначенным для наружного применения при лечении простого и опоясывающего герпеса, относятся все перечисленные, кроме

- а) оксолиновой мази
 - б) линимента госсипола
 - в) ихтиоловой мази
 - г) теброфеновой мази
 - д) мази заверакс
8. Методы лечения простого пузырькового лишая включают все перечисленное, кроме
- а) симптоматического местного лечения
 - б) симптоматического общего лечения
 - в) противовирусной антибиотикотерапии
 - г) специфической иммунотерапии
 - д) неспецифической иммунотерапии
9. Для опоясывающего лишая характерны
- а) эритема
 - б) отек
 - в) язвы
 - г) некроз
 - д) все перечисленное
10. Физиотерапевтическое лечение опоясывающего лишая целесообразно назначать
- а) в начале заболевания
 - б) в острой фазе
 - в) в неполной ремиссии
 - г) при неврологических осложнениях
 - д) правильно в) и г)
11. Поливалентная герпетическая вакцина назначается больным
- а) простым герпесом в остром периоде
 - б) простым герпесом в период обратного развития высыпаний
 - в) рецидивирующим герпесом в период полной ремиссии
 - г) рецидивирующим герпесом в период неполной ремиссии
 - д) во всех перечисленных случаях

12. К разновидностям простого пузырькового лишая в зависимости от локализации относится
- а) герпес лица (губ, носа и т.д.)
 - б) герпес гениталий
 - в) герпетический кератит и гингивостоматит
 - г) герпетический менингоэнцефалит
 - д) все перечисленное
13. Целью симптоматической терапии при герпетической инфекции является
- а) ограничить распространение очагов инфекции и предупредить их нагноение
 - б) противорецидивное действие
 - в) санировать очаг вирусной инфекции
 - г) достичь иммунотерапевтического эффекта
 - д) все перечисленное
14. Ограниченное использование противовирусных антибиотиков при лечении герпетической инфекции связано
- а) с сильным токсическим действием на клетки организма больного и низкими антивирусными свойствами
 - б) с отсутствием противовирусных антибиотиков
 - в) с плохим проникновением препаратов в кожу
 - г) с плохим проникновением препаратов в нервные ганглии
 - д) правильного ответа нет
15. Использование в лечении герпетической инфекции интерферона и индукторов интерферона
- а) защищает неинфицированные вирусом клетки (ткани)
 - б) подавляет репродукцию вируса
 - в) стимулирует специфический иммунитет
 - г) стимулирует неспецифический иммунитет
 - д) предупреждает пиогенизацию очагов
16. К противовирусным препаратам,

применяемым при простом и опоясывающем лишае, относится

- а) интерферон
- б) бонафтон и метисазон
- в) герпетическая вакцина
- г) дезоксирибонуклеаза
- д) все перечисленное

17. В комплексное лечение опоясывающего лишая включается

- а) противовирусные антибиотики
- б) g-глобулин
- в) интерферон
- г) витамины группы В
- д) все перечисленное

18. К противовирусным препаратам относятся все перечисленные, кроме

- а) триоксазина
- б) метисазона
- в) оксолина
- г) госсипола
- д) бонафтона

19. Специфическая иммунотерапия больных рецидивирующим герпесом проводится

- а) интерфероном
- б) поливалентной герпетической вакциной
- в) пирогеналом
- г) иммуноглобулином
- д) левамизолом

20. Больным рецидивирующим герпесом в фазу обострения назначается все перечисленное, кроме

- а) поливалентной герпетической вакцины и пирогенала
- б) интерферона
- в) противовирусных антибиотиков
- г) левамизола

- д) иммуноглобулина
21. Методы лечения рецидивирующего герпеса включают
- а) противовирусную антибиотикотерапию
 - б) специфическую и неспецифическую иммунотерапию
 - в) лечение индукторами интерферона
 - г) симптоматическую терапию
 - д) все перечисленное
22. Больным рецидивирующим герпесом в фазу ремиссии назначается
- а) противовирусные антибиотики
 - б) аутогемотерапия
 - в) герпетическая вакцина
 - г) противовирусные мази
 - д) ничего из перечисленного
23. Для опоясывающего лишая характерны все перечисленные признаки, кроме
- а) резкой болезненности
 - б) нарушения общего состояния
 - в) диссеминации высыпания по всему туловищу
 - г) асимметричности и группировки высыпаний
 - д) отсутствия рецидивов
24. К клиническим вариантам опоясывающего лишая относятся все перечисленные, кроме
- а) везикулезного
 - б) буллезного
 - в) генерализованного
 - г) гангренозного
 - д) уртикарного
25. Узлы при колликативном туберкулезе
- а) плотные и безболезненные
 - б) мягкие и безболезненные

- в) эластичные и болезненные
 - г) мягкие и болезненные
 - д) плотные и болезненные
026. Люпус-карцинома - это
- а) одновременное возникновение туберкулезной волчанки и рака кожи
 - б) развитие туберкулезной волчанки на фоне рака кожи
 - в) развитие рака кожи у больного туберкулезной волчанкой независимо от локализации обоих заболеваний
 - г) развитие рака кожи на фоне туберкулезной волчанки или на рубце после туберкулезной волчанки
 - д) все перечисленное
27. К излюбленной локализации язвенного туберкулеза кожи относится все перечисленное, кроме
- а) слизистой рта
 - б) слизистой носа
 - в) языка
 - г) слизистой наружного отверстия уретры
28. Излюбленной локализацией колликувативного туберкулеза является
- а) подчелюстные и шейные лимфатические узлы
 - б) подкрыльцовые лимфатические узлы
 - в) пахово-бедренные лимфатические узлы
 - г) кубитальные лимфатические узлы
29. При изъязвлении туберкулезной волчанки
- а) края язвы мягкие, неровные, подрытые
 - б) края язвы плотные, ровные, штампованные
 - в) дно язвы гладкое, чистое, без налета
 - г) дно язвы зернистое, покрыто гнойным налетом
 - д) правильно а) и г)
30. В дифференциальном диагнозе туберкулезной волчанки следует учитывать
- а) люпоидный сикоз

- б) эритематоз
- в) лимфоцитому
- г) плоскоклеточный рак
- *) все перечисленное

31. При туберкулезной волчанке характерно

- а) рубцевание язвы начинается с центральной части очага
- б) рубцевание язвы начинается с периферической части очага
- в) рубец гладкий, нежный, обесцвеченный
- г) рубец грубый, плотный, с бугристой поверхностью, пигментированный
- д) правильно а) и в)

32. Бородавчатый туберкулез кожи надо дифференцировать

со всеми перечисленными заболеваниями, кроме

- а) хронической вегетирующей пиодермии
- б) веррукозного красного плоского лишая
- в) вульгарной бородавки
- г) псориаза
- д) рака кожи

33. Для туберкулезной волчанки характерно

- а) хроническое течение
- б) медленно прогрессирующее течение
- в) быстро прогрессирующее течение
- г) рецидивирующее течение
- д) инволюционное течение

34. Колликувативный туберкулез может быть

- а) первичный
- б) вторичный
- в) третичный
- г) все перечисленное правильно
- д) правильно а) и б)

35. К локализованным формам туберкулеза относятся все перечисленные,

кроме

- а) милиарного язвенного
- б) первичного шанкриформного
- в) колликвативного
- г) люпозного
- д) лихеноидного

36. Сформированная люпома имеет цвет

- а) темно-красный
- б) темно-красный с коричневатым оттенком
- в) светло-красный
- г) светло-красный с желтоватым оттенком
- д) желтовато-коричневый

37. При надавливании на люпому пуговчатым зондом

- а) возникает резкая болезненность
- б) болезненности нет или незначительная
- в) болезненность зависит от размеров очага
- г) болезненность зависит от стадии поражения
- д) появляется кровотечение

38. К диссеминированным формам туберкулеза относятся все перечисленные, кроме

- а) острого диссеминированного милиарного
- б) лихеноидного
- в) папуло-некротического
- г) индуративной эритемы Левандовского
- д) колликвативного

39. Для туберкулезной волчанки характерно начало

- а) в раннем детском возрасте
- б) в подростковом и юношеском возрасте
- в) в зрелом возрасте
- г) в пожилом возрасте
- д) правильно все, кроме в) и г)

40. Туберкулезную волчанку следует дифференцировать
- а) с бугорковым сифилисом
 - б) с мелкоузелковым саркоидозом
 - в) с туберкулоидной лепрой
 - г) с туберкулоидным лейшманиозом
 - д) со всем перечисленным
41. Клиническими разновидностями туберкулезной волчанки являются все перечисленные формы, кроме
- а) плоской
 - б) опухолевидной
 - в) псориазиформной
 - г) лихеноидной
42. При туберкулезной волчанке не поражаются
- а) кости носа
 - б) кости твердого неба
 - в) хрящи носа и ушной раковины
 - г) подкожная клетчатка
 - д) кости свода черепа
43. Для туберкулезной волчанки характерно все перечисленное, кроме
- а) медленного эксцентричного роста очага
 - б) быстрого эксцентричного роста очага
 - в) склонности к слиянию бугорков
 - г) склонности люпом к периферическому росту
 - д) изъязвления бугорков
44. Узлы при колликувативном туберкулезе характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) подвижности
 - б) спаянности с кожей
 - в) размягчения
 - г) самостоятельного вскрытия

- д) безболезненности
45. Для колликвативного туберкулеза кожи характерно все перечисленное, кроме
- а) узлов в подкожно-жировой клетчатке
 - б) овальной формы узлов
 - в) шаровидной формы узлов
 - г) размеров узлов от 1 до 3 см
46. После вскрытия узла при колликвативном туберкулезе образуется
- а) эрозия
 - б) язва
 - в) свищевой ход
 - г) все перечисленное
 - д) узлы не вскрываются
47. Язва при колликвативном туберкулезе имеет
- а) плотные вывороченные края
 - б) мягкие подрытые края
 - в) дно красное, блестящее, чистое
 - г) дно желтоватое, покрыто грануляциями
 - д) правильно б) и г)
48. При колликвативном туберкулезе рубцы
- а) гладкие, атрофичные
 - б) гладкие, гипертрофированные
 - в) келоидные
 - г) с перемычками (трабекулярные) или сосочковыми разрастаниями
 - д) правильно все перечисленное
49. "Львиное" лицо характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) глубоких инфильтратов кожи и подкожной клетчатки на лице
 - б) грубых складок на лице
 - в) утолщения носа, губ, ушных раковин
 - г) истончения и атрофии крыльев носа и ушных раковин

- д) выпадения бровей
50. Возбудитель лепры при лепроматозном типе лепры обнаруживается
- а) в соскобе со слизистой перегородки носа
 - б) в соскобе с поверхности инфильтрата
 - в) в пункционном материале из инфильтрата
 - г) в гистологическом препарате
 - д) во всем перечисленном, кроме б)
51. Бугорки при туберкулоидной лепре
- а) крупные
 - б) мелкие и плоские
 - в) остроконечные
 - г) полушаровидные
 - д) не имеют специфического вида
52. Наиболее частыми симптомами поражения периферических нервов при туберкулоидной лепре являются
- а) парезы, параличи
 - б) атрофия, трофические язвы, мутиляции
 - в) контрактуры, деформации кистей и стоп
 - г) лагофтальм
 - д) все перечисленные
53. При туберкулоидной лепре поражение внутренних органов, лимфатических узлов и глаз встречается
- а) постоянно
 - б) часто
 - в) редко
 - г) не встречается
 - д) правильно а) и б)
54. При лепроматозном типе лепры развиваются
- а) хронические отеки и слоновость
 - б) пахово-бедренные адениты

- в) изъязвления
 - г) расстройства чувствительности
 - д) все перечисленное
55. Узлы при лепроматозной лепре
- а) не возвышаются над уровнем кожи и обнаруживаются лишь при пальпации
 - б) возвышаются над уровнем кожи
 - в) захватывают подкожную клетчатку
 - г) проникают в кости
 - д) правильно все перечисленное
56. Течение туберкулоидной лепры
- а) острое
 - б) подострое
 - в) хроническое с обострениями
 - г) хроническое без обострений
 - д) возможны все перечисленные варианты
57. Очаги поражения при туберкулоидной лепре характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) нечетких границ
 - б) четких границ
 - в) валикообразного края
 - г) тенденции к периферическому росту
 - д) уменьшения инфильтрации в центре
58. При туберкулоидной лепре поражаются
- а) кожа
 - б) периферическая нервная система
 - в) центральная нервная система
 - г) опорно-двигательный аппарат
 - д) правильно а) и б)
59. Бугорки при туберкулоидной лепре

- а) лежат изолированно
 - б) сливаются и немногочисленные
 - в) многочисленные
 - г) возможно все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
60. Для туберкулоидной лепры характерны все признаки, кроме
- а) гиперестезии вокруг очагов поражения кожи
 - б) анестезии в очагах и вокруг них
 - в) отсутствия потоотделения
 - г) выпадения пушковых волос
 - д) раннего поражения периферических нервов
61. Кожа над узлами при лепроматозной лепре характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) багрово-синюшной окраски
 - б) розово-красной окраски
 - в) типа апельсиновой корки
 - г) значительного утолщения, грубых складок
 - д) изъязвлений
62. Для глубокой дифтерии кожи характерно
- а) первичность поражения
 - б) нарушение общего состояния
 - в) болезненность в очаге поражения
 - г) увеличение регионарных лимфатических узлов, их плотность, болезненность, подвижность
 - д) все перечисленное
63. Дифтерийная язва характеризуется
- а) штампованными краями и отсутствием налета
 - б) подрытыми краями и серовато-зеленоватым или беловато-желтоватым налетом
 - в) вывороченными краями и серовато-зеленоватым налетом
 - г) возможны все перечисленные варианты

- д) ничего из перечисленного
64. Язвенную форму дифтерии половых органов надо дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме
- а) мягкого шанкра
 - б) твердого шанкра
 - в) острой язвы вульвы
 - г) фузоспириллеза
 - д) фурункула
65. Псевдодифтерийные язвы характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) быстрого развития заболевания
 - б) большого числа язв
 - в) увеличения регионарных лимфатических узлов
 - г) нарушения общего состояния
 - д) болезненности регионарных лимфатических узлов
66. Излюбленная локализация поверхностной дифтерии кожи у женщин и детей
- а) половых органов у женщин
 - б) половых органов у детей
 - в) заушных складок у женщин
 - г) заушных складок у детей
 - д) все перечисленное, кроме в)
67. Дифтерия кожи и слизистой половых органов
- а) вызывается тем же возбудителем, что и дифтерия зева
 - б) вызывается дифтероидами
 - в) бывает первичной, без дифтерии зева, или вторичной, при наличии дифтерии зева
 - г) бывает у бациллоносителей
 - д) правильно а) и в)
68. К клиническим формам глубокой дифтерии кожи относятся
- а) узловатая (гуммозная)

- б) язвенная
 - в) флегмонозная
 - г) гангренозная
 - д) все перечисленное, кроме а)
69. Клинические формы поверхностной дифтерии включают
- а) импетигоподобную
 - б) эктимоподобную
 - в) экзематоидную
 - г) интритригинозную
 - д) все перечисленное, кроме б)
70. Псевдодифтерийные язвы имеют
- а) фестончатые или неправильные очертания
 - б) ровное дно и подрытые края
 - в) гнойные налеты
 - г) резко болезненны
 - д) все перечисленное
71. Глубокой дифтерией половых органов наиболее часто болеют
- а) мужчины
 - б) женщины и дети
 - в) лица старческого возраста
 - г) подростки
 - д) различий по полу и возрасту нет
72. При эризипелоиде возможно все перечисленное, кроме
- а) болезненности в очаге поражения
 - б) тугоподвижности межфаланговых суставов
 - в) болезненности и увеличения регионарных лимфатических узлов
 - г) общего недомогания, субфебрилитета, озноба
 - д) диспептических расстройств, рвоты, поноса, снижения аппетита
73. Эризипелоид как профессиональное заболевание возможен
- а) у поваров

- б) у рабочих мясо- и рыбоперерабатывающего производства
- в) у кондитеров
- г) у медицинских работников
- д) правильно а) и б)

74. Эризипелоид развивается чаще всего после

- а) длительной мацерации эпидермиса
- б) переохлаждения конечностей
- в) микротравмы
- г) общего переохлаждения
- д) ожога

75. Инкубационный период при эризипелоиде продолжается

- а) 1-3 дня
- б) 5-7 дней
- в) 7-14 дней
- г) 21 день
- д) отсутствует

76. Эризипелоид начинается с появления

- а) эритемы
- б) отека и напряжения
- в) зуда, жжения
- г) болезненности
- д) всего перечисленного

77. Эритема при эризипелиоде

- а) распространяется медленно, в течение 7-10 дней
- б) распространяется быстро, в течение 3-5 дней
- в) распространение эритемы идет равномерно во все стороны
- г) распространение эритемы идет в основном в проксимальном направлении
- д) правильно б) и г)

78. В процессе эволюции эритемы при эризипелоиде

- а) центральная часть западает и приобретает цианотичный оттенок
- б) край остается ярко-красным и приподнятым
- в) сохраняется эксцентричный рост
- г) эритема распадается на отдельные очаги
- д) происходит все перечисленное

79. Для фузоспириллеза характерно

- а) слабая выраженность воспалительных явлений вокруг язвы
- б) незначительные изменения или отсутствие изменений лимфатических узлов
- в) умеренная болезненность в очаге поражения даже при большой величине язвы
- г) отсутствие изменений общего состояния
- д) все перечисленное

80. Шанкриформная форма фузоспириллеза отличается

- а) правильными округлыми очертаниями язвы
- б) гладким дном
- в) отсутствием налета
- г) наличием инфильтрации в основании язвы
- д) всем перечисленным

81. К клиническим формам фузоспириллеза относятся

- а) эрозивная
- б) язвенная
- в) шанкриформная
- г) дифтероидная
- д) все перечисленное, кроме а)

82. Язвенная форма фузоспириллеза характеризуется

- а) неправильными очертаниями
- б) кратерообразным легко кровоточащим дном
- в) легко удаляемым желтовато-зеленоватым налетом
- г) широкой зоной гиперемии вокруг язвы
- д) всем перечисленным, кроме г)

83. Милиарная форма острой язвы вульвы характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) отсутствия нарушения общего состояния
 - б) небольшого количества язв
 - в) размера язв до 1-2 мм в диаметре
 - г) локализации в основном по гребням больших половых губ
 - д) склонности к рецидивам
84. О начале обратного развития гангренозной формы острой язвы вульвы свидетельствует все перечисленное, кроме
- а) очищения дна язвы
 - б) снижения температуры
 - в) уменьшения болезненности
 - г) уменьшения отека
 - д) рубцевания язвы
85. Язвы при гангренозной форме острой язвы вульвы имеют все перечисленные признаки, кроме
- а) неправильных очертаний
 - б) дна ровное, ярко-красное
 - в) налет желтовато-сероватый или черный некротический, плотно прикрепленный к дну
 - г) гиперемии и отека вокруг язвы
 - д) вывороченных краев
86. Гангренозная форма острой язвы вульвы характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) медленного развития заболевания
 - б) острого озноба и повышения температуры
 - в) жгучих болей в области половых органов
 - г) быстро развивающегося отека половых губ
 - д) быстрого формирования язв
87. При псевдовенерической форме острой язвы вульвы

- а) дно язв покрыто гнойным налетом
- б) инфильтрация в основании дна мягкая
- в) инфильтрация в основании дна плотная
- г) инфильтрация в основании дна отсутствует
- д) правильно а) и б)

88. Псевдовенерическая форма острой язвы вульвы напоминает

- а) твердый шанкр
- б) мягкий шанкр
- в) шанкриформную пиодермию
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

89. При острой язве вульвы одновременно с язвами могут обнаруживаться высыпания

- а) типа экссудативной многоформной эритемы
- б) типа узловатой эритемы
- в) афты на слизистой оболочке рта
- г) все перечисленное
- д) правильно б) и в)

90. Нарушение общего состояния при острой язве вульвы отмечается

- а) при гангренозной форме
- б) при псевдовенерической форме
- в) при милиарной форме
- г) правильно а) и б)
- д) общее состояние не нарушается ни при одной из форм

91. К клиническим формам острой язвы вульвы относятся все перечисленные, кроме

- а) гангренозной
- б) псевдовенерической
- в) шанкриформной
- г) милиарной
- д) возможны все перечисленные формы

92. Псевдовенерическая форма острой язвы вульвы характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) подрытых краев
 - б) безболезненности при дотрагивании
 - в) появления новых язв по мере заживления существовавших ранее
 - г) склонности к рецидивам
 - д) нарушения общего состояния
93. Норвежская чесотка
- а) представляет географическую разновидность обычной чесотки
 - б) вызывается аномальной реакцией хозяина
 - в) вызывается чесоточными клещами - паразитами животных
 - г) обычно бывает у инвалидов и умственно отсталых людей
 - д) правильно б) и г)
94. Для чесотки характерны
- а) лентикулярные папулы
 - б) геморрагии
 - в) точечные зудящие пузырьки и узелки
 - г) волдыри
 - д) полигональные папулы
95. Скорость генерализации чесотки зависит от всех перечисленных факторов, кроме
- а) количества клещей, попавших на кожу в момент инфицирования
 - б) половых и возрастных особенностей кожи
 - в) индивидуального чувства зуда
 - г) гигиенических навыков
 - д) состояния иммунитета
96. Язва при шанкриформной пиодермии имеет все перечисленные признаки, кроме
- а) свободна от налета
 - б) покрыта гнойными налетами

- в) покрыта распадающимися массами
 - г) покрыта геморрагической коркой
 - д) покрыта некротической коркой
97. При подозрении на шанкриформную пиодермию необходимо провести все перечисленные исследования, кроме
- а) на бледную трепонему отделяемого серума с поверхности язвы
 - б) РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем)
 - в) РИФ (реакция иммунофлюоресценции)
 - г) КСР (классические серологические реакции)
 - д) все перечисленные исследования
98. Болезненность при шанкриформной пиодермии
- а) отсутствует или незначительная
 - б) умеренная
 - в) сильная
 - г) очень сильная
 - д) возможны все перечисленные варианты
99. При шанкриформной пиодермии, пока не исключен диагноз сифилиса, назначаются
- а) антибиотики
 - б) повязки с анилиновыми красителями
 - в) исследование на бледную трепонему
 - г) мази с антибиотиками
 - д) правильно б) и в)
100. При шанкриформной пиодермии регионарные лимфатические узлы
- а) не увеличены
 - б) увеличены
 - в) плотно-эластические
 - г) мягкие
 - д) правильно б) и в)
101. Инфильтрат при шанкриформной пиодермии

- а) мягкий
- б) плотный
- в) не выступает за границы язвы
- г) выступает за границы язвы
- д) правильно б) и г)

102. Шанкриформная пиодермия начинается

- а) с пятна
- б) с пузырька
- в) с пустулы
- г) с эрозии
- д) с узелка

103. Язва при шанкриформной пиодермии характеризуется

- а) узким воспалительным венчиком розово-красного цвета вокруг язвы
- б) воспалительным ободком синюшно-багрового цвета
- в) краями ровными, покатыми и возвышенными
- г) плотными, вывороченными краями
- д) правильно а) и в)

104. Язва при шанкриформной пиодермии

- а) правильных округлых или овальных очертаний
- б) неправильных очертаний с неровным, бугристым дном
- в) дно гладкое
- г) правильно а) и в)
- д) возможно все перечисленное

105. Рожа

- а) стрептококковая инфекция кожи и подкожной клетчатки
- б) часто локализуется на лице
- в) редко повторяется
- г) пораженная поверхность может быть покрыта пузырями
- д) правильно все перечисленное, кроме в)

106. Для стафилококкового импетиго характерно

- а) появление на коже мелких пустул, пронизанных в центре волосом
- б) наличие воспалительного венчика по периферии пустул
- в) и то, и другое
- г) ни то, ни другое

107. Рецидивирующая рожа может приводить

- а) к лимфостазу и слоновости
- б) к тромбофлебиту
- в) к поражению внутренних органов
- г) ко всему перечисленному
- д) ни к чему из перечисленного

108. Больные рожей лица нуждаются

- а) в срочной госпитализации
- б) в госпитализации не нуждаются
- в) в срочном назначении антибиотиков
- г) в срочной изоляции
- д) правильно а) и в)

109. При кольцевидном импетиго назначаются

- а) антибиотики
- б) анилиновые красители
- в) сульфаниламидные препараты
- г) мази с антибиотиками
- д) правильно б) и г)

110. При щелевидном импетиго назначается все перечисленное, кроме

- а) антибиотиков
- б) повязок с анилиновыми красителями
- в) повязок с 2% риваноловой пастой
- г) мазей с антибиотиками
- д) дезинфицирующих мазей

111. При вульгарной эктине больному назначаются

- а) антибиотики

- б) повязки с анилиновыми красителями
 - в) примочки с 2% раствором борной кислоты
 - г) мази с антибиотиками
 - д) правильно а) и г)
112. При гидрадените необходимо назначить
- а) антибиотики
 - б) повязку с анилиновыми красителями
 - в) холод
 - г) повязку с чистым ихтиолом
 - д) правильно а) и г)
113. При фурункулезе не следует назначать
- а) флуцинар
 - б) чистый деготь
 - в) мази с антибиотиками
 - г) фукорцин
 - д) анилиновые красители
114. При гидрадените в воспалительный процесс вовлекаются
- а) апокриновые потовые железы
 - б) эккриновые потовые железы
 - в) сальные железы
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
115. Гангренозная пиодермия возникает чаще всего на фоне
- а) хронического язвенного колита
 - б) регионального энтерита
 - в) ревматоидного артрита
 - г) узелкового периартериита
 - д) дерматомиозита
116. Хирургическое лечение фурункула рекомендуется
- а) в стадии начальной инфильтрации

- б) в стадии размягчения центральной части
- в) в стадии формирования стержня
- г) при абсцедировании
- д) не рекомендуется

117. При фурункулезе обязательно исследование

- а) крови на сахар
- б) крови на билирубин
- в) мочи на креатинин
- г) кала на гельминты
- д) всего перечисленного

118. При наружном лечении пиодермии

необходимо применить все перечисленное, кроме

- а) дезинфекции кожи в очаге
- б) дезинфекции кожи вокруг очага
- в) бритья волос
- г) удаления корок
- д) дезинфекции белья

119. Стафилококковый анатоксин применяется

- а) при фурункулезе
- б) при карбункуле
- в) при гидрадените
- г) при рецидивирующем фурункулезе
- д) при всем перечисленном

120. При тяжелых распространенных пиодермиях

показано все перечисленное, кроме

- а) стафилококкового g-глобулина
- б) гипериммунной плазмы
- в) стафилококковой вакцины
- г) Т-активина
- д) декариса

121. При псевдофурункулезе в воспалительный процесс вовлекаются
- а) эккриновые потовые железы
 - б) апокриновые потовые железы
 - в) волосяные фолликулы
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
122. Для стафилококковых пиодермий характерно
- а) гнойнички плоские, дряблые
 - б) гнойнички напряженные, конической или полушаровидной формы
 - в) поражение сально-волосяных фолликулов и потовых желез
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
123. При стрептококковой опрелости больному назначаются
- а) ежедневные ванны
 - б) антибиотики
 - в) повязки с анилиновыми красителями
 - г) мази с антибиотиками
 - д) все перечисленное, кроме а) и б)
124. Симптомами стрептококковых пиодермий являются
- а) гнойнички плоские, дряблые
 - б) гнойнички напряженные, конической или полушаровидной формы
 - в) поражение сально-волосяных фолликулов и потовых желез
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
125. При шаровидных угрях назначаются
- а) местно анилиновые красители
 - б) местно чистый ихтиол
 - в) вскрытие очага поражения
 - г) антибиотики
 - д) правильно в) и г)

126. Бугорки при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи
- а) быстро увеличиваются в размерах
 - б) медленно увеличиваются в размерах
 - в) не сливаются
 - г) иногда сливаются
 - д) правильно б) и г)
127. Инкубационный период при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи составляет
- а) 10-20 дней
 - б) 1-1.5 месяца
 - в) 2-3 месяца
 - г) от 3 месяцев до 1 года
 - д) более 1 года
128. Остронекротизирующий лейшманиоз кожи является
- а) зоонозным
 - б) антропонозным
 - в) и то, и другое
 - г) ни то, ни другое
129. Изъязвление при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи после появления бугорков происходит не ранее
- а) 1-2 месяцев
 - б) 3-4 месяцев
 - в) 5-6 месяцев
 - г) 1 года
 - д) возможно в любые сроки
130. Лимфангит при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи
- а) распространенный
 - б) регионарный
 - в) встречается реже, чем при остронекротизирующемся лейшманиозе
 - г) встречается также часто, как при зоонозном лейшманиозе
 - д) правильно б) и в)

131. Быстроизъязвляющийся лейшманиоз кожи характеризуется
- а) локализацией на открытых участках кожи
 - б) локализацией на любых участках кожи
 - в) изъязвлением в течение первых трех месяцев с момента появления
 - г) изъязвлением в течение 4-6 месяцев с момента появления
 - д) правильно а) и г)
132. Туберкулоидный лейшманиоз характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) появления новых бугорков на месте рубца или вокруг него
 - б) желтовато-бурого цвета бугорков
 - в) отсутствия феномена яблочного желе
 - г) склонности к группировке
 - д) длительного существования без изъязвления
133. Туберкулоидный лейшманиоз - это
- а) лейшманиоз у больного туберкулезной волчанкой
 - б) лейшманиоз кожи у больного любой формой туберкулеза кожи
 - в) особый вид поздно изъязвляющегося лейшманиоза кожи у больного, инфицированного туберкулезом
 - г) особый вид поздно изъязвляющегося лейшманиоза кожи
 - д) ничего из перечисленного
134. Изъязвление при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи бывает
- а) поверхностным
 - б) глубоким
 - в) с округлыми или овальными очертаниями
 - г) с неправильными очертаниями
 - д) правильно а) и г)
135. Поздно изъязвляющийся лейшманиоз кожи является
- а) зоонозным
 - б) антропонозным
 - в) антропозоонозным

136. При обратном развитии поздно изъязвляющегося лейшманиоза кожи
- а) рубцевание заканчивается в течение 1 месяца
 - б) рубцевание может затянуться до 2 лет
 - в) образуется втянутый рубец
 - г) образуется гипертрофированный рубец
 - д) правильно б) и в)
137. При поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи язва имеет
- а) штампованные края и дно, покрытое коркой
 - б) вывороченные края и чистое дно
 - в) валикообразные края и дно, покрытое коркой
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
138. Бугорки при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи
- а) мягкие
 - б) эластичные
 - в) плотные, покрыты чешуйками
 - г) гладкие
 - д) внешне не специфичны
139. Бугорки при поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи
- а) розово-красные
 - б) красные
 - в) красновато-коричневые или красновато-синюшные
 - г) желтые
 - д) цвета здоровой кожи
140. Для чесотки, вызванной паразитами животных, не характерно
- а) острое начало
 - б) сильный зуд
 - в) поражение участков кожи, соприкасавшихся с больным животным
 - г) хроническое течение
 - д) самоизлечение

141. Милиарная форма демодекоза не характеризуется
- а) милиарными нессливающимися узелками
 - б) отечным и гиперемизированным фоном
 - в) слиянием узелков с образованием бляшек
 - г) умеренным зудом и жжением в очагах
 - д) тенденцией к периферическому росту узелков
142. Клещевой дерматит может вызываться укусами клещей-паразитов
- а) домовых мышей
 - б) домовых крыс
 - в) домашней птицы
 - г) голубей и других птиц, обитающих на чердаках
 - д) всех перечисленных
143. Для лечения демодекоза используется все перечисленное, кроме
- а) противовоспалительных средств
 - б) гормональных мазей и кремов
 - в) антипаразитарных средств
 - г) гипосенсибилизирующих средств
 - д) лечения фоновых заболеваний
144. Аутовакцина показана при:
- а) карбункулах
 - б) гидрадените
 - в) часто рецидивирующем фурункулезе
 - г) гангренозной пиодермии
 - д) всем перечисленном
145. Гнойное воспаление апокриновых потовых желез – это:
- а) фурункул
 - б) сикоз
 - в) гидраденит
 - г) псевдофурункулез
146. Гидраденитом болеют:
- а) дети грудного возраста
 - б) дети до периода полового созревания
 - в) лица зрелого возраста

- г) лица преклонного и старческого возраста
147. Пиодермии классифицируют как:
- а) стрептококковые
 - б) гнойные
 - в) стафилококковые
 - г) атипичные
 - д) язвенные
 - е) генерализованные
 - ж) смешанные
148. Для стрептодермий характерно наличие:
- а) остиофолликулитов
 - б) фликтен
 - в) угрей
 - г) комедонов
 - д) импетиго
 - е) кист
149. К клиническим проявлениям заболеваний кожи, вызванных стафилококками не относятся:
- а) ботриомикома
 - б) фолликулит
 - в) сикоз
 - г) фурункул
 - д) карбункул
 - е) эктима
 - ж) везикулопустулез
 - з) розовый лишай
150. Назначение антибиотиков считается обязательным при:
- а) пиодермиях сопровождающихся лихорадкой
 - б) рецидивирующих, осложненных пиодермиях
 - в) при локализации фурункула на лице
 - г) язвенно-вегетирующих пиодермиях
 - д) пиогранулеме
151. Для вульгарного сикоза характерно:
- а) вялое течение
 - б) острое течение

- в) развитие атрофии
 - г) наличие узлов
 - д) остиофолликулиты
 - е) язвы с подрытыми краями
152. При рожистом воспалении применяется все перечисленное, кроме:
- а) анилиновых красителей
 - б) кортикостероидных мазей
 - в) паст с антибиотиками
 - г) перекиси водорода
 - д) раствора риванола
153. Пути проникновения различных веществ и микроорганизмов через кожу включают:
- а) межклеточный
 - б) трансклеточный
 - в) через потовые железы
 - г) через сальные железы
 - д) через волосяные фолликулы
 - е) все перечисленное верно
154. При наружном лечении пиодермии необходимо применить все перечисленное, кроме:
- а) дезинфекции кожи в очаге
 - б) дезинфекции кожи вокруг очага
 - в) бритья волос
 - г) удаления корок
155. Внедрению псевдомонозной инфекции в кожу способствует все, кроме:
- а) окклюзии
 - б) гипергидроза
 - в) высокой влажности
 - г) ношения мокрого белья
 - д) потертости
156. Средства лечения больных чесоткой:
- а) димедрол 1%
 - б) спрегаль
 - в) саркоптол
 - г) целестодерм
 - д) бензилбензоат

157. Сроки наблюдения за больными чесоткой:

- а) 2 недели
- б) 3 недели
- в) 1 месяц
- г) 2 месяца
- д) 1,5 месяца

158. Мероприятия, проводимые работниками санэпиднадзора по борьбе с чесоткой включают:

- а) эпидемиологическое наблюдение за очагами чесотки, зарегистрированными в организованных коллективах в течение 1,5 месяцев
- б) обследование половых контактов
- в) дезинфекция нательного и постельного белья
- г) заполнение эпид. карты
- д) заполнение учетной формы 089-у
- е) организация проведения заключительной дезинфекции во всех очагах чесотки
- ж) все перечисленное

159. Заражению чесоткой способствуют:

- а) плохие санитарно-гигиенические условия
- б) загрязненность кожи
- в) повышенная потливость
- г) попадание чесоточных клещей на кожу
- д) все перечисленное

160. На каких участках кожи наблюдается преимущественная локализация чесоточных ходов?

- а) кисти
- б) запястья
- в) живот
- г) ягодицы
- д) верно а,б
- е) верно все перечисленное

161. Лечение чесотки проводится в стационарных условиях, если:

- а) больной страдает заболеванием, не позволяющим самообслуживание
- б) имеется сочетание ее с другими дерматозами в стадии обострения
- в) отсутствует возможность изоляции пациента
- г) все перечисленное верно

162. Особенности врачебной тактики при выявлении норвежской чесотки:

- а) обследование бытовых контактов
- б) наложение карантина
- в) оценка иммунного статуса
- г) обследование на ВИЧ

163. Особенности чесотки у грудных детей:

- а) осложнение пиодермией
- б) отсутствие экскориаций
- в) локализация высыпаний на ладонях и подошвах

164. Источником заражения при псевдочесотке могут быть:

- а) собаки
- б) кошки
- в) лошади
- г) кролики
- д) человек
- е) верно все, кроме д

165. Распределение чесоточных ходов по кожному покрову определяется следующими факторами:

- а) строением кожи
- б) гигротермическим режимом кожи
- в) скоростью регенерации эпидермиса
- г) наличием волосяных фолликулов
- д) верно а,б,г
- е) верно все перечисленное

166. Какими факторами определяется распределение самок чесоточных клещей по кожному покрову?

- а) строением кожи
- б) гигротермическим режимом кожи
- в) скоростью регенерации эпидермиса
- г) все перечисленное верно

167. Среди характерных симптомов при чесооке выделяют:

- а) Арди
- б) Горчакова
- в) Михаэлиса
- г) Сезари
- д) верно а,б,в
- е) верно все

168. К наиболее распространенным паразитарным заболеваниям кожи относятся:

- а) педикулез
- б) демодекоз
- в) акариаз
- г) чесотка
- д) флеботодермия

169. Вши рода *Pediculus* являются источником заражения инфекционными заболеваниями:

- а) малярией
- б) окопной лихорадкой
- в) эпидемиологическим сыпным тифом
- г) боррелиозом
- д) возвратным тифом

170. Санитарно-эпидемиологические мероприятия в очаге при выявлении больного чесоткой:

- а) извещение по форме 089 – у
- б) осмотр контактных лиц
- в) текущая дезинфекция
- г) заключительная дезинфекция
- д) написание акта осмотра контактных лиц

е) все перечисленное верно

171. Для диагностики вшивости ведущее значение имеет наличие:

- а) насекомых и гнид
- б) увеличение IgM
- в) корок
- г) расчесов

172. Какое из перечисленных средств не вызывает гибели вшей?

- а) ниттифор
- б) лонцид
- в) опофос
- г) перметрин
- д) диоксидин

173. Препарат, который можно назначать внутрь при лечении упорных случаев чесотки:

- а) фуросемид
- б) котримоксазол
- в) ивермектин
- г) омега -3
- д) тиберал
- е) бугадион

174. Ведущим в эпидемиологии чесотки является очаг:

- а) семейный
- б) потенциальный
- в) репродуктивный
- г) действующий

175. К заболеваниям, течение которых осложняется наличием демодекса, относятся:

- а) розацеа
- б) розацеаподобный дерматит
- в) себорейный дерматит
- г) периоральный дерматит

д) все перечисленное

176. Признаки постскабиозного узелка имеют все характеристики, кроме:
- а) болезненности
 - б) розоватого цвета
 - в) плотной консистенции
 - г) зуда
 - д) наличия лимфоидного инфильтрата
177. Какой из перечисленных органов и систем не поражается при боррелиозе:
- а) кожа
 - б) сердечно-сосудистая система
 - в) нервная система
 - г) суставы
 - д) печень
178. К гельминтозам кожи относится все, кроме:
- а) шистосомного дерматита
 - б) линейного мигрирующего миаза
 - в) спонгилоидоза
 - г) трихинеллеза
 - д) аскаридоза
179. Клещевые возвышения Бенъе характеризуют:
- а) боррелиоз
 - б) флебатодермию
 - в) чесотку
 - г) все правильно
180. Вульгарные бородавки вызываются:
- а) РНК – содержащими вирусами
 - б) папилломавирусом
 - в) ДНК – содержащими вирусами
 - г) аденовирусом

182. Резервуаром ВПЧ у человека является:
- а) кожа
 - б) лимфатический узел
 - в) кости
 - г) почки
 - д) чувствительные ганглии
183. Целью противовирусной терапии при герпетической инфекции является:
- а) подавление репродукции вируса
 - б) достижение быстрого регресса воспалительного процесса
 - в) противорецидивное действие
 - г) стимулирование иммунной системы
 - д) правильно а и б
184. К противовирусным препаратам относятся все, кроме:
- а) фамвира
 - б) виролекса
 - в) метисазона
 - г) цефамезина
185. Выбор метода лечения наружных генитальных бородавок зависит от:
- а) типа кондилом
 - б) распространенности поражения
 - в) опыта медперсонала
 - г) правильно а,б
 - д) все перечисленное верно
186. Клинические проявления цитомегаловирусной инфекции возможно лишь на фоне:
- а) иммунодефицита
 - б) анемии
 - в) эндокринных нарушений
 - г) артериальной гипертензии

187. Одной из наиболее тяжелых форм простого герпеса является:
- а) зостериформная
 - б) офтальмогерпес
 - в) abortивная
 - г) герпетиформная экзема Капоши
188. Какой из лабораторных показателей является наиболее важным при коррекции дозы ацикловира?
- а) СОЭ
 - б) клиренс креатинина
 - в) уровень IgM
 - г) время кровотечения
189. Какой из приведенных форм туберкулеза кожи страдают преимущественно мужчины?
- а) эритемой Базена
 - б) скрофулодермой
 - в) бородавчатым туберкулезом
 - г) острым милиарным туберкулезом
 - д) всеми приведенными формами
190. Какой из приведенных форм туберкулеза кожи страдают преимущественно женщины?
- а) скрофулодермой
 - б) эритемой Базена
 - в) бородавчатым туберкулезом
 - г) лишаем золотушных
 - д) всеми приведенными формами
191. К разновидностям клинических форм саркоидоза Бека относятся:
- а) ангиолюпоид Брока-Потрие

- б) рассеянный мелкоузелковый саркоид
- в) крупноузловый саркоид
- г) диффузно-инфильтративный саркоид
- д) фрагментированный саркоид

192. Профилактика лепры включает:

- а) обследование членов семьи больного 1 раз в год
- б) изоляция новорожденных детей от больных матерей
- в) вакцинация БЦЖ населения в эндемичных районах по лепре
- г) превентивное лечение родственников больного с активной формой лепры
- д) все перечисленное

193. К редким вариантам саркоидоза кожи относят:

- а) саркоидоз Бека
- б) ознобленная волчанка Бенъе-Тенессона
- в) ангиолюпоид Брока-Потрие
- г) подкожный саркоид Дарье-Русси
- д) эритродермический

194. Феномен «запыленности» при диаскопии обнаруживается при:

- а) красной волчанке
- б) саркоидозе
- в) лепре
- г) розовых угрях

195. В диагностике саркоидоза наиболее значимы:

- а) гистологические исследования
- б) феномен «запыленности» тест Квейма
- в) кальциурия
- г) снижение иммуннорегуляторного индекса
- д) все перечисленное верно
- е) правильно а,б,в

196. Образование рецидива бугорка на мягком месте, ровном, поверхностном рубце свидетельствует в пользу какого заболевания?
- а) третичного сифилиса
 - б) туберкулезной волчанке
 - в) лейшманиоза
 - г) лепры
197. Сроки наблюдения за больными чесоткой:
- а) 1 неделя
 - б) 3 недели
 - в) 4 недели
 - г) 5 недель
 - д) 6 недель
198. Какое из приведенных средств не вызывает гибели вшей ?
- а) ниттифор
 - б) лонцид
 - в) опофос
 - г) перметрин
 - д) диоксидин
199. Среди характерных для чесотки симптомов выделяют :
- а) Горчакова
 - б) Никольского
 - в) Ауспитца
 - г) Пинкуса
 - д) Бальцера
200. Источником заражения при псевдочесотке могут быть:
- а) ребенок
 - б) взрослый человек
 - в) крысы
 - г) кошки
 - д) верно все кроме а и б

Раздел 4

ГРИБКОВЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ

1. Лечение ребенка с микроспорией волосистой части головы следует проводить
 - а) амбулаторно
 - б) в стационаре
 - в) по желанию родителей
 - г) по усмотрению врача
 - д) возможны все перечисленные варианты

2. Ребенок, лечившийся по поводу микроспории волосистой части головы, может посещать школу после
 - а) одного отрицательного анализа
 - б) второго отрицательного анализа
 - в) третьего отрицательного контрольного анализа
 - г) шестого отрицательного контрольного анализа
 - д) сразу после окончания лечения

3. Различают следующие формы споротрихоза
 - а) поверхностная
 - б) локализованная подкожная
 - в) диссеминированная кожная
 - г) висцеральная
 - д) все перечисленные

4. Подмышечный трихомикоз вызывается
 - а) стрептококками
 - б) грибами
 - в) стафилококками
 - г) коринебактериями
 - д) вирусами

5. К противокандидозным средствам для лечения кожи относятся все перечисленные, кроме
 - а) мазей нистатиновой, амфотерициновой, декаминовой 0.5-1%

- б) 0.25% спиртового или водного раствора анилиновых красителей
- в) левориновой взвеси (2 г леворина, 20 мл 95% этилового спирта, 1000 мл дистиллированной воды)
- г) бонафтоновой, оксолиновой или теброфеновой мазей
- д) клотримазола

6. Хронический кандидоз слизистых связан с

- а) гипотиреозом
- б) гипопаратиреозом
- в) гипокортицизмом
- г) понижением секреторной функции половых желез
- д) со всем перечисленным

7. К побочным действиям нистатина относятся все перечисленные, кроме

- а) тошноты
- б) рвоты
- в) жидкого стула
- г) повышения температуры
- д) дерматитов

8. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме

- а) сахарного диабета
- б) длительного лечения антибиотиками
- в) потливости, мацерации кожи
- г) иммунодефицита
- д) гипертонической болезни

9. Плесневые грибы поражают все перечисленное, кроме

- а) кожи
- б) слизистых
- в) ногтей
- г) внутренних органов
- д) волос

10. Онихолизис может возникнуть на фоне

- а) кожных болезней
- б) травматизации
- в) эндокринных нарушений
- г) бактериальных и грибковых инфекций
- д) всего перечисленного

11. Атрофия ногтевых пластинок может развиваться при

- а) болезнях центральной и периферической нервной системы
- б) эндокринопатиях
- в) травматизации и нарушениях кровообращения
- г) грибковых поражениях
- д) всем перечисленном

12. Для споротрихоза характерны следующие клинические формы

- а) локализованный (лимфатический)
- б) диссеминированный
- в) поверхностный (эпидермальный и дермальный)
- г) висцеральный
- д) все перечисленные формы

13. Источником инфекции при споротрихозе является

- а) почва, мох
- б) злаки
- в) древесные материалы
- г) испражнения голубей
- д) все перечисленное, кроме г)

14. Современное название возбудителей трихофитии

- а) трихофитон фиолетовый
- б) тонзурас
- в) акуминатный
- г) кратериформный
- д) правильно а) и б)

15. Микроскопическое отличие пораженного волоса при инфильтративно-нагноительной трихофитии касается
- а) эндотрикса
 - б) эктотрикса
 - в) спор, расположенных цепочкой
 - г) спор, расположенных хаотично
 - д) правильно б) и в)
16. Для наружного лечения микозов применяются все перечисленные препараты, кроме
- а) микосептина
 - б) ламизила
 - в) микозолона
 - г) преднизолона
 - д) клотримазола
17. Хромомикоз характеризуется поражением всех перечисленных тканей, кроме
- а) кожи
 - б) подкожной клетчатки
 - в) слизистых
 - г) внутренних органов
 - д) эпидермиса
18. Для разноцветного лишая характерно
- а) хроническое течение
 - б) наличие пятен
 - в) отрубевидное шелушение
 - г) фестончатые очертания очагов
 - д) все перечисленное, кроме г)
19. Для глубокой трихофитии характерно
- а) общее недомогание с повышением температуры тела
 - б) наличие островоспалительных инфильтратов
 - в) положительный симптом "медовых сот"
 - г) самопроизвольное разрешение

д) все перечисленное, кроме г)

20. Для трихофитии волосистой части головы характерны

- а) мелкие множественные очаги, в очагах поражения видимы неизменные волосы
- б) белая муфта у основания волос
- в) четкие очертания очага
- г) крупные очаги, сплошное поражение волос

21. Для скутулярной формы фавуса характерно все перечисленное, кроме

- а) атрофичности и безжизненности волос
- б) мышиного запаха
- в) зуда
- г) эктимы
- д) рубцовой атрофии

22. Заражение микроспорией может происходить

- а) в детских коллективах
- б) при контакте с кошками и собаками
- в) в парикмахерских
- г) при работе на животноводческих фермах
- д) правильно все перечисленное, кроме г)

23. Для поражения волос при микроспории характерно все перечисленное, кроме

- а) частичного обламывания волос в очаге поражения на высоте 1-2 мм
- б) обламывания волос на высоте 4-8 мм
- в) наличия беловатой муфты вокруг обломанного волоса
- г) зеленого свечения волос при облучении очагов лампой Вуда

24. Для микроспории волосистой части головы характерно все перечисленное, кроме

- а) очаги мелкие, множественные
- б) у основания волос белая муфта
- в) очаги имеют четкие очертания
- г) очаги крупные, поражение волос сплошное

25. Для скутулярной формы фавуса характерны все перечисленные признаки, кроме

- а) эритемы
- б) рубцовой атрофии
- в) фавозных щитков
- г) облысения
- д) обломанных волос

26. Различают все следующие виды спор у дерматофитов, кроме

- а) хламидоспор
- б) артроспор
- в) бластоспор
- г) фиалоспор
- д) веретена

27. Переходящие антитела к дерматофитам

- а) присутствуют у всех дерматофитов
- б) легко обнаруживаются постоянно
- в) очевидны при пассивной перемещающейся крапивной реакции на трихофитин
- г) передают иммунитет на дерматофитные инфекции

28. Микроскопическое отличие пораженного волоса при поверхностной трихофитии касается

- а) эндотрикса
- б) эктотрикса
- в) спор, расположенных цепочкой
- г) спор, расположенных хаотично
- д) правильно а) и в)

29. Для общей терапии микозов применяются все перечисленные препараты, кроме

- а) дефазолина
- б) гризеофульвина
- в) нистатина
- г) леворина
- д) амфотерицина В

30. В комплекс лечения больного рубромикозом входит

- а) удаление ногтей
- б) отслойка ногтевого ложа, кожи стоп и ладоней
- в) лечение гризеофульвином, низоралом, ламизилом
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

31. Клиническими формами кандидоза являются

- а) кандидоз слизистых оболочек
- б) кандидоз складок кожи
- в) висцеральный кандидоз
- г) хронический генерализованный кандидоз
- д) все перечисленные

32. Сопутствующими заболеваниями, наиболее часто выявляемыми у детей, больных кандидозом, являются

- а) хронические рецидивирующие, острые респираторные вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии
- б) гнойные отиты и хронические тонзиллиты
- в) атопический дерматит
- г) астмоидный бронхит
- д) все перечисленное

33. К клиническим формам фавуса волосистой части головы относятся все перечисленные, кроме

- а) скутулярной
- б) сквамозной
- в) импетигиозной
- г) эритематозной
- д) питериоидной

34. К факторам, способствующим развитию кандидоза кожи, относятся все перечисленные, кроме

- а) чрезмерной инсоляции
- б) гиповитаминоза
- в) иммунодефицитного состояния

- г) дисбактериоза
- д) эндокринных и обменных нарушений

35. К микозам человека, вызываемым грибами, поражающими животных, относятся

- а) микроспория
- б) инфильтративно-нагноительная трихофития
- в) поверхностная трихофития
- г) рубромикоз
- д) правильно а) и б)

36. Зоофильными грибами вызываются

- а) микроспория
- б) поверхностная трихофития
- в) глубокая трихофития
- г) разноцветный лишай
- д) правильно а) и в)

37. Грибковые заболевания кожи вызываются всеми перечисленными возбудителями, кроме

- а) трихофитонов
- б) эпидермофитонов
- в) палочек Ганзена
- г) дрожжеподобных грибов
- д) микроспорумов

38. Профилактика грибковых заболеваний кожи включает

- а) выявление источников заражения, их изоляцию и дезинфекцию помещений
- б) обследование контактов
- в) ветеринарный надзор за животными
- г) периодический медицинский осмотр персонала, подверженного грибковым заболеваниям (детские и бытовые учреждения)
- д) все перечисленное

39. Для микроспории гладкой кожи характерно все перечисленное, кроме

- а) пятен

- б) нечетких границ и быстрого самопроизвольного разрешения
- в) пузырьков по краю очагов
- г) шелушения
- д) пустул

40. При поражении плесневыми грибами ногтевая пластинка окрашивается в цвет

- а) серый
- б) черный
- в) зеленовато-желтый
- г) все перечисленные цвета
- д) не окрашивается

41. В зависимости от локализации различают следующие формы актиномикоза

- а) челюстно-лицевой
- б) торакальный
- в) абдоминальный, органов малого таза и мочеполовых органов
- г) все перечисленные
- д) ничего из перечисленного

42. К побочным действиям леворина относятся все перечисленные, кроме

- а) тошноты
- б) рвоты
- в) кожного зуда
- г) дерматитов
- д) послабления стула

43. Для повышения фагоцитарной активности лейкоцитов при торпидной системной кандидозной инфекции у детей применяют

- а) нуклеиново-кислый натрий
- б) пентоксил
- в) дибазол
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

44. Для разноцветного лишая характерно все перечисленное, кроме

- а) хронического течения
- б) пятнистой сыпи
- в) отрубевидного шелушения
- г) зуда и локализации на конечностях
- д) излюбленной локализации

45. Клиническими особенностями инфильтративно-нагноительной трихофитии являются

- а) эритема и отек
- б) фолликулярные абсцессы
- в) гнойные корки
- г) четкие границы
- д) все перечисленные

46. Для фавуса характерно все перечисленное, кроме

- а) наличия корок (скутул)
- б) ломкости волос и образования папул
- в) рубцов
- г) атрофии волос
- д) поражения ногтевых пластинок

47. Время полного обновления клеток эпидермиса составляет

- а) до 8-10 дней
- б) от 10 до 16 дней
- в) от 20 до 25 дней
- г) от 26 до 28 дней
- д) свыше 30 дней

48. Изменение цвета ногтевых пластинок наблюдается у больных

- а) с гипоальбуминемией
- б) с гепато-лентиккулярной дегенерацией печени
- в) с нарушением лимфообразования
- г) с грибковыми поражениями ногтей
- д) со всем перечисленным

49. Различают формы актиномикоза

- а) гуммозно-узловатую
- б) бугорково-пустулезную
- в) язвенную
- г) все перечисленные
- д) ничего из перечисленного

50. Актиномикоз следует дифференцировать

- а) с гуммозным сифилисом
- б) с туберкулезной волчанкой
- в) с другими глубокими микозами
- г) со скрофулодермой
- д) со всем перечисленным

51. При хроническом генерализованном кандидозе применяют следующие препараты

- а) дифлюкон
- б) низорал
- в) нистатин и леворин
- г) амфотерицин В
- д) все перечисленные

52. Эпидермофития стоп у детей имеет следующие клинические разновидности

- а) дисгидротическая
- б) интертригинозная или сквамозная
- в) эпидермофития ногтей
- г) ничего из перечисленного
- д) все перечисленные

53. К антропофильным грибам, вызывающим трихомикозы, относятся все перечисленные, кроме

- а) ржавого микроспорума
- б) трихофитона Шонлейни
- в) трихофитона ментаграфитес
- г) трихофитона тонсуранс
- д) трихофитона виоляцеум

54. При обнаружении микроспории у 4-летнего ребенка следует провести все перечисленные профилактические мероприятия, кроме
- а) камерной дезинфекции одежды, постели и игрушек ребенка
 - б) запрета на посещение детского сада
 - в) камерной дезинфекции и влажной дезинфицирующей уборки в детском саду
 - г) профилактического осмотра детей в детском саду
 - д) профилактического лечения детей в детском саду
55. Микоз, вызванный красным трихофитом, характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) эритематозно-сквамозного характера сыпи
 - б) наличия прерывистого валика из узелков по краю очага
 - в) поражения ногтей на стопах и кистях
 - д) генерализованного поражения кожи и ее придатков
56. Патогенетическими факторами, способствующими развитию кандидоза, являются все перечисленные, кроме
- а) болезней крови
 - б) новообразований
 - в) лечения антибиотиками, иммунодепрессантами, сульфаниламидами, половыми гормонами
 - г) диабета
 - д) беременности
57. Клиническими формами кандидоза являются
- а) кандидоз крупных складок
 - б) кандидоз мелких складок
 - в) кандидоз слизистых оболочек
 - г) кандидоз околоногтевых валиков и ногтей
 - д) все перечисленные
58. Изменение цвета ногтевых пластинок наблюдается у больных
- а) с гипоальбуминемией
 - б) с гепато-лентиккулярной дегенерацией печени
 - в) с нарушением лимфообразования

- г) с грибковыми поражениями ногтей
- д) со всем перечисленным

59. Основными формами микоза стоп являются все перечисленные, кроме

- а) дисгидротической
- б) межпальцевой
- в) сквамозной
- г) поверхностной
- д) интертригинозной

60. Для паховой эпидермофитии характерно

- а) локализация в крупных складках
- б) эритема и отек
- в) пузырьки
- г) корки
- д) все перечисленное

61. Для онихомикоза характерны клинические симптомы

- а) мелкие точечные углубления в виде наперстка на ногтевой пластинке
- б) ноготь деформированный, утолщенный
- в) ноготь крошащийся, "изъеденный" со свободного края
- г) ноготь тусклый, серовато-желтого цвета
- д) все перечисленные, кроме а)

62. Для дисгидротической формы эпидермофитии характерно

- а) локализация на коже свода стоп
- б) наличие везикул, эрозий
- в) гиперемия, мокнутие
- г) наличие мацерации, пустул, трещин
- д) все перечисленное, кроме г)

63. Возбудители хромомикоза растут

- а) на соломе
- б) на гнилых деревьях и листьях
- в) на различных злаках и овсе

- г) в воде или придонном иле различных водоемов
- д) правильно все перечисленное, кроме г)

64. Различают основные клинические формы хромомикоза

- а) папилломатозно-язвенная
- б) бугорковая
- в) узловатая или гуммозная
- г) легочная
- д) все перечисленные

65. Для глубокой трихофитии характерно все перечисленное, кроме

- а) общего недомогания, повышения температуры
- б) наличия островоспалительного инфильтрата
- в) симптома "медовых сот"
- г) хронического течения
- д) самопроизвольного разрешения

66. Зоофильная трихофития отличается под микроскопом от антропофильной

- а) наличием спор эндотрикса
- б) наличием спор эктотрикса
- в) наличием в волосе мицелия
- г) правильно а) и б)
- д) ничего из перечисленного

67. При дрожжевых поражениях целесообразно применять наружно

- а) шалфей
- б) череду
- в) крапиву
- г) ромашку
- д) все перечисленное

68. Для профилактики рецидива заболевания рубромикозом рекомендуется

- а) дезинфекция обуви и чулок
- б) дезинфекция жилых помещений
- в) профилактический осмотр членов семьи

- г) лечение гипергидроза
- д) все перечисленное

69. Бластомикоз характеризуется поражением всех перечисленных тканей, кроме

- а) кожи
- б) слизистых
- в) подкожной клетчатки
- г) внутренних органов

70. При глубокой трихофитии в волосах обнаруживаются следующие изменения

- а) беспорядочное расположение спор
- б) цепочки спор внутри волоса
- в) цепочки спор и пузырьки воздуха внутри волоса
- г) цепочки спор снаружи волоса
- д) ничего из перечисленного

71. Для грибковых поражений кожи характерно все перечисленное, кроме

- а) яркой гиперемии очагов с нечеткими границами
- б) незначительной гиперемии
- в) четких границ поражения
- г) слегка возвышающихся краев
- д) мелкоотрубевидного шелушения

72. К клиническим формам микоза, обусловленным красным трихофитом, относятся все перечисленные, кроме

- а) гиперкератотических
- б) гранулематозных и буллезных
- в) интритригинозных
- г) поражения больших складок
- д) поражения ногтевых пластинок

73. Клиническими симптомами кандидоза кожи является все перечисленное, кроме

- а) нечетких границ очагов и шелушения
- б) влажных эрозий
- в) грязно-серого налета в складках

- г) воротничка отслоившегося эпителия по краю очагов
- д) кандидозного хейлита

74. К трихомикозам относится все перечисленное, кроме

- а) актиномикоза
- б) фавуса
- в) трихофитии
- г) микроспории
- д) микроспории, вызванной ржавым микроспорумом

75. При диагностике микозов используются все перечисленные лабораторные методы, кроме

- а) микроскопии пораженных волос и чешуек кожи
- б) культуральной диагностики
- в) мазков-отпечатков с очагов поражения
- г) гистологического исследования
- д) люминесцентной диагностики

76. К дерматофитам, флюоресцирующим при свете Вуда, относятся

- а) все те, которые способны поражать волосы
- б) только вида микроспории
- в) только вида трихофитии
- г) микроспорум собачий
- д) все перечисленные

77. Фунгицидными свойствами обладают все перечисленные препараты, кроме

- а) трихопола
- б) микосептина
- в) краски Кастеллани
- г) молочной кислоты
- д) бензойной кислоты

78. Для наружного лечения микозов применяются все перечисленные препараты, кроме

- а) ксероформа
- б) серы

- в) дегтя
- г) йода
- д) фунгицидных мазей

79. Наиболее вероятно заразиться от крупного рогатого скота следующим грибом

- а) трихофитом рубрум
- б) трихофитом Шонлейни
- в) трихофитом веррукозум
- г) микроспорум гипсеум
- д) трихофитом ментаграфитес

80. Основными клиническими разновидностями трихофитии являются

- а) эритематозная
- б) черноточечная, атрофическая
- в) трихофитийные гуммы
- г) скутулярная
- д) атрофическая

81. Заболеваниям, вызываемым антропофильными грибами, относятся все перечисленные, кроме

- а) микроспории, вызванной ржавым микроспорумом
- б) поверхностной трихофитии
- в) глубокой трихофитии
- г) фавуса
- д) рубромикоза

82. Трихофитона тонзуронс характерны

- а) многочисленные микроподии в культуре
- б) глубокий красный пигмент
- в) грануломы Майоки
- г) медленно растущие, восковидные друзообразные колонии
- д) беспорядочно расположенные споры

83. К факторам способствующим развитию кандидоза, относятся

- а) диабет
- б) длительный прием антибиотиков
- в) повышенное потоотделение
- г) иммунодефицит

д) все перечисленное

84. Волосы обламываются на уровне 5- мм от уровня кожи

а) при поверхностной трихофитии

б) при микроспории

в) при фавусе

г) при трихофитии инфильтративно-нагноительной

д) при алопеции

85. Грибковое заболевание кожи вызываемое микроспорум канис обычно приобретает при контакте

а) со свиньей

б) с овцой

в) с крупным рогатым скотом

г) с кошками

д) с птицами

86. В комплекс лечения микроспории входят

а) наружные средства

б) витаминотерапия

в) антигистаминные препараты

г) все перечисленное

д) ничего из перечисленного

87. Для общей терапии дерматомикозов используют:

а) орунгал

б) низорал

в) ламизил

г) гризеофульвин

д) все перечисленное

88. Переносчиками зоофильной трихофитии являются:

а) кошки, собаки

б) грызуны

в) человек

г) крупный рогатый скот

89. Интертригинозная форма микоза стоп характеризуется всем перечисленным, кроме:

а) гиперкератоза

б) трещин

в) эрозий

- г) отслоения эпидермиса
- д) зуда и болезненности
- е) обильного крупнопластинчатого шелушения

90. Мерами профилактики микозов стоп являются:

- а) изоляция больных
- б) назначение карантина
- в) соблюдение санитарно-гигиенических правил
- г) текущая дезинфекция в моечных, спортивных учреждениях
- д) дезинфекция обуви
- е) камерная обработка белья и постели
- ж) диспансеризация больных
- з) борьба с бродячими кошками
- и) выявление источника заражения

91. Для подтверждения клинического диагноза микроспории применяют исследование:

- а) люминисцентное
- б) микроскопическое
- в) культуральное
- г) все перечисленное

92. Ведущий морфологический элемент при отрубевидном лишае:

- а) язва
- б) бугорок
- в) пустула
- г) пятно
- д) пузырь

93. К клиническим формам микоза стоп относят:

- а) генерализованную
- б) дисгидротическую
- в) интертригинозную
- г) сквамозную
- д) очаговую

94. Для отрубевидного лишая не характерно:

- а) наличие пятнистой сыпи
- б) хроническое течение
- в) отрубевидное шелушение

- г) зуд кожи
- д) склонность к периферическому росту и слиянию

95. Для микроспории волосистой части головы характерно:

- а) обламывание волоса на уровне 2-3 мм
- б) обламывание волоса на уровне 5-8 мм
- в) под люминесцентной лампой Вуда буро-коричневое свечение
- г) под люминесцентной лампой Вуда изумрудно-зеленое свечение

96. К возбудителям микроспории относятся:

- а) трихофитон красный
- б) микроспорум ржавый
- в) трихофитон гипсовый
- г) микроспорум пушистый

97. При онихомикозе поражаются:

- а) волосы
- б) крупные складки
- в) слизистые
- г) ногти

98. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме:

- а) сахарного диабета
- б) гипертонической болезни
- в) потливости, мацерации кожи
- г) иммунодефицита
- д) длительного лечения антибиотиками

99. Клиническими формами кандидоза являются:

- а) кандидоз слизистых оболочек
- б) кандидоз складок кожи
- в) висцеральный кандидоз
- г) хронический генерализованный кандидоз
- д) все перечисленное

100 Гибковые заболевания кожи вызываются всеми перечисленными возбудителями, кроме:

- а) трихофитонов
- б) эпидермофитонов
- в) палочек Ганзена
- г) дрожжеподобных грибов
- д) микроспорумов

101. Наиболее характерными особенностями очага при дрожжевой опрелости является:

- а) темно-красный цвет
- б) умеренная влажность эрозированной поверхности
- в) наличие отсевов по периферии
- г) все перечисленное верно

102. Для грибковых поражений кожи характерны:

- а) яркая гиперемия в очагах поражения
- б) неправильные очертания очагов
- в) отсутствие шелушения
- г) резкие границы очагов, сухая поверхность, незначительная гиперемия
- д) все перечисленное

103. К клиническим формам микроспории волосистой части головы относятся:

- а) поверхностная
- б) импетигиозная
- в) гранулематозная
- г) керион
- д) правильно а и г

104. Для постановки диагноза кандидоза гладкой кожи достаточно:

- а) клинических проявлений
- б) обнаружения псевдомицелия при микроскопическом исследовании
- в) обнаружения почкующихся клеток при микроскопическом исследовании
- г) роста колоний при посеве
- д) правильно а и б

105. В первую очередь при кандидозе поражаются:

- а) кожа
- б) верхние дыхательные пути
- в) кости
- г) сердечно-сосудистая система
- д) все перечисленное

106. При мицетоме патологический процесс локализуется на коже:

- а) верхних и нижних конечностей
- б) туловища
- в) лица
- г) волосистой части головы

107. В возникновении микоза стоп у детей играют роль:

- а) анатомо-физиологические особенности кожи стоп у детей
- б) усиленное потоотделение
- в) изменение рН пота
- г) эндокринопатии
- д) вегетодистонии
- е) все верно

108. Возбудителями микозов стоп являются:

- а) стафилококки
- б) стрептококки
- в) трихофитон интердигиталис
- г) микроспорум
- д) красный трихофитон
- е) ахорион
- ж) гипсовый трихофитон

109. Профилактические мероприятия кандидоза в лечебных учреждениях включают:

- а) рациональный прием антибиотиков
- б) выявление эндокринопатий
- в) рациональный уход за больными кандидозом
- г) обработка суден, инструментов

- д) витаминизация
- е) все перечисленное верно

110.К противокандидозным средствам для лечения кожи относятся все, кроме:

- а) мази нистатиновая, амфотерициновая, 0,5-1% декаминовая
- б) 0,25 % спиртовой или водный раствор анилиновых красителей
- в) левориновая взвесь (2г леворина, 20мл 95% этилового спирта, воды)
- г) бонафтоновая, оксолиновая или теброфеновая мазь
- д) клотримазол

111.Хронический кандидоз слизистых оболочек связан с:

- а) гипотиреозом
- б) гипопаратиреозом
- в) гипокортицизмом
- г) понижением секреторной функции половых желез
- д) всем перечисленным

112.К побочным действиям нистатина относится все перечисленное, кроме:

- а) тошноты
- б) дерматитов
- в) рвоты
- г) жидкого стула
- д) повышения температуры

113.При хроническом генерализованном кандидозе применяют следующие препараты:

- а) дифлюкан
- б) низорал
- в) нистатин и леворин
- г) амфотерицин
- д) все перечисленное

114.Candidaalbicans является нормальной частью флоры:

- а) рта
- б) зева
- в) влагалища

- г) мочевого пузыря
- д) прямой кишки

115. Контрольные исследования на грибы кандиды проводятся:

- а) каждые 7 дней
- б) через 7 дней после окончания курса лечения
- в) после окончания каждого последующего тура лечения
- г) перед началом каждого последующего тура лечения
- д) не проводится

116. При дрожжевых поражениях целесообразно применять наружно:

- а) шалфей
- б) череду
- в) крапиву
- г) ромашку
- д) все перечисленное

117. Клиническими симптомами кандидоза кожи являются все перечисленные, кроме:

- а) влажных эрозий
- б) грязно-серого налета в складках
- в) воротничка отслоившегося эпителия по краю очагов
- г) кандидозного хейлита
- д) нечетких границ очагов и шелушения

118. Наиболее вероятно инфицироваться от крупного рогатого скота следующими дерматофитами:

- а) трихофитон рубрум
- б) трихофитон Шенлейна
- в) трихофитон веррукозум
- г) микроспорум гипсеум

119. Достоверным признаком кандидоза является высевание со слизистых в 1 мл среды количества клеток:

- а) 500
- б) 1000

- в) 300
- г) все правильно

Раздел 5

СИФИЛИС

1. При исследовании бледной трепонемы методом электронной микроскопии выявляются все образования, кроме
 - а) чехла
 - б) жгутиков
 - в) фибрилл
 - г) цитоплазматической мембраны

2. В реализации иммунного ответа при сифилисе участвуют следующие образования, кроме
 - а) эритроцитов
 - б) макрофагов
 - в) Т-лимфоцитов
 - г) В-лимфоцитов

3. При сифилитическом регионарном склеродените в патологический процесс вовлекается
 - а) капсула лимфатического узла
 - б) ткань лимфатического узла
 - в) окружающая клетчатка
 - г) прилежащая к узлу кожа

4. Шанкр-амигдалит представляет из себя
 - а) эрозию миндалина
 - б) язву миндалина
 - в) увеличенную в размерах гиперемизованную миндалину
 - г) увеличенную в размерах обычной окраски миндалину

5. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно
 - а) небильные
 - б) обильные
 - в) несимметричные
 - г) неяркой окраски
 - д) сгруппированные

6. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме
 - а) мелкоочаговой
 - б) крупноочаговой
 - в) диффузной
 - г) смешанной
 - д) тотальной

7. Бугорковый сифилис следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме
 - а) туберкулеза кожи
 - б) лейшманиоза
 - в) лепры
 - г) глубоких микозов
 - д) экземы

8. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются
 - а) препараты пенициллина
 - б) препараты тетрациклина
 - в) препараты эритромицина
 - г) макролиды

9. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является
- а) бугорки кожи туловища
 - б) лабиринтная глухота
 - в) гуммы кожи туловища
 - г) саблевидные голени
10. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является
- а) ягодицеобразный череп
 - б) бочкообразные зубы
 - в) гетчинсоновские зубы
 - г) широко расставленные верхние резцы
11. В течение фрамбезии выделяют все перечисленные периоды, кроме
- а) инкубационного
 - б) первичного
 - в) вторичного
 - г) третичного
 - д) поражения внутренних органов
12. Основным путем заражения мягким шанкром является
- а) половой контакт
 - б) возможно заражение через предметы
 - в) возможен неполовой путь инфицирования
 - г) необходимо нарушение целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистых
 - д) заражение возможно при сохранной целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистой
13. Отделяемое из фистулезного хода при венерическом лимфогранулематозе
- а) серозное
 - б) кровянистое
 - в) сливкообразное или гнойное
 - г) крошкообразное
 - д) отделяемого нет

14. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет
- а) 2-4
 - б) 6-8
 - в) 8-12
 - г) 12-14
15. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является
- а) реакция иммунофлюоресценции РИФ-200
 - б) реакция иммунофлюоресценции РИФ-АБС
 - в) реакция Колмера
 - г) реакция Вассермана
 - д) реакция иммобилизации трепонем
16. Лимфатические узлы при венерическом лимфогранулематозе вскрываются с образованием всего перечисленного, кроме
- а) язв
 - б) фистулезных ходов
 - в) некроза
 - г) абсцесса
 - д) эрозий
17. Регионарные лимфатические узлы при донованозе
- а) не изменены или незначительно увеличены, подвижны
 - б) значительно увеличены, мягкие
 - в) значительно увеличены, уплотнены
 - г) образуют неподвижный конгломерат
 - д) измененные узлы изъязвляются
18. Для сифилиса скрытого раннего характерным является выявление
- у полового партнера
- а) манифестной формы сифилиса
 - б) сифилиса скрытого позднего
 - в) сифилиса висцерального
 - г) позднего нейросифилиса
19. Удлинение инкубационного периода сифилиса наблюдается

- а) при сопутствующих инфекционных заболеваниях
 - б) при биполярном расположении твердых шанкров
 - в) при лечении пенициллином, тетрациклином сопутствующих заболеваний в инкубационный период сифилиса
 - г) при лечении сульфаниламидами сопутствующих заболеваний в инкубационном периоде сифилиса
 - д) при лечении противовирусными препаратами
20. Для сифилиса скрытого позднего характерным является
- а) выявление у полового партнера манифестной формы сифилиса
 - б) отсутствие данных за сифилис у полового партнера
 - в) выявление у полового партнера сифилиса скрытого раннего
 - г) выявление у полового партнера висцерального сифилиса
21. Для постановки диагноза первичного серопозитивного сифилиса наряду с клиникой необходимы положительные результаты следующих реакций
- а) Колмера
 - б) Вассермана
 - в) иммунофлюоресценции - РИФ-200
 - г) иммунофлюоресценции - РИФ-АБС
 - д) микрореакции
22. Вторичные сифилиды характеризуются следующими признаками
- а) высыпания вторичного периода имеют нечеткие края, неправильные очертания
 - б) высыпания вторичного периода сопровождаются чувством жжения, болезненностью
 - в) высыпания вторичного периода сохраняются длительно, несмотря на проводимую терапию
 - г) высыпания быстро разрешаются под влиянием лечения
 - д) высыпания имеют островоспалительный характер поражения
23. Выделяют следующие разновидности сифилитической лейкодермы, кроме
- а) пятнистой

- б) сетчатой
- в) сливной
- г) мраморной
- д) кружевной

24. Разновидностями форм бугоркового сифилида

являются все перечисленные, кроме

- а) сгруппированных
- б) карликовых
- в) серпигинирующих
- г) полосовидных

25. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является

- а) остеохондрит I степени
- б) остеохондрит II степени
- в) периостит
- г) остеомиелит

26. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является

- а) папулезная сыпь кожи туловища
- б) пузырьчатка сифилитическая
- в) алопеция сифилитическая
- г) эритема сифилитическая

27. Регионарный склероденит при первичном сифилисе развивается

после появления твердого шанкра спустя

- а) 3-5 дней
- б) 5-8 дней
- в) 8-10 дней
- г) 10-12 дней

28. Рентгенографию скелета

с целью обследования на ранний врожденный сифилис после года жизни

- а) целесообразно сделать
- б) делать не следует

- в) на усмотрение врача
- г) на усмотрение родителей
- д) в зависимости от результатов серореакций

29. Вторичный период сифилиса с момента заражения начинается в среднем через

- а) 1-2 месяца
- б) 2-3 месяца
- в) 3-4 месяца
- г) 4-5 месяцев

30. После появления твердого шанкра вторичный период сифилиса наступает, в среднем, через

- а) 5-6 недель
- б) 6-7 недель
- в) 7-8 недель
- г) 8-9 недель

31. Различают следующие разновидности сифилитической плешивости, кроме

- а) мелкоочаговой
- б) крупноочаговой
- в) тотальной
- г) диффузной
- д) смешанной

32. Наиболее частой локализацией папул во рту при вторичном рецидивном сифилисе является

- а) спинка языка
- б) миндалины
- в) углы рта
- г) боковые поверхности языка

33. Возбудителем фрамбезии является

- а) трепонема пертенуе
- б) трепонема паллидум

- в) простейшие
- г) спирохета паллидум
- д) вирус

34. Материалом для исследования на стрептобациллы мягкого шанкра является все перечисленное, кроме

- а) отделяемого язвенных элементов
- б) гнойного отделяемого вскрывшихся лимфатических узлов
- в) пунктата не вскрывшихся лимфатических узлов
- г) соскоба с язвенных поверхностей

35. Осложнениями мягкого шанкра являются все перечисленные, кроме

- а) лимфангита
- б) бубона
- в) фимоза
- г) парафимоза
- д) импетигнизации

36. Чаще всего при раннем врожденном сифилисе поражается

- а) желудок
- б) печень
- в) почки
- г) легкие

37. Среди атипичных форм твердого шанкра различают все перечисленные, кроме

- а) твердого шанкра лобка
- б) индуративного отека
- в) шанкр-панариция
- г) шанкр-амигдалита
- д) склеротического отека

38. Шанкр-панариций представляет из себя

- а) эрозию или язву на пальцах кистей
- б) увеличенную в объеме пораженную фалангу без дефекта

- на ее поверхности и признаков воспаления
- в) увеличенную в объеме пораженную фалангу без дефекта
на ее поверхности с признаками воспаления
39. Основные изменения при гистологическом исследовании сифилидов выявляются
- а) в эпидермисе
 - б) в кровеносных и лимфатических сосудах кожи
 - в) в мышцах
 - г) в подкожной клетчатке
 - д) в дерме
40. К разновидностям сифилитической розеолы не относится
- а) уртикарная
 - б) элевирующая
 - в) зернистая
 - г) сливная
 - д) геморрагическая
41. Дифференцировать сифилитические папулы на слизистой оболочке полости рта следует со всеми перечисленными заболеваниями, кроме
- а) фолликулярной ангины
 - б) дифтерии зева
 - в) фузоспирилллезе
 - г) красного плоского лишая
 - д) невуса
42. Для вторичного сифилиса характерно все перечисленное, кроме
- а) наличия островоспалительных явлений
 - б) поражения ладоней и подошв
 - в) отсутствия островоспалительных явлений
 - г) полиаденита
 - д) зуда очагов

43. Гуммозные поражения на коже следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме
- а) скрофулодермы
 - б) трофических язв
 - в) хронической язвенной пиодермии
 - г) лейшманиоза
 - д) парапсориаза
44. Различают следующие формы висцеральных поражений при вторичном периоде сифилиса
- а) эфемерные
 - б) стойкие
 - в) трудно поддающиеся терапии
 - г) медленно регрессирующие
 - д) вызывающие органические поражения
45. Всем вторичным сифилидам свойственны все признаки, кроме
- а) доброкачественности
 - б) наличия признаков острого воспаления
 - в) полиморфизма
 - г) быстрого регресса на фоне специфического лечения
46. Большинство вторичных сифилидов разрешаются без лечения спустя
- а) 1-2 месяца
 - б) 2-3 месяца
 - в) 3-4 месяца
 - г) 4-5 месяцев
47. Патогномоничным признаком раннего врожденного сифилиса является
- а) пятнистая сыпь кожи туловища
 - б) папулезная сыпь кожи туловища
 - в) сифилитический ринит
 - г) сифилитическая алопеция
48. Изменения глазного дна при гумме мозга

- а) закономерно присутствуют
- б) отсутствуют
- в) закономерности нет
- г) возникают только при большом распространении процесса
- д) возникают при поражении глазного нерва

49. Проявления позднего врожденного сифилиса возникают в возрасте

- а) от 3 до 4 лет
- б) от 4 до 17 лет
- в) от 17 до 20 лет
- г) от 20 до 23 лет

50. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является

- а) гумма твердого неба
- б) паренхиматозный кератит
- в) бугорки кожи туловища
- г) розеола кожи туловища

51. Изменения крови у больных ранним врожденным сифилисом

проявляются в виде

- а) лейкопении
- б) гипохромной анемии
- в) ускоренного свертывания
- г) тромбоцитопении

52. Наибольшее диагностическое значение в распознавании аневризмы аорты сифилитического генеза имеют следующие исследования

- а) аускультативное
- б) перкуторное
- в) рентгенологическое
- г) серологическое

53. Патогномоничным симптомом при диагностике малосимптомного табеса является

- а) анизокория

- б) арефлексия
- в) синдром Аргайла - Робертсона
- г) атаксия

54. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является

- а) папулезные элементы
- б) пятнистые элементы
- в) диффузная инфильтрация
- г) диффузная алопеция
- д) специфическая паронихия

55. Остеохондриты у больных ранним врожденным сифилисом, в основном, обнаруживаются

- а) в первые 3 месяца жизни
- б) в 4-5 месяцев жизни
- в) в 6-7 месяцев жизни
- г) в 8-9 месяцев жизни

56. Бледная трепонема была открыта

- а) в 1890 г
- б) в 1895 г
- в) в 1905 г
- г) в 1910 г

57. Срок деления патогенной бледной трепонемы составляет

- а) 6-8 ч
- б) 10-12 ч
- в) 15-20 ч
- г) 30-33 ч
- д) 35-40 ч

58. Длина бледной трепонемы в среднем составляет

- а) 1-2 мкм
- б) 4-14 мкм
- в) 20-25 мкм

г) 30-33 мкм

59. В реализации иммунного ответа организма на проникновение бледной трепонемы в организм человека участвуют системы
- а) макрофаги
 - б) Т-лимфоциты
 - в) В-лимфоциты
 - г) эритроциты
60. Для сифилиса скрытого раннего характерно все перечисленное, кроме
- а) наличия в прошлом эфлоресценций на половых органах
 - б) активной формы сифилиса у полового партнера
 - в) сифилиса скрытого позднего у полового партнера
 - г) высокого титра реактивов
 - д) наличия рецидуальных явлений первичной сифиломы
61. Основными поражениями кожи и слизистых при сифилисе врожденном раннем являются все перечисленные, кроме
- а) диффузной инфильтрации кожи
 - б) папулезных высыпаний
 - в) специфического насморка
 - г) пузырчатки
 - д) фолликулярного гиперкератоза
62. Возможны все перечисленные исходы гуммозных сифилидов, кроме
- а) рассасывания бесследно
 - б) рубцовой атрофии
 - в) распада
 - г) фиброза
 - д) изъязвления
63. При подозрении на сифилис скрытый необходимы консультации всех перечисленных специалистов, кроме
- а) терапевта

- б) рентгенолога
- в) невропатолога
- г) отоларинголога
- д) уролога

64. К побочным явлениям при лечении сифилиса пенициллином относятся все перечисленные, кроме

- а) анафилактического шока
- б) токсидермии
- в) крапивницы
- г) кандидоза
- д) алопеции

65. Характерным для папул при раннем врожденном сифилисе в отличие от папул при приобретенном сифилисе при гистологическом исследовании является все перечисленное, кроме

- а) повышенного количества лейкоцитов
- б) повышенного количества плазматических клеток
- в) отсутствия гигантских и плазматических клеток
- г) расширения щелей в эпителиальном слое

66. Сифилитические поражения желудочно-кишечного тракта проявляются всеми перечисленными симптомами, кроме

- а) ранних нарушений секреции
- б) папулезных высыпаний
- в) гуммозной инфильтрации
- г) рубцовых сужений
- д) злокачественного перерождения

67. Рубцы при сифилисе третичном имеют вид

- а) втянутых
- б) звездчатых
- в) поверхностных
- г) плоских

68. Реакция иммобилизации бледных трепонем производится с целью
- а) подтверждения диагноза сифилиса первичного
 - б) подтверждения диагноза сифилиса вторичного свежего
 - в) подтверждения диагноза сифилиса скрытого
 - г) контроля за лечением
 - д) решения вопроса о снятии больного с учета
69. Дифференциальную диагностику папулезного сифилида следует проводить со всеми перечисленными заболеваниями, кроме
- а) красного плоского лишая
 - б) каплевидного параспориоза
 - в) вегетирующей пузырчатки
 - г) псориаза
 - д) фолликулярного гиперкератоза
70. Бледная трепонема - это
- а) микроорганизм спиралевидной формы
 - б) микроорганизм шарообразной формы
 - в) микроорганизм палочковидной формы
 - г) микроорганизм нитеобразной формы
 - д) микроорганизм неправильной формы
71. Третичный сифилис характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) ограниченности поражения
 - б) фокусного расположения элементов сыпи
 - в) склонности к распаду
 - г) образования рубцов на месте разрешившихся элементов
 - д) яркой окраски морфологических элементов
72. Первичный период сифилиса продолжается
- а) 2-3 недели
 - б) 4-5 недель
 - в) 6-7 недель
 - г) 8-10 недель
 - д) 11-12 недель

73. К разновидностям папулезного сифилида ладоней и подошв относятся все перечисленные, кроме
- а) лентикулярного
 - б) кольцевидного
 - в) рогового
 - г) широкого
 - д) диффузного
74. К поражениям костей, патогномичным для сифилиса врожденного раннего, относятся
- а) остеохондрит II-III степени
 - б) деформирующий артрит
 - в) остеопороз
 - г) остеосклероз
75. При раннем врожденном сифилисе на коже могут наблюдаться
- а) диффузная инфильтрация
 - б) ангионевротический отек
 - в) крапивница
 - г) гуммы
 - д) бугорки
76. Увеличение регионарных лимфоузлов после первичной сифиломы наблюдается обычно спустя
- а) 1-2 дня
 - б) 5-8 дней
 - в) 9-12 дней
 - г) 13-16 дней
 - д) 21 день
77. К осложнениям твердого шанкра относятся все перечисленные, кроме
- а) фимоза
 - б) парафимоза
 - в) гангренизации

- г) лимфаденита
- д) фагеденизации

78. Высыпания при вторичном рецидивном сифилисе обычно

- а) необильные
- б) обильные
- в) симметричные
- г) появляются сразу
- д) имеют островоспалительную окраску

79. Для сифилитической эритематозной ангины характерны

- а) резкие границы эритемы в зеве
- б) нерезкие границы эритемы в зеве
- в) отечность тканей миндалин
- г) резкая болезненность
- д) высокая температура

80. Лентикулярный сифилид имеет наибольшее сходство с высыпаниями при перечисленных заболеваниях, кроме

- а) красного плоского лишая
- б) флеботодермии
- в) парапсориаза
- г) псориаза

81. Укорочение инкубационного периода сифилиса наблюдается

- а) при развитии одиночного твердого шанкра
- б) при биполярном расположении твердых шанкров
- в) при развитии множественных твердых шанкров
- г) при развитии эрозивных твердых шанкров
- д) при развитии язвенных твердых шанкров

82. Вторичный период сифилиса наступает

- а) спустя 2-3 месяца после заражения
- б) спустя 4-5 месяцев после заражения
- в) спустя 6-7 месяцев после заражения

г) спустя 8-9 месяцев после заражения

83. К разновидностям пустулезного сифилида

относятся все перечисленные, кроме

а) акнеформных

б) оспенновидных

в) импетигиозных

г) рупиоидных

д) фурункулезных

84. Лечение венерического лимфогранулематоза целесообразно проводить

а) антибиотиками пенициллиновой группы

б) антибиотиками тетрациклиновой группы

в) сульфаниламидами

г) ристоцетином

д) стрептомицином

85. Первичным морфологическим элементом при донованозе является

а) пятно

б) папула

в) пузырек

г) пустула

д) узелок

86. К формам скрытого сифилиса относятся все перечисленные, кроме

а) раннего

б) позднего

в) неведомого

г) неуточненного

д) серонегативного

87. Поражение костной ткани при раннем врожденном сифилисе

включает все перечисленные изменения, кроме

а) остеохондритов

б) периоститов

- в) преждевременного появления ядер окостенения
- г) интраметафизарных переломов
- д) экзостозов

88. Наиболее часто сифилитическая аневризма аорты локализуется

- а) в восходящем отделе
- б) в дуге
- в) в нисходящем отделе грудной аорты
- г) в брюшном отделе

89. Для клиники болезни Беджеля характерно

- а) четкая смена периодов
- б) быстрое исчезновение высыпаний
- в) поражение внутренних органов
- г) длительное существование высыпаний
- д) отсутствие закономерности смены периодов

90. Инкубационный период при венерическом лимфогранулематозе составляет

- а) 1 день
- б) 1-2 недели
- в) 3-4 недели
- г) 5-6 недель
- д) 7-8 недель

91. Заразными у больного сифилисом являются:

- а) моча
- б) отделяемое эрозивных сифилидов
- в) пот
- г) слюна
- д) все перечисленное

92. Вероятным признаком позднего врожденного сифилиса является:

- а) олимпийский лоб
- б) диастема Гаше
- в) рубцы Фурнье

93. Для сифилидов характерно все, кроме:

- а) отсутствия воспаления

- б) безболезненности
 - в) отсутствия шелушения
 - г) тенденции к слиянию
 - д) отсутствия тенденции к слиянию
94. Возбудитель сифилиса был открыт:
- а) Л.Пастером
 - б) Флемингом
 - в) Ф.шаудином
 - г) Э.Гофманом
 - д) Р.Ван Левенгуком
95. Гетчинсоевы зубы – это:
- а) шилоподобные клыки, часто без эмали
 - б) добавочная 5-я жевательная поверхность на первом моляре
 - в) широкая щель между верхними резцами
 - г) широкая шейка и уменьшенная жевательная поверхность первого моляра
 - д) верхние средние резцы с широкой шейкой и суженой жевательной поверхностью, которая имеет полулунную выемку
96. При позднем врожденном сифилисе могут наблюдаться:
- а) паренхиматозный кератит
 - б) ирит
 - в) хориоретинит
 - г) атрофия зрительного нерва
 - д) все верно
97. Различают следующие разновидности шанкра миндалин:
- а) эрозивный
 - б) язвенный
 - в) ангиноподобный (шанкр-амигдалит)
 - г) все перечисленное верно
98. Какой из перечисленных методов применяется в повседневной практике для обнаружения бледных трепонем:
- а) исследование нативных препаратов в темном поле
 - б) окраска по Романовскому-Гимзе
 - в) окраска метиленовым синим
 - г) серебрение по Морозову
99. Какие клинические проявления характерны для третичного сифилиса?

- а) папулы ладоней и подошв
 - б) сгруппированные бугорки
 - в) широкие кондиломы
 - г) мелкоочаговое облысение
100. Укажите клинические признаки, не характерные для третичного сифилиса:
- а) гуммы твердого неба
 - б) мезаортит
 - в) серпигинирующие бугорки
 - г) широкие кондиломы
 - д) звездчатые рубцы
101. На коже у больных вторичным сифилисом могут встречаться следующие разновидности сифилидов, кроме:
- а) пятнистого
 - б) папулезного
 - в) пустулезного
 - г) пигментного
 - д) бугоркового
102. Какое сочетание клинических проявлений характерно для вторичного свежего сифилиса?
- а) алопеция, папулы ладоней и подошв
 - б) эритематозная ангина, широкие кондиломы
 - в) лейкодерма, широкие кондиломы
 - г) эритематозная ангина, остатки твердого шанкра
103. Какие клинические симптомы не характерны для сифилитической ангины?
- а) резкие границы
 - б) отсутствие болезненности
 - в) синюшный оттенок
 - г) наличие гнойных пробок
 - д) болезненность
104. Что характерно для сифилидов вторичного периода?
- а) отсутствие островоспалительных элементов
 - б) болезненность
 - в) самопроизвольное исчезновение сыпи
 - г) асимметричность расположения высыпаний
105. Какие наиболее заразные высыпания вторичного сифилиса?

- а) розеола туловища
 - б) эрозированные папулы языка
 - в) широкие кондиломы
106. Признаки, входящие в триаду Гетчинсона:
- а) бочкообразные зубы
 - б) специфический лабиринтит
 - в) саблевидные голени
 - г) паренхиматозный кератит
107. Какие симптомы характерны для врожденного сифилиса грудного возраста, но не встречаются при приобретенном сифилисе:
- а) сифилитический насморк
 - б) диффузная папулезная инфильтрация
 - в) сифилитическая пузырьчатка
 - г) лентикулярные папулезные сифилиды
108. В клиническом течении врожденного сифилиса принято различать периоды:
- а) сифилис плода
 - б) сифилис грудного возраста
 - в) сифилис раннего детского возраста
 - г) поздний врожденный сифилис
 - д) сифилис плаценты
109. Важнейшие проявления сифилиса грудного возраста включают все, кроме:
- а) сифилитической пузырьчатки
 - б) диффузной инфильтрации Гохзингера
 - в) сифилитического насморка
 - г) гидрартроз
 - д) псевдопаралича Парро
 - е) саблевидных голеней
110. К достоверным признакам позднего врожденного сифилиса не относятся:
- а) зубы Гетчинсона
 - б) паренхиматозный кератит
 - в) конъюнктивит
 - г) лабиринтит
 - д) заячья губа
 - е) ягодицеобразный череп
111. В первичном периоде сифилиса встречаются все признаки, кроме:

- а) твердого шанкра
 - б) отрицательной реакции Вассермана
 - в) положительной реакции Вассермана
 - г) эритематозной ангины
112. Какой препарат применяют для очищения поверхности твердого шанкра перед исследованием на бледную трепонему?
- а) 2% раствор борной кислоты
 - б) 0,02% раствор фурацилина
 - в) 10% раствор хлористого натрия
 - г) 0,05% хлоргексидина биглюкона
 - д) 0,9% раствор хлористого натрия
113. Все перечисленные проявления относятся к осложнениям твердого шанкра, кроме:
- а) фимоза
 - б) вульвовагинита
 - в) парафимоза
 - г) фagedенизма
 - д) индуративного отека
114. Для типичного твердого шанкра характерны все признаки, кроме:
- а) плотного основания
 - б) гладкой ровной поверхности эрозии
 - в) округлых очертаний
 - г) болезненности
 - д) резкого отграничения от окружающей ткани
115. К разновидностям пустулезного сифилида относятся все, кроме:
- а) акнеформного
 - б) оспенновидного
 - в) импетигиозного
 - г) рупиоидного
 - д) фурункулоподобного
116. Поражения костной ткани при раннем врожденном сифилисе включают все перечисленные изменения, кроме:
- а) остеохондрита
 - б) периостита
 - в) экзостозов
 - г) остита

- д) артрита
117. РИБТ производится для подтверждения диагноза:
- а) первичного сифилиса
 - б) вторичного сифилиса
 - в) скрытого сифилиса
118. Патогномичным симптомом раннего врожденного сифилиса является:
- а) папулезный сифилид
 - б) гуммы
 - в) остеохондриты длинных трубчатых костей
119. Виды движения, патогномичные для бледной трепонемы:
- а) сгибательные
 - б) маятникообразные
 - в) поступательные
 - г) вращательные
 - д) волнообразные
 - е) все перечисленные
120. Наличие «ячеистых», «мозаичных» рубцов свидетельствует о разрешении каких элементов?
- а) сифилитических гумм
 - б) сифилитических бугорков
 - в) сифилитических эктим
121. Выделяют следующие разновидности сифилитической лейкодермы, кроме:
- а) пятнистой
 - б) сетчатой
 - в) сливной
 - г) мраморной
122. Хронические ложноположительные КСР могут быть при всех заболеваниях, кроме:
- а) туберкулеза
 - б) ревматизма
 - в) алкоголизма
 - г) сахарного диабета
123. Превентивное лечение сифилиса показано, если с момента контакта прошло:
- а) более 3 месяцев
 - б) более 2 недель
 - в) менее 2 месяцев

- г) менее 2 недель
124. Дифференциальными ориентирами в диагностике шанкра миндалин являются:
- а) односторонняя локализация
 - б) регионарный лимфаденит
 - в) медленное развитие
 - г) затяжное течение
 - д) все перечисленное верно
125. К специфическим препаратам, активным против бледной трепонемы, относятся все ниже перечисленные, кроме:
- а) препаратов пенициллина
 - б) пирогенных препаратов
 - в) препаратов йода
 - г) антибиотиков-макролидов
 - д) препаратов висмута
126. При снятии больного сифилисом с учета в КВД необходимо получить заключение об отсутствии специфической патологии от перечисленных специалистов, кроме:
- а) терапевта
 - б) хирурга
 - в) окулиста
 - г) невролога
 - д) отоларинголога
127. Какое из осложнений может возникнуть при лечении больных бензилпенициллином?
- а) эмболия легкого
 - б) некроз в месте инъекции
 - в) нефропатия
 - г) полиневриты
 - д) анафилактический шок
128. Для третичных сифилидов типично все, кроме:
- а) медленного роста
 - б) невыраженности воспалительных явлений
 - в) формирования рубцов
 - г) болезненности
 - д) плотности краев

129. Поражения внутренних органов в третичном периоде сифилиса могут быть разнообразными, однако, наиболее часто встречается:
- а) орхит
 - б) энтерит
 - в) мезаортит
 - г) нефросклероз
 - д) пиелит
130. Какой метод исследования является наиболее надежным при третичном сифилисе?
- а) исследование спинномозговой жидкости
 - б) исследование крови на РИТ
 - в) исследование отделяемого язв на бледную трепонему
 - г) исследование крови на КСР
 - д) исследование крови экспресс-методом
131. Какие клинические проявления могут встречаться при вторичном свежем сифилисе?
- а) паренхиматозный кератит
 - б) лейкодерма
 - в) саблевидные голени
 - г) сифилитическая дисфония
 - д) полиаденит
132. Твердый шанкр в аногенитальной области реже всего встречается на:
- а) внутреннем листке крайней плоти
 - б) шейки матки
 - в) головки полового члена
 - г) стенках влагалища
 - д) прямой кишке
133. Основным клиническим признаком, доказывающим сифилитическую природу шанкра Фольманна свидетельствует:
- а) четкость границ эрозий
 - б) инфильтрат в основании
 - в) множественность эрозий
 - г) отсутствие острого воспаления
134. основные изменения при гистологическом исследовании сифилидов выявляются:
- а) в кровеносных сосудах кожи

- б) в лимфатических сосудах кожи
 - в) в эпидермисе
 - г) в дерме
 - д) в мышцах
135. Суперинфекция может наблюдаться:
- а) в инкубационном периоде
 - б) в первые 10-14 дней первичного периода
 - в) при третичном сифилисе
 - г) при позднем врожденном сифилисе
136. Для достоверной диагностики нейросифилиса необходимо исследование СМЖ по таким показателям:
- а) цитоз
 - б) белок
 - в) КСР
 - г) РИФ
 - д) все перечисленное
137. Основателем научной сифилидологии признан:
- а) Рикор
 - б) Гюнтер
 - в) Фракасторо
 - г) Тарновский
 - д) Полотебнов
138. В течение какого времени с начала сифилитической инфекции методом ИФА выявляется максимальное количество антител?
- а) 3-4 месяца
 - б) 5 месяцев
 - в) 6-9 месяцев
139. У больных вирусным гепатитом сифилитическую инфекцию предпочтительно лечить:
- а) экстенциллином
 - б) бициллином-3
 - в) доксициклином
 - г) бициллином-5
140. Какие из представленных дозировок гарантируют в СМЖ трепонемоцидную концентрацию пенициллина?

- а) суточная 12 млн ЕД в/в
 - б) суточная 24 млн ЕД в/в
 - в) суточная 4 млн ЕД с пробенецидом
 - г) суточная 8 млн ЕД с пробенецидом
141. Выделяют следующие стадии сифилитического ринита при раннем врожденном сифилисе:
- а) сухая
 - б) катаральная
 - в) язвенная
 - г) корочковая
 - д) смешанная
142. Сифилитический лабиринтит и развивающаяся при этом глухота обусловлена:
- а) периоститом в костной части лабиринта
 - б) поражением слухового нерва
 - в) дефектом барабанной перепонки
 - г) нарушением целостности евстахиев труб
 - д) признаком Геннебера

Раздел 6

ГОНОРЕЯ И НЕГОНОРЕЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

1. Возбудитель гонореи - гонококк - относится
 - а) к парным коккам грам-отрицательным
 - б) к парным коккам грам-положительным
 - в) к парным коккам грам-вариабельным
 - г) коккобациллам грам-отрицательным
 - д) коккобациллам грам-вариабельным

2. Бактериоскопическая идентификация гонококков основывается на следующих признаках, кроме

- а) парности кокков
 - б) грам-отрицательности
 - в) грам-положительности
 - г) внутриклеточного расположения
 - д) бобовидности формы
3. В средах с сахарами гонококк разлагает
- а) лактозу
 - б) галактозу
 - в) декстрозу
 - г) сахарозу
 - д) рибозу
4. Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков
- а) с хламидиями
 - б) с дрожжевым мицелием
 - в) с трихомонадами
 - г) с уреаплазмой
 - д) с гарднереллами
5. Экспериментально гонорея получена у следующих лабораторных животных
- а) у человекообразных обезьян
 - б) у морских свинок
 - в) у кроликов
 - г) у собак
 - д) ни у одного животного
6. Наиболее доступным для поражения гонококками являются слизистые оболочки, выстланные
- а) многослойным плоским неороговевающим эпителием
 - б) переходным эпителием
 - в) цилиндрическим эпителием
 - г) многослойным плоским ороговевающим эпителием
 - д) кубическим эпителием

7. Гонококки могут распространяться в организме больных следующими путями, кроме
- а) лимфогенного
 - б) гематогенного
 - в) по поверхности слизистых гениталий
 - г) трансканаликулярного
 - д) всеми перечисленными путями
8. Длительность инкубационного периода при гонорее чаще равна
- а) 1-2 дням
 - б) 3-4 дням
 - в) 5-7 дням
 - г) 8-10 дням
 - д) 10-14 дням
9. Свежий острый передний уретрит гонорейной этиологии характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме
- а) обильных гнойных выделений
 - б) болезненности при мочеиспускании
 - в) гиперемии губок наружного отверстия уретры
 - г) наличия гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
 - д) наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи
10. У женщин, больных гонореей, наиболее часто наблюдается следующая клиническая форма
- а) свежая острая
 - б) свежая подострая
 - в) свежая торпидная
 - г) латентная
 - д) хроническая
11. У женщин свежий острый уретрит гонорейной этиологии характеризуется всеми признаками, кроме
- а) гиперемии губок наружного отверстия уретры

- б) плотноэластической консистенции стенок уретры
- в) гнойных выделений из уретры
- г) учащенного мочеиспускания
- д) тупых болей в низу живота

12. Хронический тотальный уретрит гонорейной этиологии у мужчин характеризуется следующими признаками, кроме

- а) застойно-гиперемированного цвета слизистой губок наружного отверстия уретры
- б) скудных гнойных выделений
- в) болезненности в конце акта мочеиспускания
- г) наличия незначительного количества гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
- д) наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи

13. Признаками острого катарального простатита

является все перечисленное, кроме

- а) гиперестезии в области живота, промежности
- б) гнойных выделений из уретры
- в) ночных поллюций
- г) плотно-эластической консистенции предстательной железы при пальпации
- д) определения уплотнений на поверхности предстательной железы при пальпации

14. Признаками хронического фолликулярного простатита является

- а) ощущение инородного тела в области прямой кишки
- б) выделения из уретры
- в) высокий лейкоцитоз в секрете предстательной железы
- г) определение узловатых уплотнений на поверхности предстательной железы при пальпации
- д) все перечисленное

15. Противопоказаниями для забора секрета простаты для исследований

является все перечисленное, кроме

- а) острого уретрита
- б) подострого уретрита
- в) торпидного уретрита
- г) острого простатита
- д) острого орхоэпидидимита
- е) противопоказаний нет

16. Больному острым гонорейным орхоэпидидимитом

проводятся все перечисленные исследования, кроме

- а) секрета простаты
- б) отделяемого уретры на наличие других патогенных возбудителей
- в) клинического анализа мочи
- г) клинического анализа крови
- д) двухстаканной пробы мочи

17. Показаниями к тотальной уретроскопии является все перечисленное,

кроме

- а) хронического простатита
- б) острого простатита
- в) литтреита
- г) хронического уретрита
- д) импотенции

18. Диагностика острого простатита

основана на результатах перечисленных исследований, кроме

- а) мазков
- б) уретроскопии
- в) анализа 3 порций мочи
- в) пальпации предстательной железы
- д) УЗИ предстательной железы

19. Признаками стриктуры уретры являются следующие проявления, кроме

- а) выделений из уретры
- б) затрудненного и длительного мочеиспускания

- в) препятствия при введении в уретру бужа или тубуса уретроскопа
 - г) рубцового сужения уретры по данным уретроскопии
 - д) отсутствия нарушений мочеиспускания
20. При острой и подострой формах неосложненной гонореи показана терапия
- а) гоновакциной
 - б) местным лечением
 - в) антибиотиками
 - г) трихополом
 - д) пирогеналом
21. При острой и подострой осложненной гонорее у мужчин и женщин в комплексное лечение включается все перечисленное, кроме
- а) антибиотиков
 - б) гоновакцины
 - в) антигистаминных препаратов
 - г) препаратов кальция
 - д) спазмолитиков
22. Для рецидивов гонореи характерно все перечисленное, кроме
- а) сохранения клинических проявлений заболевания после лечения
 - б) сохранения повышенного лейкоцитоза в мазках
 - в) нахождения в мазках трихомонад
 - г) неполноценного лечения
 - д) клинического выздоровления после лечения
23. Для реинфекции гонореи характерно все перечисленное, кроме
- а) клинического выздоровления после лечения
 - б) нормализации мазков после лечения
 - в) отсутствия в мазках трихомонад
 - г) полноценного ранее проведенного лечения
 - д) сохранения клинических проявлений после лечения
24. При остро протекающих рецидивах лечение проводится
- а) гоновакциной

- б) пирогеналом
- в) местным лечением
- г) другими антибиотиками широкого спектра
- д) тем же антибиотиком

25. При уретритах, вызванных грам-положительными диплококками целесообразно применение перечисленных групп антибиотиков, кроме

- а) аминогликозидов
- б) цефалоспоринов
- в) линкомицина
- г) полимиксина
- д) противогрибковых препаратов

26. Больному установлен диагноз переднего уретрита хламидийной этиологии. Антибиотик какой группы следует назначить пациенту?

- а) аминогликозидов
- б) фторированных хинолонов
- в) цефалоспоринов IV поколения
- г) противопаразитарных
- д) противогрибковых

27. У девочек вульвовагиниты трихомонадной этиологии характеризуются всеми перечисленными симптомами, кроме

- а) учащенного и болезненного мочеиспускания
- б) зуда в области наружных половых органов
- в) пенистых выделений из половой щели
- г) гиперемии наружных половых органов
- д) творожистого отделяемого из половой щели, пленок белого цвета в области наружных половых органов

28. Общее лечение в инфекционно-токсической стадии болезни Рейтера включает все перечисленное, кроме

- а) дезинтоксикационной терапии
- б) гипосенсибилизирующей терапии
- в) противоревматических препаратов

- г) препаратов тетрациклинового ряда
- д) сульфаниламидных препаратов

29. Местное лечение хронического эндоцервицита гонорейной этиологии у беременных женщин проводится в сроки
- а) во всех сроках беременности без введения лекарственных препаратов непосредственно в цервикальный канал
 - б) во всех сроках беременности с введением лекарственных препаратов непосредственно в цервикальный канал
 - в) начиная со второго триместра беременности
 - г) начиная с третьего триместра беременности
 - д) не проводится
30. При лечении острого гонорейного эндоцервицита беременных женщин гоновокцина применяется
- а) во всех сроках беременности
 - б) в первом триместре беременности в пониженных дозах
 - в) во втором и третьем триместрах беременности в пониженных дозах
 - г) во втором и третьем триместрах беременности по установленной схеме
 - д) не применяется
31. При обследовании на гонорею женщин забор отделяемого для бактериологического исследования производится из всех очагов, кроме
- а) уретры
 - б) парауретральных и бартолиновых желез
 - в) прямой кишки
 - г) заднего свода влагалища
 - д) цервикального канала
32. Комплексная терапия хронической гонорейной инфекции включает
- а) иммунотерапию
 - б) этиологическое лечение
 - в) симптоматическое лечение
 - г) местное лечение
 - д) все перечисленное

33. Показаниями для обследования на гонорейно-хламидийно-уреаплазменную инфекцию является все перечисленное, кроме
- а) бесплодного брака
 - б) нарушения функций щитовидной железы
 - в) патологии беременности
 - г) хронических воспалительных заболеваний органов малого таза
 - д) нарушения менструального цикла
34. Дифференциальную диагностику гонорейного вульвовагинита проводят с негонорейными вульвовагинитами, развивающимися
- а) при нарушении обмена веществ
 - б) при механическом и термическом раздражении
 - в) при наличии энтеробиоза
 - г) при наличии трихомоноза, кандидоза
 - д) при всем перечисленном
35. Клиническими симптомами гонореи глаз является все перечисленное, кроме
- а) отека век
 - б) экзофтальма
 - в) светобоязни, гноетечения
 - г) гиперемии конъюнктивы
 - д) распадающейся язвы в роговой оболочке
36. Для диссеминированной гонорейной инфекции характерно все перечисленное, кроме
- а) гонорейного артрита
 - б) гонорейного поражения глаз
 - в) гонорейного поражения кожи
 - г) гонококкового перигепатита
 - д) гонорейного сепсиса
37. Местная терапия при гонорее нижнего отдела мочеполового тракта применяется
- а) при непереносимости антибиотиков

- б) при рецидиве
 - в) при свежей торпидной форме
 - г) при хронической форме
 - д) при всем перечисленном
38. Основными клиническими симптомами орофарингеальной гонореи являются все перечисленные, кроме
- а) язвенных поражений слизистой оболочки миндалин глотки
 - б) гиперемии слизистой оболочки
 - в) отека слизистой оболочки
 - г) гнойного налета на миндалинах
 - д) регионарного аденита
39. Критериями излеченности гонореи женщин являются результаты
- а) клинического обследования
 - б) бактериоскопического и бактериологического методов исследования
 - в) вагино- и уретроскопии
 - г) расширенной кольпоскопии
 - д) правильно а) и б)
40. Характерными жалобами и симптомами острой гонореи у девочки является
- а) учащенное болезненное мочеиспускание
 - б) зуд в области половых органов
 - в) гнойные выделения из половой щели
 - г) гиперемия наружных половых органов
 - д) все перечисленное
41. При лечении уретритов, вызванных дрожжеподобными грибами, наиболее целесообразно применять
- а) канамицин
 - б) цепорин
 - в) полимиксин
 - г) пенициллин
 - д) нистатин

42. При химическом ожоге уретры лечебная тактика включает
- а) промывание кислым раствором
 - б) промывание щелочным раствором
 - в) инстилляцию ляписа
 - г) инстилляцию масляных растворов
 - д) бужирование
43. Клинические признаки острой восходящей гонореи у женщин включают все перечисленное, кроме
- а) схваткообразных болей в низу живота
 - б) обильных кровянисто-гнойных выделений из шейки матки
 - в) эрозии шейки матки
 - г) повышенной температуры тела
 - д) симптомов раздражения брюшины
44. Признаками восходящей гонореи являются все перечисленные, кроме
- а) болей в низу живота
 - б) положительного симптома раздражения брюшины
 - в) увеличенной и пастозной матки
 - г) гнойно-кровянистых выделений из матки
 - д) нормального количества лейкоцитов в мазках
45. С целью диагностики трихомониаза мужчин исследуют все перечисленное, кроме
- а) отделяемого уретры
 - б) секрета простаты
 - в) нитей в моче
 - г) нитей в промывных водах прямой кишки
 - д) секрета семенных пузырьков
46. С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют
- а) отделяемое уретры
 - б) нити в моче
 - в) отделяемое цервикального канала
 - г) отделяемое заднего свода влагалища

д) все перечисленное

47. Поражения суставов наблюдаются при всех перечисленных заболеваниях, кроме
- а) гонореи
 - б) трихомоноза
 - в) хламидиоза
 - г) уреаплазмоза
 - д) правильно б) и г)
48. С целью диагностики урогенитального хламидиоза у женщин исследуется соскоб со слизистой оболочки
- а) уретры и заднего свода влагалища
 - б) уретры и цервикального канала
 - в) цервикального канала и прямой кишки
 - г) уретры, цервикального канала и прямой кишки
 - д) уретры
49. С целью диагностики урогенитального хламидиоза у мужчин исследуется
- а) соскоб слизистой оболочки прямой кишки
 - б) соскоб слизистой оболочки уретры
 - в) соскоб слизистой оболочки уретры и прямой кишки
 - г) секреты простаты
 - д) нитей в моче
50. Противопоказаниями к тотальной уретроскопии является все перечисленное, кроме
- а) хронического течения уретрита
 - б) острого воспалительного процесса в уретре
 - в) острого простатита
 - г) острого эпидидимита
 - д) острого колликулита
51. При гонорее местное лечение уретры и прямой кишки после родов начинается в сроки

- а) сразу же после родов
- б) на следующий день
- в) через 5 дней
- г) через 7-10 дней
- д) через 15-20 дней

52. Признаками эндоцервицита является все перечисленное, кроме

- а) слизистой пробки в цервикальном канале
- б) слизисто-гнойных выделений из цервикального канала
- в) эрозии шейки матки
- г) ретенционных кист шейки матки
- д) гипертрофии шейки матки

53. Секрет простаты исследуется

при всех перечисленных формах гонореи, кроме

- а) свежей острой, подострой
- б) свежей торпидной
- в) хронической
- г) экстрагенитальной
- д) суставной

54. Инструментальное исследование уретры у мужчин

при хроническом воспалении проводится путем

- а) исследования прямым бужом
- б) пальпации на прямом буже
- в) уретроскопии
- г) пальпации на тубусе уретроскопа
- д) всеми перечисленными способами

55. Наиболее часто при гонококковой инфекции женщин

в воспалительный процесс вовлекаются

- а) вульва
- б) влагалище
- в) уретра и цервикальный канал
- г) бартолиниевые железы

д) парауретральные ходы

56. Классификация болезней, передающихся половым путем, включает все перечисленные нозологии, кроме
- а) трихомоноза
 - б) крауроза
 - в) хламидиоза
 - г) уреаплазмоза
 - д) бактериального вагиноза
57. Диагноз мочепоолового трихомониаза должен быть подтвержден всеми перечисленными лабораторными методами, кроме
- а) окраски мазков по Романовскому - Гимза
 - б) окраски мазков по Граму
 - в) окраски мазков метиленовым синим
 - г) культурального исследования
 - д) микроскопии нативного препарата
58. Методы местной терапии уретритов включают все перечисленное, кроме
- а) инстилляций
 - б) микроклизм
 - в) бужирований
 - г) тампонад
 - д) массажа
59. Основные методы лечения аутоаллергической стадии синдрома Рейтера включает все перечисленное, кроме
- а) этиотропной терапии
 - б) кортикостероидных гормонов
 - в) цитостатиков
 - г) анаболических гормонов, препаратов калия
 - д) гоновакцины
60. Критериями диагностики хронических негонорейных уретритов является все перечисленное, кроме

- а) данных уретроскопии
- б) бактериоскопического исследования мазков на гонорею
- в) характера выделений из уретры
- г) бактериологического исследования на гонорею
- д) данных обследования на другие возбудители, передающиеся половым путем

61. Возможными путями распространения трихомонад в организме являются все перечисленные, кроме

- а) лимфогенного
- б) гематогенного
- в) континуитатного
- г) антиперистальтического
- д) верно а) и б)

62. Местное лечение поражений уретры женщин проводится всеми перечисленными методами, кроме

- а) промывания уретры
- б) инстилляций
- в) бужирования
- г) физиотерапевтических воздействий
- д) массажа уретры

63. Гонорейно-хламидийно-уреаплазменную инфекцию целесообразно лечить

- а) рифампицином
- б) эритромицином
- в) канамицином или цефаксимом
- г) фторхинолонами
- д) правильно все, кроме в)

64. При уретроскопии

могут быть обнаружены все перечисленные признаки воспаления, кроме

- а) мягкого инфильтрата
- б) твердого инфильтрата
- в) куперита
- г) колликулита

д) литтреита

65. Для орофарингеальной гонореи характерно все перечисленное, кроме

- а) гиперемии слизистой оболочки миндалин и глотки
- б) отека слизистой оболочки миндалин и глотки
- в) гнойного налета на миндалинах
- г) эрозийно-язвенных поражений мягкого неба
- д) регионарного аденита

66. При обследовании на гонорею учитывается все перечисленное, кроме

- а) количества выделений
- б) характера выделений
- в) цвета выделений
- г) запаха выделений
- д) лабораторных исследований
- г) место лечения определяется по желанию больной

67. Для местного лечения бартолинитов

используется все перечисленное, кроме

- а) компрессов с ихтиолом
- б) обкалывания антибиотиками
- в) хирургического вскрытия
- г) терапии токами высокой частоты и парафинотерапии
- д) сидячих ванночек с антисептическими растворами

68. У девочек наиболее часто гонококком поражаются слизистые оболочки

- а) влагалища
- б) уретры
- в) цервикального канала
- г) матки и придатков матки
- д) правильно а) и б)

69. При хронической гонорее у девочки в фазе ремиссии наблюдается

- а) учащенное болезненное мочеиспускание
- б) зуд в области половых органов

- в) гнойные выделения из половой щели
- г) гиперемия наружных половых органов
- д) отсутствие жалоб

70. Гонорея глаз возникает в результате

- а) занесения инфекции в глаза загрязненными руками
- б) распространения инфекции лимфогенным путем
- в) распространения инфекции гематогенным путем
- г) всего перечисленного
- д) континуитатно

71. Ранние рецидивы после окончания лечения гонореи возникают

- а) через 1-2 дня
- б) от 3 дней до 1 месяца
- в) через 1-2 месяца
- г) через 2-6 месяцев
- д) через 6-8 месяцев

72. При хронических рубцово-спаечных процессах показан электрофорез

- а) с кальцием
- б) с йодистым калием, сернокислым цинком
- в) с антибиотиками
- г) с новокаином
- д) со всем перечисленным

73. При экссудативном подостром воспалительном процессе показан электрофорез

- а) с кальцием
- б) с йодистым калием, сернокислым цинком
- в) с антибиотиками
- г) с новокаином
- д) со всем перечисленным

74. Беременность является противопоказанием

для назначения всех перечисленных антибиотиков, кроме

- а) тетрациклина
- б) левомицетина
- в) рифампицина
- г) канамицина
- д) максаквина

75. Бактериальный вагиноз характеризуется следующими признаками

- а) обнаружение "ключевых клеток" >20%
- б) щелочная реакция выделений
- в) "аминный" запах при проведении пробы с 10% раствором КОН
- г) наличие "кремообразного" отделяемого в заднем своде влагалища
- д) все перечисленное

76. Общими жалобами для трихомониаза,

кандидоза и бактериального вагиноза являются

- а) выделения из влагалища
- б) неприятный запах отделяемого
- в) зуд, жжение или чувство дискомфорта
в области наружных половых органов
- г) эрозии на слизистых оболочках гениталий
- д) все перечисленное

77. Методы диагностики урогенитального хламидиоза включают

- а) цитологические
- б) серологические
- в) выделение возбудителя на клетках Мак-Коя
- г) полимеразная цепная реакция
- д) все перечисленное

78. Симптомами уреаплазменной инфекции у женщин

является все перечисленное, кроме

- а) уретрита, эндоцервицита
- б) эндометрита, сальпингоофорита
- в) гормон-зависимой опухоли яичника
- г) нарушения менструального цикла, бесплодие

д) все перечисленное, кроме в)

79. При лечении гонорейно-хламидийно-кандидозной инфекции

применяются все препараты, кроме

- а) антибактериальных препаратов
- б) противогрибковых препаратов
- в) препаратов группы фторхинолонов
- г) противопротозойных препаратов
- д) иммунокорректоров

80. Влагалищная гарднерелла представляет собой

- а) грам-отрицательные коккобациллы
- б) грам-вариабельные коккобациллы
- в) грам-положительные кокковые формы микроорганизмов
- г) грам-положительные бациллярные формы микроорганизмов
- д) грам-вариабельные кокковые формы микроорганизмов

81. Влагалищная гарднерелла представляет собой

- а) факультативный анаэроб
- б) факультативный аэроб
- в) облигатный анаэроб
- г) облигатный аэроб
- д) все перечисленное

82. Оптимальные условия культивирования влагалищной гарднереллы

на питательных средах

- а) $t^{\circ} 35-37^{\circ}\text{C}$, $\text{pH} > 5.7$
- б) $t^{\circ} 38-40^{\circ}\text{C}$, $\text{pH} > 4.0$
- в) $t^{\circ} 35-37^{\circ}\text{C}$, $\text{pH} > 4.0$
- г) $t^{\circ} 35-37^{\circ}\text{C}$, $\text{pH} < 4.0$
- д) $t^{\circ} 38-40^{\circ}\text{C}$, $\text{pH} < 4.0$

83. Культивирование влагалищной гарднереллы

производится в следующих условиях

- а) в термостате при $t^{\circ} 35-37^{\circ}$

- б) в термостате при повышенной концентрации CO₂
- в) в анаэроустате
- г) изоляции на клетках Мак-Коя
- д) в термостате при повышенной концентрации CO₂
и в анаэроустате одновременно

84. Основным продуктом ферментации влагалищной гарднереллы является

- а) молочная кислота
- б) уксусная кислота
- в) муравьиная кислота
- г) янтарная кислота
- д) масляная кислота

85. Большинство штаммов влагалищной гарднереллы наиболее чувствительны к препаратам

- а) группы аминогликозидов
- в) группы тетрациклина
- г) группы метронидазола
- д) группы цефалоспоринов

86. В настоящее время влагалищная гарднерелла отнесена в группу

- а) облигатно-патогенных микроорганизмов
- б) условно-патогенных микроорганизмов
- в) резидентной микрофлоры
- г) все перечисленное правильно
- д) все перечисленное неверно

87. В развитии бактериального вагиноза

основная роль принадлежит всем перечисленным факторам, кроме

- а) состояния иммунологической реактивности макроорганизма
- б) инфицирующей дозы влагалищной гарднереллы
- в) вирулентности влагалищной гарднереллы
- г) частоты смены половых партнеров
- д) наличия ассоциантов

88. Урогенитальные инфекции, обусловленные анаэробными микроорганизмами, могут являться следствием всего перечисленного, кроме
- а) полового контакта с инфицированным партнером
 - б) гипоэстрогении
 - в) инвазивных методов обследования внутренних половых органов
 - г) применения внутриматочных и оральных контрацептивов
 - д) посещения бань, саун и других мест общественного пользования
89. Лабораторные методы диагностики бактериального вагиноза включают все перечисленное, кроме
- а) микроскопического исследования мазков, окрашенных по Граму
 - б) микробиологического исследования
 - в) реакции иммунофлюоресценции, газо-жидкостной хроматографии
 - г) изоляции возбудителя на клетках Мак-Коя
 - д) ДНК-гибридизации, полимеразной цепной реакции
90. Микроскопические методы исследования препаратов с целью идентификации влагалищной гарднереллы включают все перечисленное, кроме
- а) исследования нативного препарата
 - б) окраски 0.5% водным бриллиантовым зеленым
 - в) окраски по Граму
 - г) окраски по Романовскому - Гимза
 - д) реакции иммунофлюоресценции
91. Этиологический диагноз гарднереллеза при исследовании мазков, окрашенных по Граму, ставится на основании обнаружения в отделяемом всего перечисленного, кроме
- а) "ключевых" клеток
 - б) снижения количества лейкоцитов в поле зрения до 1-2
 - в) клеток с признаками атипии
 - г) снижения или полного отсутствия палочек Додерлейна
 - д) организмов рода Мобилункус или лептотрикс

92. Диагноз бактериального вагиноза может быть поставлен на основании данных
- а) микроскопического исследования
 - б) микробиологического исследования
 - в) клинико-лабораторного анализа
 - г) реакции иммунофлюоресценции
 - д) ДНК-гибридизации цепной полимеразной реакции
93. Термином "ключевая" клетка обозначается
- а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутрицитоплазматические включения
 - б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мноморфной, упорядоченной палочковой флорой
 - в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллярными микроорганизмами
 - г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой
 - д) споровая форма микроорганизма
94. Течение бактериального вагиноза в форме моноинфекции предполагает
- а) острое местное воспаление, высокий лейкоцитоз в мазках, окрашенных по Граму
 - б) острое местное воспаление, лейкоциты в пределах нормы в мазках, окрашенных по Граму
 - в) минимальные воспалительные явления при наличии повышенного количества лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
 - г) минимальное или полное отсутствие воспалительной реакции, резко сниженное количество лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
 - д) острая местная воспалительная реакция, резко повышенное количество лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму

95. У новорожденного, инфицированного хламидиями, наибольшая частота выявления возбудителя наблюдается при исследовании материала
- а) со слизистой оболочки носа
 - б) со слизистой оболочки задней стенки глотки
 - в) с наружного слухового прохода
 - г) с паховой складки
 - д) с пуповинного остатка
96. Женщины, страдающие бактериальным вагинозом, наиболее часто предъявляют все перечисленные жалобы, кроме
- а) кремообразных умеренных выделений из влагалища
 - б) нарушения менструального цикла
 - в) усиления запаха выделений во время менструации
 - г) зуда и жжения в области наружных половых органов
 - д) усиления запаха выделений во время полового контакта
97. Идентификация уреоплазмы производится всеми перечисленными методами, кроме
- а) окраски мазков по Папаниколау
 - б) прямого теста на уреазу с индикатором марганца сульфата
 - в) прямого посева на плотную питательную среду, содержащую марганца сульфат
 - г) теста на уреазу в жидкой питательной среде с последующим культивированием на плотные питательные среды
 - д) ДНК-гибридизации, полимеразной цепной реакции
98. Формы бактериального вагиноза
- а) свежая
 - б) хроническая
 - в) свежая острая, подострая, торпидная
 - г) правильно а) и б)
 - д) правильно а), б) и в)

99. Наличие гиперемии,
отека слизистых оболочек половых органов при бактериальном вагинозе
является
- а) патогномичным признаком
 - б) следствием сопутствующей инфекции
 - в) отражением степени воспалительного процесса
 - г) отражением давности заболевания
 - д) отражением вирулентности инфекционного агента
100. Бактериальный вагиноз, протекающий в виде моноинфекции
без осложнения, характеризуется жалобами
- а) незначительное количество выделений с неприятным запахом,
усиливающимся во время менструации и полового контакта
 - б) обильные выделения с неприятным запахом, зуд,
жжение в области наружных половых органов
 - в) дизурические явления, зуд,
жжение в области наружных половых органов
 - г) ноющие боли в низу живота,
обильные выделения с неприятным запахом
 - д) все перечисленное правильно
101. К экстрагенитальной гонорее относится все перечисленное, кроме
- а) литтреита
 - б) артрита
 - в) проктита
 - г) фарингита
 - д) конъюнктивита
102. Хроническая форма восходящей гонореи
характеризуется всеми перечисленными симптомами, кроме
- а) повторных повышений температуры тела,
нарушения функции соседних органов
 - б) болевых ощущений в низу живота
 - в) нарушения менструального цикла
 - г) обильных гнойных, гнойно-слизистых выделений
 - д) бесплодия

103. Гонорейный эндометрит и миометрит

характеризуются всеми перечисленными признаками, кроме

- а) болей в низу живота
- б) слизистых, слизисто-гнойных выделений из влагалища
- в) увеличения размеров матки, мягко-эластической консистенции
- г) резкого ограничения подвижности матки
- д) нарушения менструальной функции

104. Различают все перечисленные формы простатитов, кроме

- а) катарального
- б) фолликулярного
- в) грануляционного
- г) паренхиматозного
- д) абсцесса предстательной железы

105. Лечение хронического простатита включает все перечисленное, кроме

- а) массажа
- б) диатермии
- в) УВЧ-терапии
- г) инстилляций в уретру
- д) микроклизм

106. Лечение острой восходящей гонореи начинают с назначения

- а) антибиотиков и аутогемотерапии
- б) пирогенала
- в) гоновакцины
- г) биогенных стимуляторов
- д) антибиотиков и местного лечения

107. Местное лечение уретры, прямой кишки и вестибулярных желез

у беременной проводится

- а) только в I триместре
- б) только во II триместре
- в) только в III триместре

- г) независимо от срока беременности
- д) не проводится

108. Забор материала у женщин при обследовании на бактериальный вагиноз производится из следующих очагов

- а) заднего и боковых сводов влагалища
- б) уретры, цервикального канала, влагалища
- в) уретры, цервикального канала
- г) уретры, эндоцервикального канала, прямой кишки
- д) эндоцервикального канала

109. Бактериоскопическая диагностика бактериального вагиноза

включает все перечисленные методы исследования, кроме

- а) нативного препарата
- б) окраски метиленовым синим
- в) окраски по Граму
- г) окраски по Романовскому - Гимза

110. С какими заболеваниями

проводится дифференциальная диагностика гидро- и пиосальпинкса

- а) опухоль матки
- б) опухоль яичника
- в) параметрит
- г) острый аппендицит
- д) со всеми перечисленными

111. Для диссеминированной гонорейной инфекции характерны:

- а) артриты
- б) поражения кожи
- в) перигепатит
- г) сепсис
- д) все перечисленное

112. Заражение трихомонадами преимущественно происходит:

- а) половым путем
- б) контактно-бытовым путем
- в) водным

- г) трансфузионным
- д) внутриутробно

113. К ИППП относятся все перечисленные, кроме:

- а) чесотки
- б) гепатита В
- в) гонореи
- г) остроконечных кондилом
- д) урогенитального хламидиоза
- е) туберкулеза половых органов

114. Для лечения урогенитального хламидиоза используют все, кроме:

- а) антибиотиков тетрациклинового ряда
- б) макролидов
- в) фторхинолонов
- г) цитостатиков
- д) иммуномодуляторов

115. При обследовании на ИППП учитывается все перечисленное, кроме:

- а) количества выделений
- б) характера выделений
- в) цвета выделений
- г) запаха выделений
- д) результатов лабораторного исследования

116. Микоплазмы являются:

- а) прокариотами
- б) эукариотами
- в) грибами
- г) риккетсиями
- д) вирусами

117. Наиболее частая клиническая форма простатита при урогенитальном хламидиозе:

- а) острый простатит
- б) хронический простатит
- в) конгестивный прстатит
- г) хронический простатит с периодическими обострениями
- д) гранулематозный простатит

118. Препараты для местного лечения урогенитального кандидоза у беременных:

- а) клотримазол

- б) миконазол
- в) изоконазол
- г) натамицин
- д) все перечисленное верно

119. Лечение хламидийной инфекции у беременных проводится после:

- а) 12 недель беременности
- б) 20 недель беременности
- в) 24 недель беременности
- г) 30 недель беременности

120. Противопоказанием для применения изогнутого бужа для местного лечения является:

- а) стриктура уретры
- б) литтреиты
- в) простатит
- г) 2 и более инфекции урогенитального тракта
- д) Острый воспалительный процесс

121. При обследовании на урогенитальный хламидиоз какие исследования показаны?

- а) ПИФ
- б) ИФА
- в) ПЦР
- г) Мазок

122. Кондиломы, ассоциированные с ВПЧ различают:

- а) остроконечные
- б) бородавки в виде папул
- в) в виде пчтен
- г) все перечисленное верно

123. Различают основные антигенные комплексы *C.trachomatis*:

- а) родоспецифический
- б) видоспецифический
- в) серовароспецифический
- г) все перечисленное верно

124. Какие препараты целесообразно применять для лечения свежего острого гонорейного уретрита?

- а) цефалоспорины
- б) пенициллин

- в) аминоклиптолы
- г) нитрат серебра
- д) имидазолы

125. В случае установления диагноза гонореи обязательным должно быть все, кроме:

- а) обследования бытовых контактов
- б) обследования половых контактов
- в) дезобработки
- г) заполнения учетной формы 089-у
- д) диспансерного наблюдения за больным
- е) заполнения эпидемиологической карты

126. Уреазная активность присуща:

- а) уреаплазмам
- б) микоплазмам
- в) хламидиям
- г) трихомонадам

127. Молликуты чувствительны к антибиотикам:

- а) тетрациклинового ряда
- б) макролидам
- в) цефалоспорином
- г) фторхинолоном
- д) правильно а,б,г
- е) все правильно

128. К причинам, вызывающим баланит, относят:

- а) гомосексуальные связи
- б) микроорганизмы
- в) частая смена половых партнеров
- г) действие раздражающих веществ

129. Какая инфекция является наиболее частой причиной баланопостита?

- а) гонококк
- б) кандиды
- в) гарднереллы
- г) бледная трепонема
- д) красный трихофитон
- е) стрептококки

130. Дифференциальная диагностика неинфекционного баланита проводится с:

- а) плазмноклеточным баланитом Зоона
- б) эритроплазией Кейра
- в) красным плоским лишаем
- г) псориазом
- д) кожными проявлениями болезни Рейтера
- е) пузырьчаткой
- ж) все перечисленное

131. Для диагностики бактериального вагиноза производят взятие материала из:

- а) заднего свода влагалища
- б) бокового свода влагалища
- в) цервикального канала
- г) уретры
- д) прямой кишки

132. Раздражение вульвы и влагалища является диагностическим признаком при таких урогенитальных заболеваниях, как:

- а) кандидоз
- б) трихомониаз
- в) бактериальный вагиноз
- г) неспецифический бактериальный вагинит
- д) правильно а,б,г
- е) все перечисленное верно

133. В каком случае нецелесообразно проводить уретроскопию?

- а) при хроническом простратите
- б) при остром простратите
- в) при колликулите
- г) при хроническом уретрите
- д) при литтритите

134. Какой из препаратов противопоказан беременным, больным гонореей?

- а) левомицетин
- б) эритромицин
- в) бензилпенициллин
- г) тетрациклин
- д) сульфаниламиды

135. Характерной биологической особенностью хламидий является:

- а) облигатный внутриклеточный цикл развития

- б) способность к трансформации
 - в) ассоциация с другими возбудителями ИППП
 - г) тропизм к клеткам цилиндрического эпителия
 - д) высокая контагиозность
136. Рекомендован ВОЗ как препарат первого выбора для лечения хламидиоза:
- а) доксициклин
 - б) вильпрафен
 - в) сумамед
 - г) офлоксацин
137. Влагалищные трихомонады могут поражать все, кроме:
- а) канала шейки матки
 - б) влагалища
 - в) уретры
 - г) предстательной железы
 - д) конъюнктивы глаза
138. Этиотропным препаратом при трихомониазе не является:
- а) метронидазол
 - б) тинидазол
 - в) тиберал
 - г) секнидазол
 - д) офлоксацин
 - е) солкотриховак
139. В течении хронического простатита выделяют стадии:
- а) альтеративную
 - б) пролиферативную
 - в) склеротическую
 - г) все перечисленные
140. При лечении больных урогенитальным хламидиозом обычно применяют антибактериальные препараты, кроме:
- а) пенициллина
 - б) рифампицина
 - в) рифампицина
 - г) тетрациклина
 - д) вильпрафена
 - е) сумамеда

141. Для лечения гарднереллеза применяется все, кроме:
- а) пенициллина
 - б) секнидазола
 - в) клиндамицина
 - г) тиберала
 - д) далацина
142. *Mycoplasma hominis* резистентна к:
- а) эритромицину
 - б) рифампицину
 - в) тетрациклину
 - г) доксициклину
 - д) ломефлоксацину
143. В развитии кандидозной инфекции различают этапы:
- а) адгезия
 - б) инвазия
 - в) диссеминация
 - г) колонизация
144. В число важнейших факторов, определяющих заболеваемость ИППП в популяции входят:
- а) урбанизация
 - б) миграция населения
 - в) изменения социально-психических условий жизни
 - г) злоупотребление алкоголем
 - д) все перечисленное верно
145. Различают такие формы везикулитов:
- а) катаральная
 - б) глубокая
 - в) эмпиема семенного пузырька
 - г) паравезикулит
 - д) все перечисленное верно
146. Укажите как чаще всего распространяется восходящая хламидийная инфекция?
- а) лимфогенно
 - б) гематогенно
 - в) с использованием ВМС
 - г) сперматозоидами

- д) каналикулярно
 - е) все перечисленное верно
147. Выделяют следующие стадии болезни Рейтера:
- а) инфекционно-токсическая
 - б) иммунного воспаления
 - в) аллергическая
 - г) обменная
 - д) все перечисленное верно
148. К основным признакам изменений аноректальной области пассивного гомосексуалиста относят:
- а) зияние сфинктера
 - б) завальцованность переходной складки
 - в) стертость границ кожи и слизистой оболочки
 - г) отсутствие радиальных складок
 - д) все перечисленное верно
149. К препаратам, снижающим половую функцию мужчин, относят:
- а) сульфаниламиды
 - б) калиевая соль пенициллина
 - в) тиазидные диуретики
 - г) галоперидол
 - в) amitriptilin
 - д) все перечисленное верно
150. Первичные кольпиты при хламидийной инфекции возможны:
- а) у пожилых женщин
 - б) у беременных
 - в) у девочек
 - г) при гормональных нарушениях
 - д) все перечисленное верно
151. Какие по форме выделяют стриктуры уретры?
- а) кольцевидные
 - б) серповидные
 - в) извилистые
 - г) все перечисленное верно
152. Для повышения выявляемости ВПГ-2 у женщин рекомендуется:
- а) исследование 2-4 раза в течение недели

- б) взятие материала из различных очагов инфекции
- в) проведение исследования после менструации
- г) проведение исследования на 18-20 день
- д) все перечисленное

153.«Золотым стандартом» диагностики ВЗОМТ является:

- а) лапароскопия
- б) микробиологическое исследование
- в) минибиопсия бахромки маточной трубы
- г) все перечисленное верно

154.Поражения кожи и слизистых оболочек при ВИЧ-инфекции можно условно разделить на группы:

- а) неопластические
- б) инфекционные
- в) дерматозы с неясным патогенезом
- г) все перечисленное верно

155.Какие из поражений кожи и слизистых оболочек при ВИЧ-инфекции обусловлены тяжелой иммуносупрессией:

- а) неопластические
- б) вирусные
- в) грибковые
- г) бактериальные
- д) паразитарные
- е) все перечисленное верно

156.Наиболее часто оппортунистические инфекции при СПИДе-это:

- а) инвазии
- б) микозы
- в) бактериальные инфекции
- г) вирусные инфекции
- д) все перечисленное

157.К ВИЧ-индикаторным болезням кожи относятся:

- а) пиодермии
- б) кандидоз
- в) чесотка
- г) аллергический дерматит
- д) склеродермия

158. Согласно МКБ гонорея подразделяется на :

- а) острую
- б) свежую
- в) неосложненную
- г) торпидную
- д) хроническую

159. Штаммы гонококка, распространенные на территории Приморского края чувствительны к :

- а) пеницилинам
- б) тетрациклинам
- в) макролидам
- г) фторхинолонам
- д) цефалоспорином

160. Гонорея относится к :

- а) венерическим заболеваниям
- б) инфекциям передаваемым половым путем
- в) ВИЧ- индикаторным заболеваниям
- г) социальным болезням

161. Удлинению инкубационного периода при гонорее способствует :

- а) алкоголизм
- б) наркомания
- в) заражение L – формами гонококка
- г) одновременное заражение гонореей и сифилисом.
- д) одновременное заражение гонореей и ВИЧ.

162. Для диагностики хламидиоза применяют :

- а) микроскопический метод
- б) бактериологический метод
- в) ПЦР
- г) ПИФ
- д) все верно

163. Какие антибиотики наиболее эффективны для лечения хламидиоза :

- а) пенициллины
- б) тетрациклины
- в) фторхинолоны
- г) макролиды

д) цефалоспорины

164. Лечение беременных, больных хламидиозом проводят:

- а) после 5 недель беременности
- б) после 8 недель беременности
- в) после 12 недель беременности
- г) после 16 недель беременности
- д) после 24 недель беременности

Раздел 7

ДЕРМАТОЗЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

1. Перечислите физиологические состояния, возникающие у новорожденных между 3 и 8 днем жизни:
 - а) нагрубание молочных желез
 - б) десквамационный вульвовагинит
 - в) акне неонаторум
 - г) гидроцеле
 - д) все перечисленное
2. Сопутствующими заболеваниями, наиболее часто выявляемыми у детей, больных кандидозом, являются:
 - а) хронические рецидивирующие, острые респираторные вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии
 - б) гнойные отиты и хронические тонзиллиты
 - в) атопический дерматит
 - г) астмоидный бронхит
 - д) все перечисленное
3. К осложнениям избыточной функции сальных желез у младенцев относят:
 - а) милиум
 - б) гнейс
 - в) себорейный дерматит
 - г) все перечисленное верно
 - д) верно б и в
4. Для жизни новорожденного ребенка прогноз благоприятен при:
 - а) склереме
 - б) склередеме
 - в) ихтиозе
 - г) булезном эпидермолизе
 - д) все верно
5. Для эпидемической пузырчатки новорожденных характерно:
 - а) температура выше 38°C
 - б) локализация пузырей на ладонях, подошвах

- в) локализация пузырей везде, кроме ладоней и подошв
 - г) плотный инфильтрат в основании пузырей
 - д) мягкое основание пузырей
6. При склереме новорожденных наблюдается:
- а) тахикардия
 - б) тяжелое общее состояние
 - в) повышение температуры тела
 - г) понижение температуры тела
 - д) брадикардия
7. Есть ли необходимость назначать специальную терапию при красной волчанке новорожденных?
- а) да
 - б) нет
 - в) решается индивидуально
8. Уменьшение или отсутствие числа эозинофилов в крови характерно для:
- а) десквамативной эритродермии Лайнера
 - б) болезни Дюринга
 - в) эозинофильной гранулемы
 - г) эксфолиативного дерматита Риттера
 - д) верно а и в
9. Основными симптомами десквамативной эритродермии у детей являются:
- а) стойкие отеки
 - б) диарея
 - в) генерализованная сыпь в виде сплошной эритродермии
 - г) задержка прибавления массы тела
 - д) все перечисленное
10. Для повышения фагоцитарной активности лейкоцитов при торпидной системной кандидозной инфекции у детей применяют:
- а) нуклеинат натрия
 - б) пентоксил
 - в) тинростим
 - г) дибазол
 - д) все перечисленное
11. Излюбленная локализация атопического дерматита у детей в возрасте до 2 лет:
- а) крупные складки
 - б) ягодицы
 - в) ладони и подошвы
 - г) лицо, разгибательные поверхности конечностей
 - д) волосистая часть головы
12. Атопический дерматит чаще развивается:
- а) в первые дни после рождения
 - б) после 4 недель жизни
 - в) после 6 недель жизни
 - г) у взрослых
 - д) верно б и в

13. В зависимости от уровня обструкции выводных протоков потовых желез выделяют:
- а) белую потницу
 - б) красную потницу
 - в) глубокую потницу
 - г) смешанную потницу
 - д) правильно а,б,в
14. Какая локализация псориаза более характерна для детей, нежели для взрослых?
- а) аногенитальная область
 - б) область суставных складок
 - в) волосистая часть головы
 - г) ногти
 - д) правильно а,б
15. При обострении атопического дерматита у детей назначают все препараты, кроме:
- а) Антигистаминных
 - б) Дезинтоксикационных
 - в) Иммуномодуляторов
 - г) Седативных
 - д) Гепатопротекторов и ферментов
16. Угри новорожденных представляют собой:
- а) сальные кисты у новорожденных во время гормонального криза
 - б) фолликулиты
 - в) экскориированные акне
 - г) проявление эндокринного заболевания новорожденного
17. Поражение кожи ладоней и подошв у новорожденных характерно для:
- а) склередемы
 - б) сифилитической пузырчатки
 - в) склеремы
 - г) десквамативной эритродермии Лайнера
 - д) верно а и в
18. Снижение числа эозинофилов в крови характерно для детей с:
- а) экссудативным диатезом
 - б) герпетической экземой Капоши
 - в) десквамативной эритродермией Лейнера
 - г) эксфолиативном дерматите Риттера
 - д) верно все
19. Герпетическая экзема Капоши связана с:
- а) вирусом гепатита А и В
 - б) аллергическими реакциями немедленного типа
 - в) вирусом герпеса 1 типа
 - г) вирусом герпеса 8 типа
 - д) верно все
20. При лечении новорожденных с врожденным пластинчатым ихтиозом и врожденной ихтиозоформной эритродермией показаны:
- а) ретиноиды

- б) антибиотики
 - в) глюкокортикоиды
 - г) иммунотерапия
 - д) УФО в субэритемных дозах
21. Особенностью пигментной крапивницы у детей являются:
- а) буллезные проявления
 - б) наличие диффузной инфильтрации
 - в) наличие лейкоимической реакции
 - г) наличие генерализованных телеангиэктатических очагов
 - д) пахидермические проявления
22. С самыми ранними проявлениями болезни Прингла-Бурневиля у детей первых лет жизни являются:
- а) псевдоаденомы
 - б) листовидные белые пятна
 - в) подногтевые фибромы Коэна
 - г) липомы
23. Основной причиной гангренозной рожи у детей грудного возраста является
- а) низкий иммунный ответ организма ребенка
 - б) вторичное инфицирование стрептококкового поражения фузоспириллезом Плаут - Венсана или синегнойной палочкой
 - в) большое количество стрептококков
 - г) токсическая эритема новорожденных
 - д) гормональный криз новорожденных
24. Пигментно-сосочковая дистрофия кожи (чернеющий акантоз) у детей связан
- а) с аденокарциномой желудка
 - б) с Т-клеточными лимфомами
 - в) с В-клеточными лимфомами
 - г) с эндокринными болезнями
 - д) с генетическими факторами
25. У детей наиболее часто встречаются все перечисленные формы пиодермии, кроме
- а) везикулопустулеза, пиококкового пемфигоида на первом месяце жизни
 - б) множественных абсцессов (псевдофурункулез) на 3-7 месяцах жизни
 - в) интертригинозного импетиго в складках, за ушными раковинами после 3-го месяца жизни, особенно часто на 8-10 месяцах
 - г) стрептококкового импетиго после 6-го месяца жизни
 - д) частых фурункулов на первом году жизни

26. Опелости наиболее часто возникают у детей при наличии всего перечисленного, кроме
- а) атопического дерматита
 - б) младенческого себорейного дерматита
 - в) плохого ухода за ребенком
 - г) адипонекроза
 - д) грубых пеленок
27. Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают
- а) с рождения
 - б) в 2-3-месячном возрасте
 - в) после года
 - г) в дошкольном возрасте
 - д) в любом возрасте одинаково часто
28. Ребенку со струфулюсом необходимо провести все перечисленные исследования, кроме
- а) анализа кала на гельминты, лямблии
 - б) биохимической гепатограммы
 - в) копрограммы
 - г) исследования крови на С-реактивный белок
 - д) анализа кала на дисбактериоз
29. У детей первого года жизни развитию пиодермита способствует все перечисленное, кроме
- а) щелочной среды поверхности кожи
 - б) высокой абсорбционной способности кожи
 - в) активности ребенка
 - г) несовершенства процессов терморегуляции
 - д) рыхлости рогового слоя
30. Состояние при склереме новорожденных характеризуется всеми перечисленными особенностями, кроме
- а) тяжелого общего состояния
 - б) пониженной температуры

- в) замедленного дыхания
 - г) повышенной температуры, возбуждения, тахикардии
 - д) редкого пульса
31. Невус Сеттона - это
- а) периневоидная лейкодерма (периневоидное витилиго)
 - б) анемический невус
 - в) вторичная постлевоспалительная ахромия
 - г) голубой невус
 - д) гладкий невус
32. Самыми ранними кожными проявлениями туберозного склероза (болезни Прингла - Бурневилля) у детей первых лет жизни являются
- а) псевдоаденомы
 - б) листовидные белые пятна
 - в) соединительнотканнные невусы
 - г) подногтевые фибромы Козна
 - д) липомы
33. Проявления синдрома Нетертона включают все перечисленные признаки, кроме
- а) эритродермии с рождения
 - б) дистрофии волос (бамбуковые волосы)
 - в) врожденных дисплазий лица
 - г) обильного шелушения тонкими крупными пластинами
 - д) зуда
34. В случае повышенного салоотделения на голове у подростка следует рекомендовать в условиях города
- а) мыть голову часто, не реже двух раз в неделю
 - б) использовать постоянно сульфеновое мыло
 - в) использовать постоянно зеленое мыло с серой
 - г) мыть голову редко, 1-2 раза в месяц
 - д) исключить мытье водой и мылом, очищать волосы мукой
35. Гормональный криз новорожденных связан
- а) с врожденным эндокринным заболеванием
 - б) с патологией беременности
 - в) с преждевременным половым созреванием
 - г) с применением глюкокортикостероидных гормонов

- д) с высоким уровнем фетоплацентарных гормонов в крови новорожденного
36. Эстрогенные угри новорожденных представляют собой
- а) сальные кисты у новорожденных во время гормонального криза
 - б) фолликулиты
 - в) эксфолиированные акне
 - г) проявление болезни Абта - Леттерера - Сиве
 - д) проявление эндокринного заболевания новорожденного
37. Ребенку с большим количеством милиумов, гнейсом, себорейным дерматитом, нагрубанием молочных желез и физиологической желтухой не противопоказаны
- а) гепатопротекторы
 - б) сульфаниламидные препараты
 - в) хлоралгидрат
 - г) кофеин
 - д) преднизолон
38. С атопическим дерматитом часто сочетаются все перечисленные мультифакториальные болезни, кроме
- а) псориаза
 - б) поллиноза
 - в) бронхиальной астмы
 - г) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
 - д) неврастении
39. Какие лекарства нельзя назначать детям с мастоцитозом, так как они способствуют образованию пузырей
- а) кодеин от кашля, седативная микстура с кодеином
 - б) мембраностабилизаторы
 - в) антигистаминные препараты
 - г) пантотенат кальция
 - д) резерпин
40. Какие препараты нельзя назначать при аллергической крапивнице
- а) витамин В1
 - б) мембраностабилизаторы
 - в) антигистаминные препараты
 - г) рутин
 - д) блокаторы кальциевых каналов

41. Быстрее всего возникает резистентность условно патогенных микробов аутофлоры кожи при применении
- а) гентамицина
 - б) фурациллина
 - в) тетрациклина
 - г) эритромицина
 - д) линкомицина
42. Пиодермия у детей первого года жизни характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) преобладания в первые месяцы жизни стафилодермий
 - б) особой опасности гнойничковых поражений кожи у новорожденных в связи с возможностью сепсиса
 - в) возникновения более заразительных, чем у взрослых, форм (эпидемический пемфигоид, контагиозное импетиго)
 - г) возникновения папуло-эрозивной стрептодермии
 - д) появления фурункулов, склонности к нагноению сально-волосяных структур
43. Возникновению пеленочного дерматита способствует все перечисленное, кроме
- а) увеличения содержания аммиака в моче при ацидозе, рахите
 - б) избытка аммиака в кале при его щелочной реакции (производящие аммиак бактерии развиваются в щелочной среде толстой кишки при вскармливании младенца коровьим молоком)
 - в) чрезмерно кислых испражнений
 - г) стирки пеленок синтетическим моющим средством, содержащим хлор, сильные щелочи
 - д) пищевой аллергии
44. Пиодермии у детей вызывают наиболее часто
- а) гноеродные кокки (стафилококки, стрептококки)
 - б) пневмококки
 - в) синегнойная палочка
 - г) кишечная палочка
 - д) вульгарный протей
45. Множественные абсцессы (псевдофурункулы) у детей характеризуются всем перечисленным, кроме
- а) преобладания в возрасте 3-7 месяцев

- б) связи со стафилококковой инфекцией эккриновых потовых желез
- в) связи со стрептококковой инфекцией сально-волосяных структур
 - г) рубцевания
 - д) излюбленной локализации на затылке, спине, ягодицах, задней поверхности бедер
- 46. Папулезно-эрозивная стрептодермия у грудных детей имеет все перечисленные отличия от папулезных сифилидов, кроме
 - а) фликтен на поверхности папул
 - б) периферического венчика из отслоившегося рогового слоя
 - в) отсутствия высыпаний на слизистых оболочках
 - г) отсутствия бледной трепонемы в материале из папул и отрицательных результатов КСР
 - д) медно-красного цвета
- 47. Покраснение и экссудацию в высыпных элементах при мастоцитозе вызывает
 - а) полимиксин В
 - б) бензилпенициллин
 - в) линкомицин
 - г) клиндамицин
 - д) фузидин
- 48. Ребенку 5 месяцев, находящемуся на естественном вскармливании, с атопическим дерматитом и с клиническими проявлениями дисбактериоза не следует назначать
 - а) колибактерин
 - б) бифидум-бактерин
 - в) лактобактерин
 - г) бактисубтил
 - д) ацилакт
- 49. Какие препараты усиливают кожные проявления гормонального криза новорожденных?
 - а) сульфаниламиды
 - б) бензилпенициллин
 - в) левомецетин
 - г) экстенциллин

- д) аминогликозидные антибиотики
50. Ребенку с неосложненным псориазом противопоказано все перечисленное, кроме
- а) циклоспорина А
 - б) фотохимиотерапии
 - в) тигазона
 - г) полькортолона
 - д) мембраностабилизаторов
51. При каких заболеваниях ребенку грудного возраста показано назначение ретиноидов внутрь
- а) псориаз
 - б) эстрогенные угри
 - в) врожденный ихтиоз
 - г) простой локализованный буллезный эпидермолиз Вебера - Коккейна
 - д) вульгарный аутосомно-доминантный ихтиоз
52. Какие заболевания у новорожденных связаны со стафилококковой инфекцией кожи?
- а) наследственная пузырчатка
 - б) эпидемическая пузырчатка новорожденных
 - в) сифилитическая пузырчатка
 - г) вакциниформный пустулез
 - д) синдром Криста – Сименса
53. Телеангиэктазии новорожденных характеризуются всеми перечисленными признаками, кроме
- а) исчезновения при надавливании
 - б) хорошего прогноза, постепенного исчезновения с возрастом
 - в) отсутствия насыщенного темно-красного цвета
 - г) расплывчатых нечетких очертаний
 - д) увеличения с возрастом
54. Чесотке у детей грудного возраста свойственно все перечисленное, кроме
- а) ночной зуд может не беспокоить ребенка
 - б) наиболее заметных чесоточных ходов на подошвах
 - в) частых паронихии и онихии
 - г) экссудативного характера сыпи (везикулы, волдыри, отечные папулы)
 - д) отсутствия гнойничковых осложнений

55. Поражения кожи, вызванные голубиными и крысиными клещами, у детей имеют все перечисленные признаки, кроме
- а) свободных от укусов открытых частей тела
 - б) мелких папул с воспалительным венчиком и бурой микрокоркой в центре
 - в) волдырей
 - г) исчезновения сыпи через 1-2 недели
 - д) симптома Арди
56. Признаки "атопического лица" (фациес атопика) включают все перечисленное, кроме
- а) псевдо-Хертоге симптома
 - б) складок Моргана - линий Дени
 - в) хейлита
 - г) врожденных дисплазий
 - д) бледности или застойной гиперемии
57. В развитии узловатой эритемы у детей могут играть роль все перечисленные факторы, кроме
- а) иммунокомплексного патогенеза с отложением IgM и фракции комплемента C3 в стенках сосудов
 - б) гиперергических реакций на микобактерии туберкулеза
 - в) токсикоаллергических реакций, связанных с фокальной инфекцией пиококковой флорой, йерсинией, патогенной кишечной палочкой
 - г) повышенной чувствительности к вакцинам, сывороткам, антибиотикам
 - д) микседемы
58. Псориаз у детей грудного и младшего детского возраста имеет все перечисленные особенности, кроме
- а) частой локализации на половых органах, в складках кожи, на лице
 - б) мелких папулезных (экзантемных) высыпаний чаще, чем крупнобляшечных форм
 - г) интенсивного зуда
 - д) выраженной ониходистрофии
59. Герпетиформная экзема Капоши связана
- а) с аллергическими реакциями немедленного типа
 - б) с вирусом герпеса I типа
 - в) с чувствительностью к клейковине, с непереносимостью глютена

- г) со стрептококковой инфекцией
 д) с вирусом гепатита А и Б
60. Детям грудного возраста по поводу энтеропатического акродерматита не следует назначать
- а) препараты цинка
 б) галлоидные производные оксихинолина
 в) антибиотики широкого спектра и антимикотические препараты
 г) кишечные ферменты
 д) эубиотики

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1. Общая дерматология

1. Д	29. В	57. А
2. Г	30. Д	58. Д
3. А	31. Д	59. Д
4. А	32. Д	60. Д
5. В	33. Д	61. В
6. Г	34. Д	62. Д
7. Б	35. Д	63. Д
8. Д	36. Д	64. Д
9. Д	37. А	65. Д
10. Г	38. Д	66. Д
11. Г	39. Д	67. Б
12. А	40. В	68. В
13. Г	41. Д	69. Д
14. Д	42. В	70. А
15. А	43. Д	71. Д
16. Д	44. Д	72. Д
17. Б	45. Д	73. Д
18. Д	46. Д	74. Д
19. Д	47. Д	75. А,Д
20. В	48. Д	76. А,Б,Д
21. В	49. Д	77. Д
22. Д	50. В	78. Б,В,Д
23. Д	51. Д	79. Б
24. Д	52. Д	80. А,В,Г
25. Г	53. Д	81. Б
26. Д	54. А	82. Б
27. Д	55. Д	83. Б
28. Д	56. Д	84. А

85. А,Г,Д	96. А	107. А
86. А	97. А	108. В
87. Г	98. В	109. Д
88. Г	99. А	110. А
89. Г	100. Г	111. А
90. Г	101. А	112. А,Б,В
91. Б	102. Б	113. Д
92. В	103. Д	114. А
93. Г	104. Е	115. А,Б,Д
94. А,Б,В	105. Б	
95. А,Б,В	106. Б	

2. Неинфекционные болезни кожи

1. Г	31. Д	61. А
2. Д	32. Д	62. Д
3. Д	33. Г	63. А
4. А	34. Д	64. Б
5. А	35. Б	65. Б
6. Д	36. В	66. Д
7. Д	37. Д	67. Г
8. Г	38. Д	68. Г
9. Б	39. Г	69. Б
10. Д	40. Д	70. Д
11. Д	41. Г	71. Д
12. Д	42. Д	72. Д
13. В	43. Д	73. Г
14. Д	44. Д	74. Д
15. Д	45. Б	75. В
16. В	46. Г	76. Д
17. Г	47. А	77. А
18. Д	48. Д	78. Д
19. Д	49. Б	79. Д
20. В	50. Д	80. Д
21. В	51. Г	81. А
22. Д	52. А	82. Д
23. А	53. А	83. Г
24. Г	54. Д	84. Д
25. Д	55. Д	85. Б
26. Д	56. В	86. А,Б,В,Г
27. Д	57. Д	87. Б
28. Г	58. А	88. Б
29. Д	59. Д	89. А
30. Д	60. Д	90. Б,В

91. А	125. В	159. Г
92. Д	126. А	160. А,Б,В
93. Е	127. А	161. Д
94. А,Г	128. А	162. В
95. Г	129. Б	163. А
96. Е	130. А	164. Д
97. В,Г	131. А,В,Д	165. А
98. Б	132. Д	166. А
99. Б	133. Б	167. В
100. А,В,Д	134. А	168. Б,Д
101. Б	135. А,В	169. А,Б
102. Д	136. В	170. А,Б
103. А	137. А,Б,Г	171. А
104. А,Б	138. А	172. Е
105. В	139. Б	173. Г
106. В	140. Д	174. Г
107. А,Б,В,Г	141. Б	175. А
108. Г	142. Г	176. Г
109. А	143. В	177. Е
110. Д	144. А,В,Г	178. Д
111. А,В	145. В	179. Д
112. В,Д	146. Б	180. Г
113. А,В,Г	147. Д	181. Д
114. Б	148. Е	182. В
115. А,Б	149. Г	183. Б
116. Г	150. Г,Д	184. Е
117. Д	151. Д	185. Г
118. Д	152. Г	186. А
119. В	153. Д	187. А
120. А,Г,Д	154. Д	188. Б
121. А,Б,В	155. В	189. Д
122. Б	156. Д	200. А
123. Е	157. Б	
124. Б,В	158. Е	

3. Инфекционные и паразитарные болезни кожи

1. Б	9. Д	17. Д
2. Д	10. Д	18. А
3. Г	11. В	19. Б
4. Б	12. Д	20. А
5. Г	13. А	21. Д
6. А	14. А	22. В
7. В	15. А	23. В
8. Г	16. Д	24. Д

25. А	71. Б	117. А
26. Г	72. Д	118. В
27. Г	73. Д	119. Г
28. А	74. В	120. В
29. Д	75. А	121. А
30. Д	76. Д	122. В
31. Д	77. Д	123. Д
32. Г	78. Д	124. А
33. Б	79. Д	125. Д
34. Д	80. Г	126. А
35. Д	81. Д	127. Г
36. Г	82. Д	128. А
37. Б	83. Б	129. В
38. Д	84. Д	130. Д
39. А	85. Д	131. Д
40. Д	86. А	132. В
41. Г	87. Д	133. Г
42. Д	88. Б	134. Д
43. Б	89. Д	135. Б
44. А	90. Г	136. Д
45. Б	91. В	137. В
46. Б	92. Б	138. В
47. Д	93. Д	139. В
48. Г	94. В	140. Г
49. Г	95. Б	141. Д
50. Д	96. Д	142. Д
51. Б	97. Д	143. Б
52. Д	98. А	144. В
53. В	99. Д	145. В
54. Д	100. Д	146. В
55. Д	101. Д	147. А,В,Ж
56. В	102. Б	148. Б
57. А	103. Д	149. Е,З
58. Д	104. Г	150. А,Б,В
59. Б	105. Д	151. А,Д
60. А	106. В	152. Б
61. Б	107. А	153. Е
62. Д	108. Д	154. В
63. Б	109. Д	155. Д
64. Д	110. А	156. Б,В,Д
65. Г	111. Д	157. Д
66. Д	112. Д	158. А,В,Е
67. Д	113. А	159. Д
68. Д	114. А	160. Д
69. Д	115. А	161. Г
70. Д	116. Г	162. В,Г

163.	Б,В	176.	В	189.	Б
164.	Е	177.	Г	190.	В,Г
165.	Д	178.	Д	191.	Д
166.	Г	179.	Б	192.	Д
167.	Е	180.	Б	193.	Б
168.	А,Б,Г	181.	Д	194.	Ж
169.	Б,В,Д	182.	Д	195.	Б
170.	Е	183.	Г	196.	Б
171.	А	184.	Е	197.	Д
172.	Д	185.	А	198.	Д
173.	В	186.	Г	199.	А
174.	А	187.	Б	200.	Д
175.	Д	188.	В		

4.Грибковые болезни кожи

1.	Б	28.	Д	55.	В
2.	В	29.	А	56.	Д
3.	Д	30.	Г	57.	Д
4.	Г	31.	Д	58.	Д
5.	Г	32.	Д	59.	Г
6.	Д	33.	Д	60.	Д
7.	Д	34.	А	61.	Д
8.	Д	35.	Д	62.	Д
9.	Д	36.	Д	63.	Д
10.	Д	37.	В	64.	Д
11.	Д	38.	Д	65.	Г
12.	Д	39.	Б	66.	Г
13.	Д	40.	Г	67.	Д
14.	Д	41.	Г	68.	Д
15.	Д	42.	Г	69.	Б
16.	Г	43.	Г	70.	Г
17.	В	44.	Г	71.	А
18.	Д	45.	Д	72.	Б
19.	Д	46.	Б	73.	А
20.	А	47.	Г	74.	А
21.	Г	48.	Д	75.	В
22.	Д	49.	Г	76.	Г
23.	А	50.	Д	77.	А
24.	А	51.	Д	78.	А
25.	Д	52.	Д	79.	В
26.	Г	53.	В	80.	Б
27.	В	54.	Д	81.	В

82.	А	95.	Б,Г	108.	В,Д
83.	Д	96.	Б,Г	109.	Е
84.	Б	97.	Г	110.	Г
85.	Г	98.	Б	111.	Д
86.	Г	99.	Д	112.	Б
87.	Д	100.	В	113.	Д
88.	Б,Г	101.	Г	114.	В
89.	А,Е	102.	Г	115.	В
90.	В,Г,Д	103.	Д	116.	Д
91.	Г	104.	Д	117.	Д
92.	Г	105.	Д	118.	А
93.	Б,В,Г	106.	А	119.	А
94.	Г	107.	Е		

5. Сифилис

1.	Б	29.	Б	57.	Г	85.	Б
2.	А	30.	Б	58.	Б	86.	Д
3.	Б	31.	В	59.	Д	87.	Д
4.	В	32.	Б	60.	Г	88.	А
5.	Б	33.	А	61.	Д	89.	Г
6.	Д	34.	А	62.	А	90.	Б
7.	Д	35.	Б	63.	Д	91.	Б
8.	А	36.	Б	64.	Д	92.	В
9.	Б	37.	А	65.	А	93.	Г
10.	В	38.	А	66.	Д	94.	В,Г
11.	Д	39.	Б	67.	А	95.	Д
12.	А	40.	Д	68.	В	96.	Д
13.	В	41.	Д	69.	Д	97.	Г
14.	В	42.	А	70.	А	98.	А
15.	Б	43.	Д	71.	Д	99.	В
16.	А	44.	А	72.	В	100.	Г
17.	А	45.	Б	73.	Д	101.	Д
18.	А	46.	Б	74.	Д	102.	Г
19.	В	47.	В	75.	Д	103.	Г,Д
20.	Б	48.	А	76.	Б	104.	А,В
21.	Б	49.	Б	77.	Б	105.	Б,Г
22.	Г	50.	Б	78.	А	106.	А,Б,Г
23.	В	51.	Б	79.	А	107.	А,Б,В
24.	Д	52.	В	80.	Б	108.	Б,В,Г
25.	Б	53.	В	81.	Б	109.	Г,Е
26.	Б	54.	В	82.	А	110.	В,Д,Е
27.	В	55.	А	83.	Д	111.	Г
28.	Б	56.	В	84.	Б	112.	Д

113. Д	121. В	129. В	137. А
114. Г	122. Г	130. Б	138. А
115. Д	123. В	131. Г,Д	139. Б
116. В,Д	124. Д	132. Г	140. Д
117. Б,В	125. Б	133. А	141. А,Б,В
118. В	126. Б	134. А,Б	142. А,Б
119. А,Б	127. А	135. А,Б	
120. Б	128. Г	136. Д	

6. Гонорея и негонорейные заболевания мочеполовых органов

1. А	32. Д	63. Д	94. Г
2. В	33. Б	64. В	95. Б
3. В	34. Д	65. Г	96. Б
4. В	35. Б	66. Г	97. Б
5. Д	36. Б	67. Г	98. Д
6. В	37. Д	68. Д	99. Б
7. Д	38. А	69. Д	100. А
8. Д	39. Д	70. Д	101. А
9. Г	40. Д	71. Б	102. Г
10. В	41. Д	72. Б	103. Г
11. Д	42. Б	73. А	104. В
12. Д	43. В	74. Б	105. В
13. Д	44. Д	75. Д	106. А
14. Д	45. Г	76. Д	107. Г
15. Д	46. Д	77. Д	108. А
16. А	47. Д	78. В	109. Г
17. Б	48. Б	79. Г	110. Д
18. Б	49. Б	80. Б	111. Д
19. Д	50. А	81. А	112. А
20. В	51. А	82. В	113. Е
21. Б	52. А	83. Д	114. Г
22. Д	53. А	84. Б	115. Г
23. Д	54. Д	85. Г	116. А
24. Г	55. В	86. Б	117. Г
25. Д	56. Б	87. Г	118. Д
26. Б	57. А	88. Д	119. Г
27. Д	58. Б	89. Г	120. Д
28. Д	59. Д	90. Г	121. А,В
29. А	60. В	91. В	122. Г
30. Д	61. Б	92. В	123. Г
31. Г	62. В	93. В	124. А,В

125. А,В	140. А,Б	155. Е
126. А	141. А	156. Д
127. Д	142. А	157. А,Б,В
128. Б,Г	143. А,Б	158. В
129. Б	144. А,Б,В	159. А
130. Ж	145. Д	160. Д
131. А,Б	146. Е	161. А
132. Д	147. А,Б	162. В
133. Б	148. Д	163. Д
134. Г	149. Ж	164. Г
135. А	150. Д	165. В
136. В	151. Г	
137. Д	152. А,Б,Г	
138. Д	153. Г	
139. Г	154. Г	

8. Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей

1. Д	25. Д
2. Д	26. Г
3. Г	27. Б
4. Б	28. Г
5. А,Б,Г,Е	29. В
6. Б,Г,Д	30. Г
7. Б	31. А
8. А	32. Б
9. Б,В,Г	33. В
10. Е	34. А
11. Г	35. Д
12. В	36. А
13. Ж	37. А
14. Д	38. А
15. В	39. А
16. А	40. А
17. А,Б	41. А
18. В	42. Д
19. В	43. Д
20. В	44. А
21. А	45. В
22. Е	46. Д
23. Б	47. А
24. Д	48. А

- 49. А
- 50. Д
- 51. В
- 52. Б
- 53. Д
- 54. Д
- 55. Д
- 56. Г
- 57. Д
- 58. Д
- 59. Б
- 60. Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технологическая карта дисциплины «Дерматовенерология»

Курс 2, семестр 3, ЗЕ-2, отчетность-зачет.

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум (баллы)	Зачетный максимум (баллы)	График Контроля
Модуль 1					
Общая и частная дерматология	Текущий	Тестирование; Курация больного (сбор анамнеза заболевания и эпид.анамнеза, общеклиническое обследование, анализ лабораторных исследований, тактика лечения) СРС: Доклад с презентацией; Посещаемость: <i>за каждое пропущенное и не отработанное занятие снимается 1балл.</i>	16	30	4 неделя
	Рубежный	Тестирование	4	5	
Модуль 2					
Венерология	Текущий	Тестирование; Курация больного (сбор анамнеза заболевания и эпид.анамнеза, общеклиническое обследование, интерпретация лабораторных исследований, тактика лечения) СРС: Доклад с презентацией; Посещаемость: <i>за каждое пропущенное и не отработанное занятие снимается 1балл.</i>	16	30	6 Неделя
	Рубежный	Тестирование	4	5	
Всего за семестр			40	70	9 Неделя
Промежуточный Контроль (Зачет)	Тестирование; Ситуационная задача;		20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	